

RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES

SULFACET-R[®]

(sulfacétamide sodique - soufre)

Traitement de l'acné

Valeant Canada S.E.C.
4787 rue Levy
Montréal (Québec) H4R 2P9

Date de révision :
13 février 2012

N^o de contrôle de la préparation : 153350

Indications

Pour le traitement de l'acné vulgaire, la dermatite séborrhéique, la folliculite bactérienne et les conditions associées graves.

Contraindications

Hypersensibilité aux sulfamides tel qu'indiqué par la réaction relative, toxique, antérieure (p. ex. agranulocytose, anémie hémolytique aiguë, purpura hémorragique, fièvre du médicament, jaunisse ou dermatite de contact).

Précautions

Le soufre peut causer de la rougeur et desquamation de l'épiderme mais si une irritation cutanée se développe ou augmente, interrompre l'usage de la médication et consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux.

Posologie

Pour usage externe seulement. Bien agiter la lotion. Appliquer du bout des doigts une petite quantité de lotion sur les régions affectées 2 ou 3 fois/jour.

Présentation

Un mL de lotion contient 10 % p/v de sulfacétamide de sodium, 5 % p/v de soufre colloïdal. Ingrédients non médicinaux: 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol (bronopol), acide myristique laurique, acide sulfonique de naphthalène, attapulgite, chlorure de sodium, diéthanolamine, eau purifiée, émulsion de silicone, gomme de xanthane, hydroxyéthylcellulose, métabisulfite de sodium, monolaurate de polyéthylèneglycol, oxyde de fer, oxyde de zinc, parahydroxybenzoate de butyle, parahydroxybenzoate de méthyle, propylèneglycol, soufre précipité et talc. Flacons de 25 g.