

INFORMATION POSOLOGIQUE

SIALOR^{MD}

(Anéthole trithione)

Comprimés, 25 mg

Sialogogue

PHARMASCIENCE INC.
6111 avenue Royalmount, Suite 100
Montréal, Québec H4P 2T4

Date de révision: 31 octobre 2003

Numéro de contrôle : 087678

INFORMATION POSOLOGIQUE

SIALOR^{MD}

(Anéthole trithione)

Comprimés, 25 mg

CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE

Sialogogue

MODE D'ACTION PHARMACOLOGIE CLINIQUE

En plus de son activité cholérétique, l'anéthole trithione a un effet positif sur l'asialie induite par les médicaments, probablement par son action directe sur les cellules sécrétrices des glandes salivaires.

Environ 30% de la dose orale administrée est absorbée par le tractus gastro-intestinal, avec une excrétion de plus de 80% dans l'urine et le reste dans la bile.

Chez l'homme, les quantités moyennes d'anéthole trithione récupérées en métabolite libre p-hydroxyphényltrithione ou en son o-glucuronide sont de 1,5 à 3 et 12%, respectivement. La coloration jaune de l'urine résultant de l'ingestion d'anéthole trithione est due à la présence de 2 métabolites.

INDICATIONS

Pour le traitement des symptômes oraux de la xérostomie dans le but de renverser une hyposialie liée à l'administration de certains médicaments (neuroleptiques, tranquillisants, antidépresseurs, agents antiparkinsoniens synthétiques) ou suivant un traitement de radiothérapie dans la région de la tête et du coup.

CONTRE-INDICATIONS

Ictère, cirrhose, obstruction du tractus biliaire ou du canal cholédoque.

PRÉCAUTIONS

Rarement, des selles molles peuvent survenir. Si cela persiste, réduire la posologie à 25 mg le matin et 25 mg en soirée.

Grossesse et allaitement:

L'innocuité de l'anéthole trithione pour utilisation chez la femme enceinte n'a pas été établie. Par conséquent, ce médicament ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte ou qui allaite à moins que son usage soit jugé essentiel au bien-être de la mère et/ou du fœtus.

SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE

Symptomatique: Lavage gastrique, induire une diurèse.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Un comprimé de 25 mg 3 fois par jour avant les repas. Le traitement peut être administré de façon continue ou intermittente avec 5 jours/mois sans médication, en association avec des médicaments responsables de l'asialie. Dans l'hyposialie liée à la radiothérapie, l'administration peut être poursuivie indéfiniment. Habituellement, l'effet thérapeutique complet de l'anéthole trithione est atteint graduellement après quelques jours de traitement.

DISPONIBILITÉ

Chaque comprimé rouge-orange enrobé de sucre contient: 25 mg d'anéthole trithione. Des colorants jaune orangé et carmine rouge sont utilisés dans l'enrobage des comprimés. Boîtes de 60.