



THE  
REGULATORY & COMPLIANCE  
LEADERS™

## CANADIAN DRUG LABEL TEMPLATE

PRODUCT NAME	Vermifuge liquide pour chiens contre les vers ronds®
PRIMARY PACKAGE TYPE (i.e. bottle, tube)	Bouteille

### PRIMARY (INNER) LABEL (FINAL LABEL TO BE IN FRENCH & ENGLISH)

**PRO-SENSE®**

**Roundworm Liquid Dewormer Dog**

Solution de pipérazine (sous forme de citrate)

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Mises en garde:** Garder hors de la portée des enfants.

Contenu net :

118 ml (4 oz liq.)

DIN : XXXXXXXXX

**Ingrédients actifs :** 250 mg de base de pipérazine (sous forme de citrate de pipérazine) par cuillère à thé (5 ml)

**Ingrédients inactifs :** Couleur caramel, arôme artificiel de chocolat, glycérine, méthylparabène, sorbate de potassium, sucrose, vanille, eau

**Indications :** Ce produit est un anthelminthique à administrer par voie orale en guise d'aide au traitement et/ou à la prévention des vers ronds (nématodes) (*Toxocara canis* et *Toxascaris leonina*) chez les chiens et les chiots âgés de 6 semaines ou plus.

**Posologie et mode d'administration :** Consulter votre vétérinaire pour établir le diagnostic, le



THE  
REGULATORY & COMPLIANCE  
LEADERS™

traitement et le contrôle du parasitisme.

Chiens et chiots (âgés de 6 semaines ou plus) : ½ cuillère à thé par 2,3 kg (5 lb) de poids corporel. Après la dose initiale du premier jour, ne plus administrer jusqu'au 14<sup>e</sup> jour. Le 14<sup>e</sup> jour, répéter la dose initiale. Ensuite, administrer tous les 30 jours pour aider à prévenir une réinfection. Pour les chiots, administrer la dose tous les 14 jours jusqu'à l'âge de 8 à 12 semaines, puis continuer mensuellement jusqu'à l'âge de 6 mois, et par la suite continuer tous les 30 jours pour aider à prévenir une réinfection. Le traitement devrait être donné peu après que l'animal de compagnie a mangé, ou avec sa nourriture. La dose peut être donnée directement ou ajoutée à la nourriture. Dans les cas de foyers d'animaux de compagnie multiples, donner directement à chaque chien ou chiot pour assurer un dosage adéquat.

REMARQUE : Une cuillère de format ½ cuillère à thé est fournie afin de faciliter l'administration du produit.

**Contre-indications :** Ne pas vermifuger un chiot de moins de 6 semaines. Ne jamais vermifuger un chien ou un chiot malade. Pas recommandé pour les chiens de moins de 2,3 kg (5 lb). Pas recommandé pour les femelles enceintes ou qui allaitent.

**Précautions :** Les chiens et les chiots âgés d'au moins 7 mois devraient avoir un test sanguin récent de dépistage du ver du cœur qui est négatif avant d'être vermifugés. **Garder hors de portée des animaux afin d'éviter toute consommation accidentelle.**

**Effets indésirables :** Bien que peu fréquents aux posologies recommandées, des effets indésirables comme la nausée, des vomissements, de la diarrhée, de l'ataxie ou des tremblements peuvent se produire. La posologie recommandée doit être respecté à la lettre. Si des signes cliniques se manifestent, consulter immédiatement un vétérinaire.

**Entreposage :** Entreposer à la température ambiante (15 à 30 °C). Maintenir la bouteille fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabriqué par :  
United Pet Group, une division de Spectrum Brands, Inc.  
3001 Commerce Street, Blacksburg,  
VA 24060 États-Unis

Importé par :  
Quality & Compliance Services Inc., Mississauga, Ontario L5N 5R1

Lot :  
Exp. :



THE  
REGULATORY & COMPLIANCE  
LEADERS™

## CANADIAN DRUG LABEL TEMPLATE

PRODUCT NAME	Vermifuge liquide pour chiens contre les vers ronds®
SECONDARY PACKAGE TYPE (i.e. carton, shrink wrap)	Boîte

### SECONDARY (OUTER) LABEL (FINAL LABEL TO BE IN FRENCH & ENGLISH)

<p style="text-align: center;"><b>PROSENSE®</b></p> <p><b>MAIN (FRONT) PANEL</b></p> <p><b>Pro-Sense<sup>MD</sup></b> <b>Roundworm Liquid Dewormer Dog</b> Solution de pipérazine (sous forme de citrate)</p> <p>USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT</p> <p><i>Logos:</i> Pro-Sense®</p> <p><b>Mises en garde :</b> Garder hors de la portée des enfants.</p> <p>Texte de marketing facultatif : Pour le traitement et le contrôle des vers ronds Pour chiens et chiots âgés de 6 semaines et plus</p> <p>DIN : XXXXXXXX</p> <p>Contenu net : 118 ml (4 oz liq.)</p> <p><b>ALTERNATE BOX PANEL</b></p>
--



THE  
REGULATORY & COMPLIANCE  
LEADERS™

Texte de marketing facultatif :

- Vermifuge liquide facile à administrer
- Donner ½ cuillère à thé (fournie) au chien par 2,3 kg (5 lb) de poids corporel

**INGRÉDIENTS ACTIFS :** 250 mg de base de pipérazine (sous forme de citrate de pipérazine) par cuillère à thé (5 ml)

**INGRÉDIENTS INACTIFS :** Couleur caramel, arôme artificiel de chocolat, glycérine, méthylparabène, sorbate de potassium, sucrose, vanille, eau

**INDICATIONS :** Ce produit est un anthelminthique à administrer par voie orale en guise d'aide au traitement et/ou à la prévention des vers ronds (nématodes) (*Toxocara canis* et *Toxascaris leonina*) chez les chiens et les chiots âgés de 6 semaines ou plus.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :** Consulter votre vétérinaire pour établir le diagnostic, le traitement et le contrôle du parasitisme.

Chiens et chiots (âgés de 6 semaines ou plus) : ½ cuillère à thé par 2,3 kg (5 lb) de poids corporel. Après la dose initiale du premier jour, ne plus administrer jusqu'au 14<sup>e</sup> jour. Le 14<sup>e</sup> jour, répéter la dose initiale. Ensuite, administrer tous les 30 jours pour aider à prévenir une réinfection. Pour les chiots, administrer la dose tous les 14 jours jusqu'à l'âge de 8 à 12 semaines, puis continuer mensuellement jusqu'à l'âge de 6 mois, et par la suite continuer tous les 30 jours pour aider à prévenir une réinfection. Le traitement devrait être donné peu après que l'animal de compagnie a mangé, ou avec sa nourriture. La dose peut être donnée directement ou ajoutée à la nourriture. Dans les cas de foyers d'animaux de compagnie multiples, donner directement à chaque chien ou chiot pour assurer un dosage adéquat.

**REMARQUE :** Une cuillère de format ½ cuillère à thé est fournie afin de faciliter l'administration du produit.

La solution *Pro-Sense Roundworm Liquid Dewormer Dog* est un vermifuge liquide facile à administrer. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous pour traiter votre chien ou chiot (âgé de 6 semaines ou plus).

[Infographic]

**GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE**

**ÉTAPE 1**

- Pesez-vous
- Pesez-vous avec votre animal
- Soustrayez votre poids pour avoir celui de votre animal

**ÉTAPE 2**

- Si le poids est en kilogrammes (kg), divisez le poids de l'animal par 2,3 kg.  
- Exemple : Si l'animal pèse 5 kg :  $5 \text{ kg} \div 2,3 \text{ kg} = 2$  = nombre de ½ cuillère à thé à donner
- Si le poids est en livres (lb), divisez le poids de l'animal par 5 lb.  
- Exemple : Si l'animal pèse 10 lb :  $10 \text{ lb} \div 5 \text{ lb} = 2$  = nombre de ½ cuillère à thé à donner
- Le tableau ci-dessous sert de guide :

Poids de l'animal	Nombre de ½ cuillère à thé (fournie) à donner
2,3 kg (5 lb)	1
4,6 kg (10 lb)	2
6,9 kg (15 lb)	3
9,2 kg (20 lb)	4
11,5 kg (25 lb)	5
13,8 kg (30 lb)	6
18,4 kg (40 lb)	8
23 kg (50 lb)	10
27,6 kg (60 lb)	12

ÉTAPE 3

- Administrez le nombre approprié de ½ cuillère à thé par 2,3 kg (5 lb) de poids corporel du chien à l'aide de la ½ cuillère à thé fournie

ÉTAPE 4

- Mélangez la dose dans la nourriture ou donnez directement

ÉTAPE 5

- Répétez 14 jours plus tard

ÉTAPE 6

- Répétez tous les 30 jours pour aider à prévenir une nouvelle infestation.

**CONTRE-INDICATIONS :** Ne pas vermifuger un chiot de moins de 6 semaines. Ne jamais vermifuger un chien ou un chiot malade. Pas recommandé pour les chiens de moins de 2,3 kg (5 lb). Pas recommandé pour les femelles enceintes ou qui allaitent.

**PRÉCAUTIONS :** Les chiens et les chiots âgés d'au moins 7 mois devraient avoir un test sanguin récent de dépistage du ver du cœur qui est négatif avant d'être vermifugés. **GARDER CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ANIMAUX AFIN D'ÉVITER UNE CONSOMMATION ACCIDENTELLE.**

**EFFETS INDÉSIRABLES :** Bien que peu fréquents aux posologies recommandées, des effets indésirables comme la nausée, des vomissements, de la diarrhée, de l'ataxie ou des tremblements peuvent se produire. La posologie recommandée doit être respecté à la lettre. Si des signes cliniques se manifestent, consulter immédiatement un vétérinaire.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer à la température ambiante (15 à 30 °C). Maintenir la bouteille fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.



THE  
REGULATORY & COMPLIANCE  
LEADERS™

**ALTERNATE BOX PANEL**

**DES QUESTIONS OU COMMENTAIRES?**

Composez le 1 800 645-5154 ou visitez notre site Web au [www.prosensepet.com](http://www.prosensepet.com)

Fabriqué par :

United Pet Group, une division de Spectrum Brands, Inc.

3001 Commerce St., Blacksburg, VA 24060 États-Unis

Article n° [insérer le numéro d'article ici]

® Marque déposée de Spectrum Brands, Inc.

© [insérer l'année] Spectrum Brands, Inc.

Importé par : Quality & Compliance Services Inc., Mississauga, Ontario L5N 5R1

**UGS : J1715FL**

LOT :

EXP. :