

Version 9 Sept 2011

Revalor^{ik}-200 INNER LABEL

Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

Revalor[®]-200 **DIN: 02254026**

trenbolone acetate/acétate de trenbolone 200 mg
estradiol 20 mg

10 implants

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7

1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Version Sept 9, 2011

Revalor[®]-200 OUTER LABEL
Top panel

Revalor[®] - 200
Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

LOT:
EXP:
Intervet logo

Main panel English

DIN: 02254026

Revalor[®] - 200
Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg
Veterinary Use Only
FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)

NET CONTENTS: Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

Side panel English

INDICATIONS

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300 – 450 kg. The administration of Revalor[®]-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor[®]-200 over the use of Revalor[®]-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

DESCRIPTION

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 10 small yellow pellets. Each pellet contains:

ACTIVE INGREDIENTS: 20 mg trenbolone acetate and 2 mg estradiol for a total dose per implant of 200 mg trenbolone acetate and 20 mg estradiol.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: 4.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 0.25 mg ethylcellulose N200.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

See package insert for complete directions for use.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

CAUTIONS

Do not use in animals intended for subsequent breeding.

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

DIN: 02254026

Revalor® - 200

200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300 – 450 kg)

CONTENU NET: Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

INDICATIONS

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 à 450 kg. L'administration de Revalor®-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor®-200 au lieu de Revalor®-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

DESCRIPTION

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 10 petites pastilles jaunes. Chaque pastille renferme:

INGRÉDIENTS ACTIFS: 20 mg d'acétate de trenbolone et 2 mg d'estradiol pour une dose totale de 200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol.

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX: 4,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 0,25 mg éthylcellulose N200.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

Version Sept 9, 2011

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

Version: Sept 9, 2011

Revalor[®]-200 SHIPER LABEL 4 X 1000

Revalor[®]-200

DIN: 02254026

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg
200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol
Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

**FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)
POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)**

Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300-450 kg. The administration of Revalor[®]-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor[®]-200 over the use of Revalor[®]-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

HOW SUPPLIED: Box of 4 x 1000 implants

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use, warnings and important safety information.

STORAGE: Store unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 à 450 kg.

L'administration de Revalor[®]-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor[®]-

Version.. sept 9, 2011

200 au lieu de Revalor[®]-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

PRÉSENTATION: Emballage de 4 x 1000 implants

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet, de l'information importante sur les mises en garde et l'innocuité du produit.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/ utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-200 SHIPER LABEL 10 X 100

Revalor[®]-200

DIN: 02254026

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg
200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol
Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

**FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)
POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)**

Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300-450 kg. The administration of Revalor[®]-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor[®]-200 over the use of Revalor[®]-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

HOW SUPPLIED: Box of 10 x 100 implants.

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use, warnings and important safety information.

STORAGE: Store unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 à 450 kg.

L'administration de Revalor[®]-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor[®]-

Versio... sept 9, 2011

200 au lieu de Revalor[®]-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

PRÉSENTATION: Emballage de 10 x 100 implants

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet, de l'information importante sur les mises en garde et l'innocuité du produit.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Version Sept 9, 2011

Revalor[®]-200 ENGLISH INSERT

DIN: 02254026

Revalor[®]-200

Trenbolone acetate 200 mg / estradiol 20 mg

Veterinary Use Only

FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS

(300-450 kg)

DESCRIPTION

Revalor[®]-200 is an implant containing 200 mg of trenbolone acetate and 20 mg estradiol. Each implant consists of 10 small yellow pellets.

Each pellet contains:

Active ingredients: 20 mg trenbolone acetate, 2 mg estradiol.

Non-medicinal ingredients: 4.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 0.25 mg ethylcellulose N200.

THERAPEUTIC CLASSIFICATION

Growth promotant.

INDICATIONS

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300-450 kg. The administration of Revalor[®]-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor[®]-200 over the use of Revalor[®]-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Dosage Form:

One implant containing 200 mg trenbolone acetate and 20 mg estradiol is administered to each animal. The 10 pellets which make up the dosage of Revalor[®]-200 are contained in one division of the multiple dose cartridge. Ten doses are in each cartridge. The cartridge is designed to be used with the Revalor[®] implant gun.

Administration:

a) site of administration

The implant is placed under the skin on the posterior aspect of the ear by means of the

Revalor® implanter available from Intervet Canada Corp. After properly restraining the animal to allow access to the ear, cleanse the skin at the implant needle puncture site. Improperly cleansed skin may result in abscess formation and the subsequent loss of the implant. The implant is placed subcutaneously between the skin and the cartilage on the back, middle third of the ear below the midline (see Figure 1). The implant must not be placed closer to the head than the outer edge of the cartilage ring. The location of needle insertion is at a point corresponding to the center of the ear with the needle directed towards the head, and at least a needle length away from the intended deposition site (see Figure 2). Care should be taken to avoid injuring the major blood vessels or cartilage of the ear.




Figure 1 – Ear of Bovine ready for implantation




Figure 2

Rear view of the bovine ear showing the site for insertion of the implanter needle.

b) method of administration

1. Do not remove the cap (C) of the cartridge containing the implants.
2. Place the cartridge (D) (with the capped end to the front) into slot at the top of the implanter magazine (labelled A on the diagram).
3. Gently push the cartridge into the slot until it clicks into place.
4. The implanter is now ready for use.

5. Take the ear of the animal firmly with the free hand (in the manner shown in Figure 1) and insert the needle into the subcutaneous tissue at the point indicated (Figure 2). Press the trigger (E on Figure 3).
6. The retraction bar will automatically withdraw the needle from the ear aiding in depositing the pellets of the implant in a single row.
7. The gun automatically advances the cartridge to the next implant.
8. When all the implants have been administered, the cartridge will fall out of the bottom of the magazine and may be replaced by a new one.
9. To change the needle, loosen the needle locking nut (labelled F in figure 3) and replace the needle. Tighten the nut finger tight and the implanter is ready for use.




Figure 3
Diagram of the implanter and cartridge.

CAUTIONS

Do not use in animals intended for subsequent breeding.

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

HOW SUPPLIED

Version Sept 9, 2011

Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International
B.V. Used under license.