

Version 9 Sept 2011

**Revalor<sup>ik</sup>-200 INNER LABEL**

Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

**Revalor<sup>®</sup>-200**                      **DIN: 02254026**

trenbolone acetate/acétate de trenbolone 200 mg  
estradiol 20 mg

**10 implants**

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7

1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Version Sept 9, 2011

Revalor<sup>®</sup>-200 OUTER LABEL  
Top panel

**Revalor<sup>®</sup> - 200**  
**Veterinary Use Only**  
**Usage vétérinaire seulement**

LOT:  
EXP:  
Intervet logo

Main panel English

DIN: 02254026

**Revalor<sup>®</sup> - 200**  
Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg  
**Veterinary Use Only**  
**FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)**

**NET CONTENTS:** Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

**WARNINGS**

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

Side panel English

**INDICATIONS**

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300 – 450 kg. The administration of Revalor<sup>®</sup>-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor<sup>®</sup>-200 over the use of Revalor<sup>®</sup>-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

**DESCRIPTION**

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 10 small yellow pellets. Each pellet contains:

**ACTIVE INGREDIENTS:** 20 mg trenbolone acetate and 2 mg estradiol for a total dose per implant of 200 mg trenbolone acetate and 20 mg estradiol.

**NON-MEDICINAL INGREDIENTS:** 4.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 0.25 mg ethylcellulose N200.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

See package insert for complete directions for use.

**STORAGE**

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

## CAUTIONS

Do not use in animals intended for subsequent breeding.

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

**DIN: 02254026**

**Revalor® - 200**

200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

**POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300 – 450 kg)**

**CONTENU NET:** Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

## MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

## INDICATIONS

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 à 450 kg. L'administration de Revalor®-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor®-200 au lieu de Revalor®-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

## DESCRIPTION

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 10 petites pastilles jaunes. Chaque pastille renferme:

**INGRÉDIENTS ACTIFS:** 20 mg d'acétate de trenbolone et 2 mg d'estradiol pour une dose totale de 200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol.

**INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX:** 4,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 0,25 mg éthylcellulose N200.

## POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

Version Sept 9, 2011

**ENTREPOSAGE**

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

**PRÉCAUTIONS**

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

Version: Sept 9, 2011

Revalor<sup>®</sup>-200 SHIPER LABEL 4 X 1000

## Revalor<sup>®</sup>-200

DIN: 02254026

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg  
200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol  
**Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement**

**FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)  
POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)**

Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300-450 kg. The administration of Revalor<sup>®</sup>-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor<sup>®</sup>-200 over the use of Revalor<sup>®</sup>-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

**HOW SUPPLIED:** Box of 4 x 1000 implants

**WARNINGS:** Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** See package insert for complete directions for use, warnings and important safety information.

**STORAGE:** Store unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 à 450 kg.

L'administration de Revalor<sup>®</sup>-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor<sup>®</sup>-

Version.. sept 9, 2011

200 au lieu de Revalor<sup>®</sup>-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

**PRÉSENTATION:** Emballage de 4 x 1000 implants

**MISES EN GARDE:** Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Voir la notice pour le mode d'emploi complet, de l'information importante sur les mises en garde et l'innocuité du produit.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo  
® Registered trademark of / Marque déposée de  
Intervet International B.V. Used under license/ utilisée sous licence

LOT:  
EXP:

Revalor<sup>®</sup>-200 SHIPER LABEL 10 X 100

## Revalor<sup>®</sup>-200

DIN: 02254026

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 20 mg  
200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol  
**Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement**

**FOR FEEDLOT STEERS AND HEIFERS (300-450 kg)  
POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN PARC D'ENGRASSEMENT (300-450 kg)**

### Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers weighing 300-450 kg. The administration of Revalor<sup>®</sup>-200 can result in decreased marbling compared to non-implanted steers and heifers. Studies in the U.S.A. have not demonstrated any advantage to the use of Revalor<sup>®</sup>-200 over the use of Revalor<sup>®</sup>-H for improved weight gain or feed efficiency in feedlot heifers.

**HOW SUPPLIED:** Box of 10 x 100 implants.

**WARNINGS:** Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** See package insert for complete directions for use, warnings and important safety information.

**STORAGE:** Store unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

### Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engrassage pesant de 300 à 450 kg.

L'administration de Revalor<sup>®</sup>-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor<sup>®</sup>-

Versio... sept 9, 2011

200 au lieu de Revalor<sup>®</sup>-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

**PRÉSENTATION:** Emballage de 10 x 100 implants

**MISES EN GARDE:** Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Voir la notice pour le mode d'emploi complet, de l'information importante sur les mises en garde et l'innocuité du produit.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo  
® Registered trademark of / Marque déposée de  
Intervet International B.V. Used under license/utilisée sous licence

LOT:  
EXP:

**Revalor<sup>®</sup>-200 FRENCH INSERT**

**DIN: 02254026**

**Revalor<sup>®</sup>-200**

200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg  
d'estradiol

**Usage vétérinaire seulement  
POUR BOUVILLONS ET GÉNISSES EN  
PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)**

**DESCRIPTION**

Revalor<sup>®</sup>-200 est un implant contenant 200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol. Chaque implant est composé de 10 petites pastilles jaunes.

Chaque pastille renferme:

Ingrédients actifs: 20 mg acétate de trenbolone, 2 mg estradiol.

Ingrédients non-médicinaux: 4,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 0,25 mg éthylcellulose N200.

**CLASSE THÉRAPEUTIQUE**

Stimulant de croissance.

**INDICATIONS**

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 - 450 kg. L'administration de Revalor<sup>®</sup>-200 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non-implantés. Les études faites aux É.-U. n'ont démontré aucun avantage à utiliser Revalor<sup>®</sup>-200 au lieu de Revalor<sup>®</sup>-H pour l'amélioration du gain de poids ou de la conversion alimentaire chez les génisses en parc d'engraissement.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

**Forme pharmaceutique:**

Un implant contenant 200 mg d'acétate de trenbolone et 20 mg d'estradiol est administré à chaque animal. Les 10 pastilles formant la posologie de Revalor<sup>®</sup>-200 sont contenues dans une division de la cartouche multi-doses. Chaque cartouche contient dix doses. La cartouche est

conçue pour être utilisée avec l'applicateur Revalor®.

### Administration

#### a) site d'implantation

L'implant est inséré sous la peau de la partie dorsale de l'oreille à l'aide de l'applicateur Revalor® fourni par Intervet Canada Corp. Après avoir correctement immobilisé l'animal pour permettre l'accès à l'oreille, bien nettoyer la peau au site d'implantation. Une peau souillée peut occasionner la formation d'abcès et la perte éventuelle de l'implant. L'implant est introduit dans le tissu sous-cutané entre la peau et le cartilage au tiers moyen de la face dorsale de l'oreille sous la ligne médiane (voir figure 1). L'implant ne doit pas être placé près du bord de l'anneau cartilagineux que l'on peut palper au premier tiers (base) de l'oreille. Le point d'insertion de l'aiguille se situe au centre de l'oreille en orientant l'aiguille vers la tête et à au moins une longueur d'aiguille du site de dépôt de l'implant (voir figure 2). S'assurer de ne pas endommager les vaisseaux sanguins majeurs ou le cartilage de l'oreille.




Figure 1  
Oreille de bovin prête pour l'implantation.





Figure 2  
Vue de la face dorsale de l'oreille de bovin montrant le site d'insertion de l'aiguille.

#### b) mode d'emploi

1. Ne pas enlever le capuchon (C) de la cartouche contenant les implants.

2. Placer la cartouche (D) (le capuchon en avant) dans la fente au-dessus du magasin de l'applicateur (A sur le diagramme).
3. Pousser doucement la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. L'applicateur est maintenant prêt à être utilisé.
5. Avec la main libre, prendre fermement l'oreille (tel que montré sur la figure 1) et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané au point indiqué (figure 2). Presser la gâchette (E sur la figure 3).
6. Automatiquement, la barre de rétraction retirera l'aiguille de l'oreille tout en déposant les pastilles de l'implant sur une seule rangée.
7. L'applicateur avance automatiquement la cartouche à l'implant suivant.
8. Lorsque tous les implants ont été administrés, la cartouche est éjectée du magasin et peut être remplacée par une nouvelle.
9. Pour remplacer l'aiguille, desserrer l'écrou de verrouillage (F sur la figure 3) et remplacer l'aiguille. Serrer l'écrou avec les doigts et l'applicateur est de nouveau prêt pour l'utilisation.

Figure 3  
Diagramme de  
l'applicateur  
et d'une cartouche.



### PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

### MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

### ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version Sept 9, 2011

**PRÉSENTATION**

Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo  
® Marque déposée d'Intervet International B.V.,  
utilisée sous licence.

9 Septembre 2011