

Version 9 Sept 2011

Revalor[®] - G INNER LABEL

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

Revalor[®] - G **DIN: 02246207**

trenbolone acetate/acétate de trenbolone 40 mg

estradiol 8 mg

10 implants

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7

1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Version 9 September 2011

Revalor[®]-G outer label
Top panel

Revalor[®]-G
Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

LOT:
EXP:

Intervet logo

Main panel English

DIN: 02246207

Revalor[®]-G
Trenbolone acetate 40 mg / estradiol 8 mg
Veterinary Use Only

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

NET CONTENTS: Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

Side panel English

INDICATIONS

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

DESCRIPTION

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 2 small yellow pellets. Each pellet contains:

ACTIVE INGREDIENTS: 20 mg trenbolone acetate and 4 mg estradiol for a total dose per implant of 40 mg trenbolone acetate and 8 mg estradiol.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: 6.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 1.25 mg ethyl cellulose N200.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

See package insert for complete directions for use.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

CAUTIONS

Not for use in animals intended for subsequent breeding.

Version 9 September 2011

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

DIN: 02246207

Revalor®-G

40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

**POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSEMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg)
ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (215-330 kg)**

CONTENU NET: Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

INDICATIONS

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

DESCRIPTION

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 2 petites pastilles jaunes. Chaque pastille renferme:

INGRÉDIENTS ACTIFS: 20 mg d'acétate de trenbolone et 4 mg d'estradiol pour une dose totale par implant de 40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol.

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX: 6,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 1,25 mg éthylcellulose N200.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

Version 9 September 2011

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

Version Sept 9, 2011

Revalor[®]-G SHIPPER LABEL 4 x 1000

Revalor[®]-G

DIN: 02246207

Trenbolone acetate 40 mg /estradiol 8 mg
40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol
Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

Left panel, English

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 4 x 1000 implants.

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSEMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg) ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (215-330 kg)

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 4 x 1000 implants.

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version Sept 9, 2011

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/ utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-G SHIPER LABEL 10x100

Revalor[®]-G

DIN: 02246207

Trenbolone acetate 40 mg /estradiol 8 mg
40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol
Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

Left panel, English

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 10 x 100 implants

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSEMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg) ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (215-330 kg)

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 10 x 100 implants

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version 9 Sept, 2011

Far right panel
Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/ utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-G ENGLISH INSERT

DIN: 02246207

Revalor[®]-G

Trenbolone acetate 40 mg /estradiol 8 mg

Veterinary Use Only

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg)

AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

DESCRIPTION

Revalor[®]-G is an implant containing 40 mg of trenbolone acetate and 8 mg estradiol. Each implant consists of 2 small yellow pellets.

Each pellet contains:

Active ingredients: 20 mg trenbolone acetate, 4 mg estradiol.

Non-medicinal ingredients: 6.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 1.25 mg ethyl cellulose N200.

THERAPEUTIC CLASSIFICATION

Growth promotant.

INDICATIONS

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Dosage form:

One implant containing 40 mg trenbolone acetate and 8 mg estradiol is administered to each animal. The 2 pellets which make up the dosage of Revalor[®]-G are contained in one division of the multiple dose cartridge. Ten doses are in each cartridge. The cartridge is designed to be used with the Revalor[®] implant gun.

Administration:

a) site of administration

The implant is placed under the skin on the posterior aspect of the ear by means of the Revalor[®] implanter available from Intervet Canada Corp. After properly restraining the animal to allow access to the ear, cleanse the skin at the implant needle puncture site. Improperly cleansed skin may result in abscess formation and the subsequent loss of the implant. The implant is placed subcutaneously between the

skin and the cartilage on the back, middle third of the ear below the midline (see Figure 1). The implant must not be placed closer to the head than the outer edge of the cartilage ring. The location of needle insertion is at a point corresponding to the center of the ear with the needle directed towards the head, and at least a needle length away from the intended deposition site (see Figure 2). Care should be taken to avoid injuring the major blood vessels or cartilage of the ear.




Figure 1 Ear of bovine ready for implantation.




Figure 2
Rear view of the bovine ear showing the site for insertion of the implanter needle.

b) method of administration

1. Do not remove the cap (C) of the cartridge containing the implants.
2. Place the cartridge (D) (with the capped end to the front) into slot at the top of the implanter magazine (labelled A on the diagram).
3. Gently push the cartridge into the slot until it clicks into place.
4. The implanter is now ready for use.
5. Take the ear of the animal firmly with the free hand (in the manner shown in Figure 1) and insert the needle into the subcutaneous tissue at the point indicated (Figure 2). Press the trigger (E on Figure 3).
6. The retraction bar will automatically withdraw the needle from the ear aiding in depositing the pellets of the implant in a single row.

7. The gun automatically advances the cartridge to the next implant.
8. When all the implants have been administered, the cartridge will fall out of the bottom of the magazine and may be replaced by a new one.
9. To change the needle, loosen the needle locking nut (labelled F in Figure 3) and replace the needle. Tighten the nut finger tight and the implanter is ready for use.




Figure 3
Diagram of the implanter and cartridge.

CAUTIONS

Not for use in animals intended for subsequent breeding.

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

HOW SUPPLIED

Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of Intervet International B.V.
Used under license.

Version 9 Sept., 2011

September 9, 2011