

Inner label Revalor®-XS

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

**Revalor®-XS**      **DIN: 02316994**

trenbolone acetate/acétate de trenbolone 200 mg  
estradiol 40 mg

**10 implants**

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Version 9 Sept 2011

**Revalor<sup>®</sup>-XS OUTER LABEL**  
Top panel

**Revalor<sup>®</sup>-XS**  
**Veterinary Use Only**  
**Usage vétérinaire seulement**

LOT:  
EXP:  
Intervet logo

Main panel English

**DIN: 02316994**

**Revalor<sup>®</sup>-XS**  
Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 40 mg  
**Veterinary Use Only**  
**FOR FEEDLOT STEERS (225-350 kg)**

**NET CONTENTS:** Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

**WARNINGS**

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

Side panel English

**INDICATIONS**

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency for up to 200 days in feedlot steers weighing 225-350 kg.

**DESCRIPTION**

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 10 small yellow pellets composed of four uncoated and six with a specialized coating formula for delayed and prolonged release. Each pellet contains:

**ACTIVE INGREDIENTS:** 20 mg trenbolone acetate, 4 mg estradiol for a total dose per implant of 200 mg trenbolone acetate and 40 mg estradiol.

**NON-MEDICINAL INGREDIENTS:** 6.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 1.25 mg ethylcellulose N200, 1.75 mg poly-(DL-lactide-co-glycolide) 65:35, 0.1 mg colloidal silica anhydrous.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

See package insert for complete directions for use.

**STORAGE**

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

**CAUTIONS**

For use in feedlot steers only. Do not use in animals intended for subsequent breeding.

Version 9 Sept 2011

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

**DIN: 02316994**

**Revalor<sup>®</sup>-XS**

200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol

**Usage vétérinaire seulement**

**POUR BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (225-350 kg)**

**CONTENU NET:** Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

**MISES EN GARDE**

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

**INDICATIONS**

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire durant 200 jours des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 225 à 350 kg.

**DESCRIPTION**

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 10 petites pastilles jaunes dont quatre non enrobées et six enrobées d'une formule de revêtement spécial assurant un relâchement à effet prolongé. Chaque pastille renferme:

**INGRÉDIENTS ACTIFS:** 20 mg d'acétate de trenbolone et 4 mg d'estradiol pour une dose totale de 200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol.

**INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX:** 6,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 1,25 mg éthylcellulose N200, 1,75 mg poly-(DL-lactide-co-glycolide) 65:35, 0,1 mg silice colloïdale anhydre.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

**ENTREPOSAGE**

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

**PRÉCAUTIONS**

Version 9 Sept 2011

Pour usage chez les bouvillons en parc d'engraissement seulement. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo  
® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

SHIPER CARTON LABEL 4x1000

**Revalor<sup>®</sup>-XS**

**DIN: 02316994**

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 40 mg  
200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol  
**Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement**

**FOR FEEDLOT STEERS (225-350 kg)**  
**POUR BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (225-350 kg)**

Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency for up to 200 days in feedlot steers weighing 225-350 kg.

**HOW SUPPLIED:** Box of 4 x 1000 implants.

**WARNINGS:** Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** See package insert for complete directions for use.

**STORAGE:** Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire durant 200 jours des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 225 à 350 kg.

**PRÉSENTATION:** Emballage de 4 x 1000 implants

**MISES EN GARDE:** Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel  
Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of/ Marque déposée de  
Intervet International B.V., Used under license/ utilisée sous licence.

LOT:  
EXP:

SHIPER LABEL10x100

**Revalor<sup>®</sup>-XS**

**DIN: 02316994**

Trenbolone acetate 200 mg /estradiol 40 mg  
200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol  
**Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement**

**FOR FEEDLOT STEERS (225-350 kg)**  
**POUR BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (225-350 kg)**

Left panel, English

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency for up to 200 days in feedlot steers weighing 225-350 kg.

**HOW SUPPLIED:** Box of 10 x 100 implants.

**WARNINGS:** Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** See package insert for complete directions for use.

**STORAGE:** Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire durant 200 jours des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 225 à 350 kg.

**PRÉSENTATION:** Emballage de 10 x 100 implants

**MISES EN GARDE:** Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel  
Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of/ Marque déposée de  
Intervet International B.V., Used under license/ utilisée sous licence.

LOT:  
EXP:

Version 9 Sept, 2011

Revalor®-XS FRENCH INSERT

**DIN: 02316994**

**Revalor®-XS**

200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol

**Usage vétérinaire seulement**

**POUR BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT  
(225-350 kg)**

#### **DESCRIPTION**

Revalor®-XS est un implant contenant 200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol. Chaque implant est composé de 10 petites pastilles jaunes dont quatre non enrobées et six enrobées d'une formule de revêtement spécial assurant un relâchement à effet prolongé.

Chaque pastille renferme:

Ingrédients actifs: 20 mg acétate de trenbolone, 4 mg estradiol.

Ingrédients non-médicinaux: 6,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 1,25 mg éthylcellulose N200, 1,75 mg poly-(DL-lactide-co-glycolide) 65:35, 0,1 mg silice colloïdale anhydre.

#### **CLASSE THÉRAPEUTIQUE**

Stimulant de croissance.

#### **INDICATIONS**

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire durant 200 jours des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 225 à 350 kg.

#### **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

##### **Forme pharmaceutique:**

Un implant contenant 200 mg d'acétate de trenbolone et 40 mg d'estradiol est administré à chaque animal. Les 10 pastilles formant la posologie de Revalor®-XS sont contenues dans une division de la cartouche multi-doses. Chaque cartouche contient dix doses. La cartouche est conçue pour être utilisée avec l'applicateur Revalor®.

##### **Administration:**

###### **a) site d'implantation**

L'implant est inséré sous la peau de la partie dorsale de l'oreille à l'aide de l'applicateur Revalor® fourni par Intervet Canada Corp. Après avoir correctement immobilisé l'animal pour permettre l'accès à l'oreille, bien nettoyer la peau au site d'implantation. Une peau souillée peut occasionner la formation d'abcès et la perte

éventuelle de l'implant. L'implant est introduit dans le tissu sous-cutané entre la peau et le cartilage au tiers moyen de la face dorsale de l'oreille sous la ligne médiane (voir figure 1). L'implant ne doit pas être placé près du bord de l'anneau cartilagineux que l'on peut palper au premier tiers (base) de l'oreille. Le point d'insertion de l'aiguille se situe au centre de l'oreille en orientant l'aiguille vers la tête et à au moins une longueur d'aiguille du site de dépôt de l'implant (voir figure 2). S'assurer de ne pas endommager les vaisseaux sanguins majeurs ou le cartilage de l'oreille.




Figure 1  
Oreille de bovin prête pour l'implantation.




Figure 2  
Vue de la face dorsale de l'oreille de bovin montrant le site d'insertion de l'aiguille.


#### **b) mode d'emploi**

1. Ne pas enlever le capuchon (C) de la cartouche contenant les implants.
2. Placer la cartouche (D) (le capuchon en avant) dans la fente au-dessus du magasin de l'applicateur (A sur le diagramme).
3. Pousser doucement la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. L'applicateur est maintenant prêt à être utilisé.
5. Avec la main libre, prendre fermement l'oreille (tel que montré sur la figure 1) et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané au point indiqué (figure 2). Presser la gâchette (E sur la figure 3).
6. Automatiquement, la barre de rétraction retirera l'aiguille de l'oreille tout en déposant les pastilles de l'implant sur une seule rangée.
7. L'applicateur avance automatiquement la cartouche à l'implant suivant.

8. Lorsque tous les implants ont été administrés, la cartouche est éjectée du magasin et peut être remplacée par une nouvelle.

9. Pour remplacer l'aiguille, desserrer l'écrou de verrouillage (F sur la figure 3) et remplacer l'aiguille. Serrer l'écrou avec les doigts et l'applicateur est de nouveau prêt pour l'utilisation.

Figure 3  
Diagramme de  
l'applicateur  
et d'une cartouche.



### PRÉCAUTIONS

Pour usage chez les bouvillons en parc d'engraissement seulement. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

### MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

### ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

### PRÉSENTATION

Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.  
16750, route Transcanadienne  
Kirkland, QC H9H 4M7  
1 888 306-0069

Intervet logo  
® Marque déposée d'Intervet International B.V.,  
utilisée sous licence.