

C26500

DIN 02228386

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

CYDECTIN®**Moxidectin****(Solution à verser pour bovins de boucherie et bovins laitiers)**

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

INTRODUCTION

La solution à verser CYDECTIN® renferme du moxidectin, un endectocide de seconde génération appartenant à la même classe de composés que la milbémycine. Administré à raison de 0,5 mg/kg de poids, le moxidectin est très efficace contre un large spectre d'endoparasites et d'ectoparasites économiquement importants chez les bovins de boucheries et les bovins laitiers, y inclus vaches laitières en lactation.

Des études portant sur son mode d'action indiquent que CYDECTIN® élimine les parasites en interférant avec la neurotransmission des canaux chlorure dépendant de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA) ou du glutamate, provoquant ainsi la paralysie des organismes nuisibles.

COMPOSITION

La solution à verser CYDECTIN® est une solution violette prête à l'utilisation, qui renferme 5 mg de moxidectin au mL (0,5% poids/volume).

INDICATIONS

La solution à verser CYDECTIN® est indiquée pour le traitement des bovins en santé de tout âge et de toute race incluant les vaches gestantes y compris les vaches gravides, les taureaux reproducteurs et les vaches laitières en lactation, qui sont parasités par les vers ronds gastro-intestinaux (incluant les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), les vers du poumon, les hypodermes, les mites de la gale, et les poux suceurs et broyeurs suivants.

VERS ROUNDS GASTRO-INTESTINAUX

<i>Ostertagia ostertagi</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement, 4e stade inhibé
<i>Haemonchus placei</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Trichostrongylus axei</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Trichostrongylus colubriformis</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Cooperia oncophora</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Cooperia pectinata</i>	Adultes
<i>Cooperia punctata</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Cooperia surabada</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	Adultes
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Nematodirus helvetianus</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement
<i>Trichuris discolor</i>	Adultes, larves au 4e stade de développement

VERS PULMONAIRES

Dictyocaulus viviparus Adultes, larves au 4e stade de développement

MITES DE LA GALE

Chorioptes bovis
Psoroptes ovis (*Psoroptes communis* var. *bovis*)
Sarcoptes bovis

POUX SUCEURS ET BROYEURS

Damalinea (Bovicola) bovis
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus

HYPODERMES (Larves en Migration)

Hypoderma lineatum
Hypoderma bovis

Persistence : La solution à verser CYDECTIN® prévient une réinfestation par *Haemonchus placei* pendant 14 jours, par *Oesophagostomum radiatum* et *Ostertagia ostertagi* pendant au moins 28 jours et par *Dictyocaulus viviparus* pendant au moins 42 jours après une seule application au dosage recommandé. Des données de recherche, basées sur l'excrétion fécale d'oocystes de nématodes (comptages d'OPG), sur le comptage de poux et sur une simulation contrôlée de pluie, indiquent que l'application de la solution à verser sur une peau mouillée ou l'application avant un épisode de pluie typique n'affecte pas l'efficacité du produit.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN® pour bovins, à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du garrot jusqu'à l'attache de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

La solution à verser CYDECTIN® pour bovins est prête à être utilisée. Un certain nombre d'applicateurs ont été testés avec la solution à verser CYDECTIN® pour bovins et plusieurs d'entre eux s'avèrent adéquats. L'utilisation d'un applicateur est recommandée pour les flacons de 2,5, 5 et 10 litres et lorsqu'un grand groupe d'animaux doit être traité.

TABLEAU POSOLOGIQUE

Poids vif (kg)	Dose (mL)	Doses par flacon				Poids vif (kg)	Dose (mL)	Doses par flacon			
		1 L	2,5 L	5 L	10 L			1 L	2,5 L	5 L	10 L
40	4	250	625	1250	2500	250	25	40	100	200	400
50	5	200	500	1000	2000	300	30	33	83	166	332
60	6	166	416	833	1666	350	35	28	71	142	284
70	7	142	357	714	1428	400	40	25	62	125	250
80	8	125	312	625	1250	450	45	22	55	111	222
90	9	111	277	555	1110	500	50	20	50	100	200
100	10	100	250	500	1000	550	55	18	45	90	180
110	11	90	227	454	908	600	60	16	41	83	166
120	12	83	208	416	832	650	65	15	38	76	152
130	13	76	192	384	768	700	70	14	35	70	140
140	14	71	178	357	714	750	75	13	33	66	132
150	15	66	166	333	666	800	80	12	31	62	124
200	20	50	125	250	500	850	85	11	29	58	116

Dans le cas où les animaux risquent d'être réinfestés, il est recommandé d'établir un programme antiparasitaire stratégique.

INNOCUITÉ

La solution à verser CYDECTIN® pour bovins a un large spectre d'activité et une marge de sécurité élevée de 10x la dose recommandée de 500 µg de moxidectin par kg de poids vif. Cette marge de sécurité est considérée valable pour les bovins de la plupart des races, types ou âges. Elle peut être administrée sans risque aux animaux reproducteurs ou aux animaux de remplacement élevés à des fins reproductives.

La solution à verser CYDECTIN® ne cause pas d'irritation de la peau ou de dommage au cuir lorsqu'utilisée tel que recommandé. Elle n'est pas nocive pour les yeux des bovins.

PRÉSENTATION

La solution à verser CYDECTIN® pour bovins est présentée en flacons de plastique de 1 L, 2,5 L, 5 L et 10 L.

ENTREPOSAGE

La solution à verser CYDECTIN® pour bovins peut être entreposé à une température variant de 4 à 25 °C. ÉVITER LE GEL. Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

PRÉCAUTIONS

1. Ne pas appliquer en même temps que toute autre solution à verser.
2. Appliquer sur une peau saine. Éviter l'application sur des croutes de gale, plaie ou corps étranger.
3. Éliminer de façon sécuritaire tout contenant ou contenu résiduel (p. ex., enfouir ou incinérer). Enfourir loin de tout cours d'eau.
4. Pour éviter les réactions secondaires consécutives au traitement de l'infestation par *Hypoderma* spp., consulter un vétérinaire pour connaître le moment idéal de traitement.
5. Pour usage externe seulement. Ne pas administrer oralement ou parentéralement à un animal.

MISES EN GARDE

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les vaches de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR — Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN® à 0,5% chez les bovins laitiers.

12170
C26500

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
 5180 South Service Road
 Burlington (Ontario) L7L 5H4

Boehringer Ingelheim	Revision 1	Template # ... 181
	Operator Ish	Dimensions .. 2-1/2" x 3-1/2"
	Date 04Aug10	(special shape)
	Product ID# . C2654L	File Path..... V1/PF/BI Labeling/ C2654L
	Resource #.. L2654C	PDF..... 05Aug10 jaf
	Product Cydectin	Rev Level..... L
Type/Size ... Label (back) 1L		

- BLACK
- PMS 1795
- COOL GREY 3
- PMS 322
- VARNISH

Click here with mover tool to bring varnish plate to front

SEPARATIONS
CHECKED
by hal / 26Jan10

DIN 02228386

USAGE VÉTÉRIINAIRE SEULEMENT

CYDECTIN[®]

**Moxidectin (Solution à verser pour bovins
de boucherie et bovins laitiers)**
(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes
chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

MODE D'USAGE

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai de six semaines (6 semaines après le dernier traitement à l'aide de ce médicament).
2. Ne pas utiliser chez les vaches de lait. Ne pas utiliser chez les vaches de moins de 14 semaines d'âge élevées pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des vaches.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lire attentivement les informations complémentaires qui accompagnent ce produit. Assurer particulièrement de lire attentivement le mode d'emploi et les informations de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitières.




USAGE EXTERNE SEULEMENT
Garder à l'abri de la lumière. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.
Garder à l'abri de la chaleur. Éviter l'exposition aux hautes températures.

Posologie et administration - La solution à verser CYDECTIN[®] à usage externe vétérinaire, devrait être appliquée sur une peau propre, sèche et sans lésions, de préférence sur le flanc de la vache.
Utiliser 1 mL, par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

Vous ne devez pas l'utiliser pour administrer les informations sur la posologie et l'administration.

Contenu Net
1 L

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



C2654L

Boehringer
Ingelheim

Revision 1	Type/Size Label (back) 2.5L
Operator Ish	Template # ... 182
Date 04Aug10	Dimensions .. 6" x 5.592"
Product ID# . C2656L	File Path V1/PF/BI Labeling/ C2656L
Resource # . L2656C	PDF 05Aug10 jaf
Product Cydectin	Rev Level L

BLACK

PMS 1795

COOL GREY 3

PMS 322

VARNISH

SEPARATIONS
CHECKED
by hal / 26Jan10

DIN 02228386

USAGE
VÉTÉRINAIRE
SEULEMENT

CYDECTIN[®]

**Moxidectin (Solution à
verser pour bovins de
boucherie et bovins laitiers)**

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitiers.

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN[®], à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du garrot jusqu'à l'attache de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

Voir le dépliant pour obtenir toutes les informations sur la posologie et l'administration.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL. Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



Contenu Net 2,5 L



Boehringer
Ingelheim

C2656L

Boehringer
Ingelheim

Revision 1
Operator Ish
Date 04Aug10
Product ID#. C2658K
Resource #.. L2658C
Product..... Cydectin
Type/Size ... Label (back) 5L

Template # ... 155
Dimensions .. 7.059" x 6.579"
File Path..... V1/PF/BI Labeling/
C2658K
PDF..... 05Aug10 jaf
Rev Level..... K

BLACK

PMS 1795

COOL GREY 3

PMS 322

VARNISH

SEPARATIONS
CHECKED
by hal / 26Jan10

DIN 02228386

**USAGE
VÉTÉRINAIRE
SEULEMENT**

CYDECTIN[®]

**Moxidectin
(Solution à verser pour bovins
de boucherie et bovins laitiers)**

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites
internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitiers.

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN[®], à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du garrot jusqu'à l'attache de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

Voir le dépliant à l'intérieur pour obtenir toutes les informations sur la posologie et l'administration.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL.

Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



Contenu Net 5 L



Boehringer
Ingelheim

12160

C2658K

Boehringer
Ingelheim

Revision 1
Operator Ish
Date 04Aug10
Product ID# . C2659M
Resource # . L2659C
Product Cydectin
Type/Size ... Label / 10L

Template # ... 131
Dimensions .. 5-3/4" x 7-1/4"
File Path V1/PF/BI Labeling/
C2659M
PDF 06Aug10 hal
Rev Level M

BLACK

PMS 1795

COOL GREY 3

PMS 322

VARNISH

SEPARATIONS
CHECKED
by hal / 26jan10

Click here with mover tool to bring varnish plate to front

DIN 02228386

VETERINARY USE ONLY / USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

CYDECTIN®

Moxidectin (Pour-On for Beef and Dairy Cattle) Moxidectin (Solution à verser pour bovins de boucherie et bovins laitiers)

(Each mL contains 5 mg of moxidectin) / (Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle, including lactating dairy cows.

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

EXTERNAL USE ONLY / USAGE EXTERNE SEULEMENT

WARNINGS:

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 15 days after the latest treatment with this drug.
2. Do not use in milk-fed calves. Do not use in calves less than 14 weeks of age to be processed for veal.
3. Keep this and all drugs out of reach of children.
4. Avoid direct contact with skin and eyes.

NOTE TO USER – When used according to label directions, no milk withholding time is required following the application of CYDECTIN Pour-On on dairy cattle.

Dosage and administration: EXTERNAL USE ONLY. CYDECTIN® Pour-On should be applied to healthy skin along the top of the back from the withers to the base of the tail. Use 1 mL per 10 kg body weight to administer a dose of 0.5 mg/kg.

See package insert for complete information on dosage and administration.
Store between 4-25°C. AVOID FREEZING.
Protect from light. Store bottle in box.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
5180 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5H4



MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR – Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0.5% chez les bovins laitiers.

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN®, à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du garrot jusqu'à l'attache de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

Voir le dépliant pour obtenir toutes les informations sur la posologie et l'administration.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL.
Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4

Net Contents/Contenu Net
10 L



Boehringer
Ingelheim

Lot:
Exp. Date:

C2659M

12/60

Boehringer
Ingelheim

Revision 1
Operator lsh
Date 05Aug10
Product ID# .. CC2653L
Resource # ... 8548
Product Cydectin
Type/Size..... Carton / 1 L

Template # ... 758
Dimensions ... 5-3/8" x 2-3/4" x 9-19/32"
File Path V1/PF/BI Labeling/
CC2653L
PDF 06Aug10 hal
Rev Level L

BLACK
PMS 1795
CORN PRNT 2
PMS 322
PMS 488888 001

SEPARATIONS
CHECKED BY
hal/26Jan10

50265320

Moxidectin
(Solution à verser
pour bovins de
boucherie et
bovins laitiers)



Moxidectin
(Pour-On for
Beef and
Dairy Cattle)

CYDECTIN®

DIN 02228386

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

CYDECTIN®

**Moxidectin
(Solution à verser pour
bovins de boucherie et
bovins laitiers)**

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables
aux parasites internes et externes chez les bovins,
y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitiers.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL.
Garder à l'abri de la lumière.
Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



Boehringer
Ingelheim

Contenu Net
1 L

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN® à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du grand pectoral à l'arrière de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids vif pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

TABLÉAU POSOLOGIQUE

Poids vif (kg)	Dose par race		Poids vif (kg)	Dose par race	
	(mL)	(1.1)		(mL)	(1.1)
40	4	250	250	25	40
50	5	250	300	30	33
60	6	156	250	25	29
70	7	142	400	40	25
80	8	125	400	40	22
90	9	111	500	50	20
100	10	100	550	55	18
110	11	90	600	60	16
120	12	83	650	65	15
130	13	76	700	70	14
140	14	71	750	75	13
150	15	66	800	80	12
200	20	50	850	85	11

Voir le dépliant à l'intérieur pour obtenir toutes les informations sur le posologie et l'administration.

Voir le dessous ou le côté pour le numéro de lot et la date de péremption.



Net Contents/Contenu Net
1 L

VETERINARY USE ONLY

DIN 02228386

CYDECTIN®

**Moxidectin
(Pour-On for Beef
and Dairy Cattle)**

(Each mL contains 5 mg of moxidectin)

For the treatment of infections and infestations due
to internal and external parasites in cattle,
including lactating dairy cows.

EXTERNAL USE ONLY

WARNINGS:

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 15 days after the latest treatment with this drug.
2. Do not use in milk-fed calves. Do not use in calves less than 14 weeks of age to be processed for veal.
3. Keep this and all drugs out of reach of children.
4. Avoid direct contact with skin and eyes.

NOTE TO USER - When used according to label directions, no milk withholding time is required following the application of CYDECTIN Pour-On on dairy cattle.

Store between 4-25°C. AVOID FREEZING.
Protect from light. Store bottle in box.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
5180 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5H4



Net Contents
1 L

Boehringer
Ingelheim

Dosage and administration: EXTERNAL USE ONLY. CYDECTIN® Pour-On should be applied to healthy skin along the top of the back, from the withers to the base of the tail. Use 1 mL per 10 kg body weight to administer a dose of 0.5 mg/kg.

DOSAGE TABLE

Body weight (kg)	Dose per head		Body weight (kg)	Dose per head	
	(mL)	(1.1)		(mL)	(1.1)
40	4	250	250	25	40
50	5	200	300	30	33
60	6	166	350	35	28
70	7	142	400	40	25
80	8	125	450	45	22
90	9	111	500	50	20
100	10	100	550	55	18
110	11	90	600	60	16
120	12	83	650	65	15
130	13	76	700	70	14
140	14	71	750	75	13
150	15	66	800	80	12
200	20	50	850	85	11

See package insert for complete information on dosage and administration.

See bottom or side for lot number and expiration date.



8548
12170
CC2653L
8548
CC2653L
8548
CC2653L

Boehringer Ingelheim
 Part No. 1
 Description 104kg/10
 Product ID# CC2855L
 Revision #..... 054
 Type/Date Carbo 7.2.1 L

Template # 782
 Dimensions - 8.18" x 3.91"
 x 11.98"
 File Path Y:\OFFICE Labeling
 CC2855L
 Product Code 084kg10 ml
 Rev Level L

BLACK
 WHITE
 PMS 325
 PMS 225

SEPARATIONS
 CHECKED by
 HAVZJaa10

Moxidectin
 (Solution à verser pour bovins de
 boucherie et bovins laitiers)



Moxidectin
 (Pour-On
 for
 Beef and
 Dairy Cattle)

CYDECTIN®

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

DIN 02228386

CYDECTIN®

Moxidectin
(Solution à verser pour bovins
de boucherie et bovins laitiers)

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder ce produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitiers.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL.
Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



Boehringer
Ingelheim

Contenu Net
2,5 L

Posologie et administration : La solution à verser CYDECTIN® à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau saine, le long du dos, du garrot jusqu'à l'attache de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids et pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

DOSAGE TABLE

Poids vil (kg)	Dose (mL)	Dose (µg/kg) (2,3 L)	Poids vil (kg)	Dose (mL)	Dose (µg/kg) (2,3 L)
45	4	625	25	25	1000
55	5	500	30	30	83
65	6	416	35	35	71
75	7	357	40	40	62
85	8	312	45	45	55
95	9	277	50	50	50
105	10	250	55	55	45
115	11	227	60	60	41
125	12	208	65	65	38
135	13	192	70	70	35
145	14	179	75	75	33
155	15	166	80	80	31
200	20	125	85	85	29

Voir le sélecteur à l'arrière pour obtenir toutes les informations sur la posologie et l'administration.
Voir le dépliant ou le CSM pour le numéro de lot et la date de péremption.



Net Contents/Contenu Net
2,5 L

VETERINARY USE ONLY

DIN 02228386

CYDECTIN®

Moxidectin
(Pour-On for
Beef and Dairy Cattle)

(Each mL contains 5 mg of moxidectin)

For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle, including lactating dairy cows.

EXTERNAL USE ONLY

WARNINGS:

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 15 days after the latest treatment with this drug.
2. Do not use in milk-fed calves. Do not use in calves less than 14 weeks of age to be processed for veal.
3. Keep this and all drugs out of reach of children.
4. Avoid direct contact with skin and eyes.

NOTE TO USER - When used according to label directions, no milk withholding time is required following the application of CYDECTIN Pour-On on dairy cattle.

Store between 4-25°C. AVOID FREEZING.
Protect from light. Store bottle in box.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
5180 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5H4



Net Contents
2.5 L

CYDECTIN®

Moxidectin
(Pour-On for
Beef and Dairy Cattle)

Dosage and administration: EXTERNAL USE ONLY. CYDECTIN® Pour-On should be applied to healthy skin along the top of the back from the withers to the base of the tail. Use 1 mL per 10 kg body weight to administer a dose of 0.5 mg/kg.

DOSAGE TABLE

Body weight (kg)	Dose (mL)	Dose (µg/kg) (2,3 L)	Body weight (kg)	Dose (mL)	Dose (µg/kg) (2,3 L)
45	4	625	25	25	1000
55	5	500	30	30	83
65	6	416	35	35	71
75	7	357	40	40	62
85	8	312	45	45	55
95	9	277	50	50	50
105	10	250	55	55	45
115	11	227	60	60	41
125	12	208	65	65	38
135	13	192	70	70	35
145	14	179	75	75	33
155	15	166	80	80	31
200	20	125	85	85	29

See package insert for complete information on dosage and administration.

See bottom or side for lot number and expiration date.



Boehringer
Ingelheim

8549
 12160
 CC2855L
 8549
 CC2855L
 8549
 CC2855L

Boehringer Ingelheim
 Revlon 2
 Couleur noir
 Date 05Ag10
 Product ID# CC2657L
 Référence # 8564
 Produit Cydectin
 Type/Size Carton / 5 L
 Template # 773
 Dimensions 9.811" x 5.813" x 13.157"
 File Path V:\PDS Labeling
 CC2657L
 PDF 11Aug10
 Rev Level L
 BLACK
 PMS 1795
 PMS 122
 SEPARATIONS CHECKED by
 10/27/10

Moxidectin (Solution à verser pour bovins de boucherie et bovins laitiers)



Moxidectin (Pour-On for Beef and Dairy Cattle)

CYDECTIN

DIN 02228386

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

CYDECTIN

Moxidectin
(Solution à verser pour bovins de boucherie et bovins laitiers)

(Chaque mL renferme 5 mg de moxidectin)

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins, y inclus les vaches laitières en lactation.

USAGE EXTERNE SEULEMENT

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 15 jours après le dernier traitement à l'aide de ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les veaux de lait. Ne pas utiliser chez les veaux de moins de 14 semaines d'âge élevés pour la production de viande de veau.
3. Garder le produit, ainsi que tout autre médicament de la portée des enfants.
4. Éviter le contact direct avec le nez ou les yeux.

AVIS À L'UTILISATEUR - Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives de l'étiquette, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser CYDECTIN à 0,5% chez les bovins laitiers.

Garder entre 4 et 25 °C. ÉVITER LE GEL.
Garder à l'abri de la lumière. Entreposer la bouteille dans la boîte.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington (Ontario) L7L 5H4



Contenu Net
5 L



Net Contents/Contenu Net
5 L

Poissage et administration : La solution à verser CYDECTIN® à usage externe seulement, devrait être appliquée sur une peau sèche. Le long du dos du animal jusqu'à l'abaisse de la queue. Utiliser 1 mL par 10 kg de poids et pour administrer une dose de 0,5 mg/kg.

TABLEAU POSOLOGIQUE

Poids du veau (kg)	Dose (mL)	Dose par veau (mL)	Poids du veau (kg)	Dose (mL)	Dose par veau (mL)
40	4	1000	50	5	1250
50	5	1250	75	7	1875
60	6	1500	100	10	2500
70	7	1750	125	12	3125
80	8	2000	150	15	3750
90	9	2250	175	17	4375
100	10	2500	200	20	5000
110	11	2750	225	22	5625
120	12	3000	250	25	6250
130	13	3250	275	27	6875
140	14	3500	300	30	7500
150	15	3750	325	32	8125
200	20	5000	350	35	8750

Vous le devez à l'éleveur pour obtenir toutes les informations sur le poissage et l'administration.
Voir le dossier ou le site pour le numéro de lot et la date de péremption.

VETERINARY USE ONLY

DIN 02228386

CYDECTIN

Moxidectin
(Pour-On for Beef and Dairy Cattle)

(Each mL contains 5 mg of moxidectin)

For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle including lactating dairy cows.

EXTERNAL USE ONLY

WARNINGS:

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 15 days after the latest treatment with this drug.
2. Do not use in milk-fed calves. Do not use in calves less than 14 weeks of age to be processed for veal.
3. Keep this and all drugs out of reach of children.
4. Avoid direct contact with skin and eyes.

NOTE TO USER - When used according to label directions, no milk withholding time is required following the application of CYDECTIN Pour-On on dairy cattle.

Store between 4-25°C. AVOID FREEZING.
Protect from light. Store bottle in box.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
5180 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5H4



Net Contents
5 L



Dosage and administration: EXTERNAL USE ONLY. CYDECTIN® Pour-On should be applied to healthy skin along the top of the back from the withers to the base of the tail. Use 1 mL per 10 kg body weight to administer a dose of 0.5 mg/kg.

DOSAGE TABLE

Body weight (kg)	Dose (mL)	Dose per head (mL)	Body weight (kg)	Dose (mL)	Dose per head (mL)
40	4	1000	50	5	1250
50	5	1250	75	7	1875
60	6	1500	100	10	2500
70	7	1750	125	12	3125
80	8	2000	150	15	3750
90	9	2250	175	17	4375
100	10	2500	200	20	5000
110	11	2750	225	22	5625
120	12	3000	250	25	6250
130	13	3250	275	27	6875
140	14	3500	300	30	7500
150	15	3750	325	32	8125
200	20	5000	350	35	8750

See package insert for complete information on dosage and administration. See bottom of side for lot number and expiration date.

8564
1795
CC2657L
PMS
8564
CC2657L



