

Active Ingredient: Ivermectin 10mg/mL
Dosage and Administration:
Cattle: 1 mL per 50 kg bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: 1 mL per 33 kg bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete directions.
Warning: See Package Insert
Storage: Protect from light.
Distributed by / Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB, T5S 2W2



Ingédient Actif: Ivermectin: 10 mg/mL
Posologie et Mode d'emploi: Bovins: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.
Mise en garde: Voir la notice
Entreposage: Protéger de la lumière.
Manufactured by / Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down,
Northern Ireland
Lot:
Exp:

Doc. # 537270

Doc. # 537270

100 mL

Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Injection for Cattle and Swine
STERILE

Noromectin
(ivermectin)

FOR VETERINARY USE ONLY
DIN 02247349

DIN 02247349
POUR USAGE VÉTÉRINAIRE
SEULEMENT

Noromectin
(ivermectin)

Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Ingrédient actif:
Un mL renferme 10 mg d'ivermectin

MISE EN GARDE

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins trente-cinq (35) jours après le dernier traitement avec ce médicament, les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins vingt-huit (28) jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches laitières traitées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les deux (2) mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.
4. Conserver ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

Fabriqué par:
Norbroom Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



100 mL

Norbroom

INDICATIONS
Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins et les porcs. Voir la liste des parasites dans la notice.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Bovins: administrer un mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.

PRÉCAUTION
1. Ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire.
2. Une gêne transitoire a été observée chez quelques animaux après injection sous-cutanée. Une faible incidence d'œdème des tissus mous a été observée au site d'injection. Ces réactions sont disparues spontanément sans traitement.
3. Bovins - Afin de prévenir les réactions secondaires potentiellement associées à l'élimination des hypodermes, consultez votre vétérinaire au sujet du moment approprié de l'application du traitement.

ENTREPOSAGE
Protéger de la lumière en gardant le flacon dans la boîte.

DISPOSITION
Voir la notice

DIN 02247349
FOR VETERINARY USE ONLY

Noromectin
(ivermectin)

Injection for Cattle and Swine
STERILE


Active ingredient:
Each mL contains 10 mg of ivermectin

WARNING

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least thirty-five (35) days after the last treatment with this drug; treated swine must not be slaughtered for use in food for at least twenty-eight (28) days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two (2) months prior to calving.
3. Not for use in lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Manufactured by:
Norbroom Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



100 mL

Norbroom

INDICATIONS
For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle and swine. See package insert for complete list of parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Cattle: One mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 50 kg of bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: one mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 33 kg of bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete use directions.

CAUTION
1. Do not administer intravenously or intramuscularly.
2. A transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling at the injection site has been observed. These reactions have disappeared without treatment. Divide doses greater than 10 mL between injection sites to reduce occasional discomfort or site reaction. Different sites should be used for other parenteral products.
3. Cattle - To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.

STORAGE
Store bottle in carton to protect from light.

DISPOSAL - see Package Insert

Lot:
Exp:



215503C02

250 mL

Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Injection for Cattle and Swine
STERILE

(ivermectin)

Noromectin

SEULEMENT
POUR USAGE VÉTÉRAIRE
FOR VETERINARY USE ONLY

DIN 02247349

DIN 02247349
POUR USAGE VÉTÉRAIRE
SEULEMENT

Noromectin
(ivermectin)

Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Ingrédient actif:
Un mL renferme 10 mg d'ivermectin

MISE EN GARDE

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins trente-cinq (35) jours après le dernier traitement avec ce médicament; les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins vingt-deux (22) jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches laitières traitées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les deux (2) mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.
4. Garder ce produit, avec tout médicament, hors de la portée des enfants.

Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distribué par:
Kamo Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 166 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2

250 mL



Norbrook

INDICATIONS

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins et les porcs. Voir la liste des parasites dans la notice.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Bovins: administrer un mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.

PRÉCAUTION

1. Ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire.
2. Une gêne transitoire a été observée chez quelques animaux après injection sous-cutanée. De rares cas d'oedème des tissus mous ont été observés au lieu d'injection. Ces réactions sont cependant disparues spontanément sans traitement. Fractionner les doses supérieures à 10 mL et les injecter en différents points afin de réduire la gêne transitoire ou les réaction au lieu d'injection. Ne pas administrer d'autres produits à usage parentéral au même lieu d'injection choisi pour ce médicament.
3. Bovins - Afin de prévenir les réactions secondaires potentiellement associées à l'élimination des hypodermes, consultez votre vétérinaire au sujet du moment approprié de l'application du traitement.

ENTREPOSAGE

Protéger de la lumière en gardant le flacon dans la boîte.

DISPOSITION - Voir la notice

DIN 02247349
FOR VETERINARY USE ONLY

Noromectin
(ivermectin)

Injection for Cattle and Swine
STERILE

Active ingredient:
Each mL contains 10 mg of ivermectin

WARNING

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least thirty-five (35) days after the last treatment with this drug; treated swine must not be slaughtered for use in food for at least twenty-eight (28) days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two (2) months prior to calving.
3. Not for use on lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Manufactured by:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distributed by:
Kamo Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 166 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2

250 mL



Norbrook

INDICATIONS

For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle and swine. See package insert for complete list of parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Cattle: One mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 50 kg of bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: one mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 33 kg of bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete use directions.

CAUTION

1. Do not administer intravenously or intramuscularly.
2. A transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling at the injection site has been observed. These reactions have disappeared without treatment. Divide doses greater than 10 mL between injection sites to reduce occasional discomfort or site reaction. Different sites should be used for other parenteral products.

3. Cattle - To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.

STORAGE

Store bottle in carton to protect from light.

DISPOSAL - see Package Insert

Z15504C02

Lot:
Exp:



Doc # 532690

500 mL

Exp:
Lot:

Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE
(ivermectin)
Noromectin
SEULEMENT
FOR VETERINARY USE ONLY
DIN 02247349

DIN 02247349
POUR USAGE VÉTÉRIINAIRE
SEULEMENT

Noromectin
(ivermectin)
Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Ingredient actif:
Un mL renferme 10 mg d'ivermectin

MISE EN GARDE

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins trente-cinq (35) jours après le dernier traitement avec ce médicament; les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins vingt-huit (28) jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches laitières tarées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les deux (2) mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.
4. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

Fabrique par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



500 mL

Norbrook

INDICATIONS

Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins et les porcs. Voir la liste des parasites dans la notice.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Bovins: administrer un mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).

Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.

PRÉCAUTION

1. Ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire.
2. Une gêne transitoire a été observée chez quelques animaux après injection sous-cutanée. De rares cas d'œdème des tissus mous ont été observés au lieu d'injection. Ces réactions sont cependant disparues spontanément sans traitement. Fractionner les doses supérieures à 10 mL et les injecter en différents points afin de réduire la gêne transitoire ou les réactions au lieu d'injection. Ne pas administrer d'autres produits à usage parentéral au même lieu d'injection choisi pour ce médicament.
3. **Bovins** - Afin de prévenir les réactions secondaires potentiellement associées à l'élimination des hypodermes, consultez votre vétérinaire au sujet du moment approprié de l'application du traitement.

ENTREPOSAGE

Protéger de la lumière en gardant le flacon dans la boîte.

DISPOSITION

Voir la notice

DIN 02247349
FOR VETERINARY USE ONLY

Noromectin
(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
STERILE

Active ingredient:
Each mL contains 10 mg of ivermectin

WARNING

1. Treated cattle must not be slaughtered for use as food for at least thirty-five (35) days after the last treatment with this drug; treated swine must not be slaughtered for use as food for at least twenty-eight (28) days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two (2) months prior to calving.
3. Not for use on lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Manufactured by:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



500 mL

Norbrook

INDICATIONS

For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle and swine. See package insert for complete list of parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Cattle: One mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 50 kg of bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).

Swine: one mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 33 kg of bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete use directions.

CAUTION

1. Do not administer intravenously or intramuscularly.
2. A transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling at the injection site has been observed. These reactions have disappeared without treatment. Divide doses greater than 10 mL between injection sites to reduce occasional discomfort or site reaction. Different sites should be used for other parenteral products.
3. **Cattle** - To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.

STORAGE

Store bottle in carton to protect from light.

DISPOSAL

See Package Insert



8 74642 00004 5

1000 mL
SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCS
STERILE
Injection for Cattle and Swine
STERILE
(Ivermectin)
Noromectin[®]
SEULEMENT
FOR VETERINARY USE ONLY
DIN 02247349

DIN 02247349
**POUR USAGE VÉTÉRINAIRE
SEULEMENT**
Noromectin[®]
(ivermectin)
Solution injectable pour bovins et porcs
STÉRILE
Ingredient actif:
Un mL renferme 10 mg d'ivermectin
MISE EN GARDE

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins trente-cinq (35) jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins vingt-huit (28) jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches laitières traitées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les deux (2) mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.
4. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



Norbrook

INDICATIONS
Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins et les porcs. Voir la liste des parasites dans la notice.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Bovins: administrer un mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.

PRÉCAUTION

1. Ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire.
2. Une gêne transitoire a été observée chez quelques animaux après injection sous-cutanée. Une faible incidence d'œdème des tissus mous a été observée au site d'injection. Ces réactions sont disparues spontanément sans traitement. Fractionner (diviser) les doses supérieures à 10 mL entre des sites d'injection, afin de réduire la gêne transitoire des réactions aux sites. Ne pas administrer d'autres produits à usage parentéral au même site d'injection choisi pour ce médicament.
3. **Bovins** - Afin de prévenir les réactions secondaires potentiellement associées à l'élimination des hypodermes, consultez votre vétérinaire au sujet du moment approprié de l'application du traitement.

ENTREPOSAGE
Protéger de la lumière en gardant le flacon dans la boîte.

DISPOSITION
Voir la notice

DIN 02247349
FOR VETERINARY USE ONLY
Noromectin[®]
(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
STERILE
Active ingredient:
Each mL contains 10 mg of ivermectin

WARNING

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least thirty-five (35) days after the last treatment with this drug. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least twenty-eight (28) days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two (2) months prior to calving.
3. Not for use in lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Manufactured by:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd
11204 - 186 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2



Norbrook

INDICATIONS
For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle and swine. See package insert for complete list of parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Cattle: One mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 50 kg of bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: one mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 33 kg of bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete use directions.

CAUTION

1. Do not administer intravenously or intramuscularly.
2. A transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling at the injection site has been observed. These reactions have disappeared without treatment. Divide doses greater than 10 mL between injection sites to reduce occasional discomfort or site reaction. Different sites should be used for other parenteral products.

3. **Cattle** - To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.

STORAGE
Store bottle in carton to protect from light.

DISPOSAL
See Package Insert



Active Ingredient: Ivermectin 10mg/mL
Dosage and Administration:
Cattle: 1 mL per 50 kg bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: 1 mL per 33 kg bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete directions.
Warning: See Package Insert
Storage: Protect from light.
Distributed by / Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB, T5S 2W2

DIN: 02247349
For Veterinary Use Only
Pour usage vétérinaire seulement

Noromectin[®]

(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
STERILE

Solution injectable pour
bovins et porcs
STÉRILE

004154L02



Norbrook

Ingrédient Actif: Ivermectin: 10 mg/mL
Posologie et Mode d'emploi:
Bovins: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.
Mise en garde: Voir la notice
Entreposage: Protéger de la lumière.
Manufactured by / Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down,
Northern Ireland

Lot:
Exp:

Doc. # 532690

Active Ingredient: Ivermectin 10mg/mL
Dosage and Administration:
Cattle: 1 mL per 50 kg bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: 1 mL per 33 kg bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete directions.
Warning: See Package Insert
Storage: Protect from light.
Distributed by / Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB, T5S 2W2

DIN: 02247349
For Veterinary Use Only
Pour usage vétérinaire seulement

Noromectin[®]

(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
STERILE

Solution injectable pour
bovins et porcs
STERILE

003154L02



500 mL



Norbrook 

Ingrédient Actif: Ivermectin: 10 mg/mL
Posologie et Mode d'emploi:
Bovins: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.
Mise en garde: Voir la notice
Entreposage: Protéger de la lumière.
Manufactured by / Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down,
Northern Ireland

Lot:
Exp:

Doc. # 532690

Active Ingredient: Ivermectin 10mg/mL

Dosage and Administration:

Cattle: 1 mL per 50 kg bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).

Swine: 1 mL per 33 kg bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete directions.

Warning:

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 35 days after the last treatment with this drug. Treated swine must not be slaughtered for use in food for at least 28 days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two months prior to calving.
3. Not for use in lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Storage: Protect from light.

Distributed by / Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB, T5S 2W2

DIN: 02247349
For Veterinary Use Only
Pour usage vétérinaire seulement

Noromectin[®]
(ivermectin)

Injection for Cattle and Swine
STERILE
Solution injectable pour
bovins et porcs
STÉRILE

001154L02



 **Norbrook**[®] 

Ingrédient Actif: Ivermectin: 10 mg/mL

Posologie et Mode d'emploi:

Bovins: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).

Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements posologiques complets dans la notice.

Mise en garde:

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 35 jours après le dernier traitement avec ce médicament; les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 28 jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches laitières tarées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les 2 mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.
4. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

Entreposage: Protéger de la lumière.

Manufactured by / Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down,
Northern Ireland

Lot:
Exp:

Doc. # 532690

50 mL
Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

Injection for Cattle and Swine
STERILE

Noromectin
(ivermectin)
POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
FOR VETERINARY USE ONLY
DIN 02247349

DIN 02247349
POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

Noromectin
(ivermectin)
Solution injectable pour bovins et porcs
STERILE

MISE EN GARDE

Ingrédient actif:
Ivermectin 10 mg

1. Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins trente-cinq (35) jours après le dernier traitement avec ce médicament, les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins vingt-huit (28) jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Les vaches lactantes traitées ne doivent pas être traitées avec ce médicament durant les deux (2) mois qui précèdent le vêlage.
3. Ne pas administrer aux vaches lactantes en lactation.
4. Garder ce produit, ainsi que son médicament, hors de la portée des enfants.

Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 118 Street
Edmonton, AB, T5S 2W2

50 mL

Norbrook

INDICATIONS
Pour le traitement des infections et des infestations attribuables aux parasites internes et externes chez les bovins et les porcs. Voir la liste des parasites dans la notice.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Bovins: administrer un mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 50 kg de poids vif par voie sous-cutanée exclusivement (10 mL par lieu d'injection au maximum).
Porcs: administrer 1 mL de solution injectable Noromectin (10 mg d'ivermectin) aux 33 kg de poids vif en injection sous-cutanée au niveau du cou seulement. Voir les renseignements toxicologiques complets dans la notice.

PRÉCAUTION
1. Ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire.
2. Une gêne transitoire a été observée chez quelques animaux après injection sous-cutanée. Une faible incidence d'œdème des tissus mous a été observée au site d'injection. Ces réactions sont disparues spontanément sans traitement. Fractionner (diviser) les doses supérieures à 10 mL entre des sites d'injection, afin de réduire la gêne transitoire des réactions aux sites. Ne pas administrer d'autres produits à usage parentéral au même site d'injection choisi pour ce médicament.
3. Bovins - Afin de prévenir les réactions secondaires potentiellement associées à l'élimination des hypodermes, consultez votre vétérinaire au sujet du moment approprié de l'application du traitement.

ENTREPOSAGE
Protéger de la lumière en gardant le flacon dans la boîte.

DISPOSITION
Voir la notice.

DIN 02247349
FOR VETERINARY USE ONLY

Noromectin
(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
STERILE

Active ingredient:
Ivermectin 10 mg

WARNING

1. Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least thirty-five (35) days after the last treatment with this drug. treated swine must not be slaughtered for use in food for at least twenty-eight (28) days after the last treatment with this drug.
2. Non-lactating dairy cattle must not be treated with this drug for at least two (2) months prior to calving.
3. Not for use in lactating dairy cattle.
4. Keep this and all drugs out of the reach of children.

Manufactured by:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland

50 mL

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd
11204 - 118 Street
Edmonton, AB
T5S 2W2

Norbrook

Lot:
Exp:

8 74642 00001 4

215502C03

INDICATIONS
For the treatment of infections and infestations due to internal and external parasites in cattle and swine. See package insert for complete list of parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Cattle: One mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 50 kg of bodyweight by subcutaneous injection only (maximum of 10 mL per site).
Swine: one mL of Noromectin Injection (10 mg of ivermectin) per 33 kg of bodyweight by subcutaneous injection in the neck only. See package insert for complete use directions.

CAUTION
1. Do not administer intravenously or intramuscularly.
2. A transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling at the injection site has been observed. These reactions have disappeared without treatment. Divide doses greater than 10 mL between injection sites to reduce occasional discomfort or site reaction. Different sites should be used for other parenteral products.
3. Cattle - To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle drugs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.

STORAGE
Store bottle in carton to protect from light.

DISPOSAL - see Package Insert

Doc. # 532690

Active Ingredient: Ivermectin 10mg/mL
Dosage, Administration and Warning:
See Package Insert
Storage: Protect from light.
Distributed by / Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB, T5S 2W2

DIN: 0247349
For Veterinary Use Only
Pour usage vétérinaire seulement

Noromectin
(ivermectin)
Injection for Cattle and Swine
Solution injectable pour bovins et porcs

STERILE
STERILE
90 mL



Ingredient Actif: Ivermectin: 10 mg/mL
Posologie, Mode d'emploi et Mise en garde:
Voir la notice
Entreposage: Protéger de la lumière.
Manufactured by / Fabriqué par:
Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down,
Northern Ireland

Lot:
Exp:

005154L02