




Thyro-Tabs^{MD} Canine

(comprimés de lévothyroxine sodique), USP

Description: Chaque comprimé renferme de la lévothyroxine sodique USP cristalline, synthétique.

La structure de la lévothyroxine sodique est la suivante.



Indication: La lévothyroxine est recommandée pour corriger certaines affections associées à une faible concentration sanguine de l'hormone thyroïdienne (hypothyroïdie) chez le chien.

Associée à certains signes cliniques, une réduction de la L-thyroxine (T-4) circulante constitue un signe d'hypothyroïdie. Les résultats d'études cliniques réalisées par LLOYD, Inc. et ceux de deux laboratoires commerciaux ont permis d'établir les valeurs de référence suivantes chez le chien :

Euthyroïdie (chien normal) : 18 à 32 ng/mL (1,8 à 3,2 µg/dL)

Hypothyroïdie potentielle : 10 à 18 ng/mL (1,0 à 1,8 µg/dL)

Hypothyroïdie manifeste : < 10 ng/mL (< 1,0 µg/dL), en association avec certains signes cliniques d'hypothyroïdie.

Une teneur sérique de > 18 ng/mL, mesurée chez le chien au repos, est compatible avec un état d'euthyroïdie chez cette espèce. D'une façon générale, l'hypothyroïdie est d'autant moins probable que la T-4 spécifique excède cette valeur. Les chiens qui présentent des signes d'hypothyroïdie et dont la T-4 est inférieure à 18 ng/mL devraient recevoir une hormonothérapie substitutive.

Avant de commencer le traitement, il faut mesurer le taux de T-4 à intervalles de 30 jours pour déterminer la dose d'entretien éventuelle de Thyro-Tabs Canine. Après 12 semaines de traitement, on évaluera la réponse au traitement en fonction des signes cliniques résiduels ou de l'amélioration de l'état de santé de l'animal. La réaction de l'animal à l'interruption du traitement sera utile à la confirmation du diagnostic. La réapparition des signes cliniques en réponse à l'interruption du traitement confirmera le diagnostic initial d'hypothyroïdie. Il importe de poser un diagnostic précis dans un cas d'hypothyroïdie car, en général, pareil diagnostic nécessite une hormonothérapie substitutive à vie. L'objectif principal de ce traitement est de rétablir le métabolisme normal de l'animal en fournissant un apport exogène suffisant de L-thyroxine synthétique pour maintenir la concentration sérique de l'hormone thyroïdienne à l'intérieur des valeurs physiologiques normales. Du fait de l'adaptation de l'animal, il peut être nécessaire, durant les premiers mois du traitement, de mesurer régulièrement la concentration sanguine de T-4 afin d'établir une dose d'entretien appropriée.

Le test de TSH (thyrotropine, « Thyroid Stimulating Hormone ») peut s'avérer nécessaire à l'établissement d'un diagnostic final chez les chiens dont la teneur sérique en T-4, à l'état de repos, se situe à la limite de l'hypothyroïdie potentielle. La dose de TSH, le moment de prélèvement des échantillons après l'administration de TSH, de même que l'interprétation des résultats du test, peuvent varier d'un laboratoire à l'autre.

Mode d'action: Il est impossible de distinguer la lévothyroxine sodique exogène, dont l'apport provient des comprimés Thyro-Tabs Canine, de la lévothyroxine endogène circulante, sécrétée naturellement par la glande thyroïde. L'agent régulateur principal de la fonction thyroïdienne est l'hormone thyrotrope (thyrotropine, TSH ou « Thyroid Stimulating Hormone ») sécrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse (antéhypophyse). L'hormone de libération de la thyrostimuline (thyroïdolibérine, TRH ou « Thyrotropin Releasing Hormone ») est un médiateur d'origine hypothalamique, dont l'influence sur la libération hypophysaire de la thyrotropine se manifeste de façon continue. Que ce soit par leurs effets sur la croissance et le développement ou par leur activité métabolique, les hormones thyroïdiennes agissent sur presque tous les organes.

Prévalence de l'hypothyroïdie canine: L'hypothyroïdie se manifeste généralement chez les chiens d'âge moyen et chez les chiens âgés, mais elle s'observe aussi chez des animaux plus jeunes, en particulier chez les chiens appartenant aux races de grande taille. De même, elle se rencontre fréquemment chez les mâles castrés et les femelles ovariectomisées, sans égard à l'âge. Il s'agit généralement d'une affection primaire manifestée par une insuffisance thyroïdienne attribuable à une thyroïde lymphocytaire ou à toute autre perte de l'épithélium folliculaire et à l'atrophie de la glande thyroïde qui en résulte. L'hypothyroïdie secondaire est relativement rare et résulte le plus souvent de l'effet destructeur d'une lésion néoplasique de l'hypophyse.

Signes cliniques de l'hypothyroïdie canine: Ce ne sont pas tous les chiens souffrant d'hypothyroïdie qui présentent les signes cliniques classiques. De même, tout comme ces derniers, les valeurs de laboratoire peuvent varier d'un animal à l'autre selon le degré de l'affection et le délai depuis l'apparition de la dysfonction. La liste ci-dessous présente les signes cliniques et les valeurs de laboratoire associés à l'hypothyroïdie.

Fonction neuromusculaire : léthargie, manque de résistance, sommeil prolongé, diminution de l'intérêt et de la vivacité, perturbation de l'activité cérébrale, dépression, hypotonie, rigidité et lenteur des mouvements, traînement des membres antérieurs, inclinaison de la tête, perturbation de l'équilibre.

Métabolisme : réduction de la consommation d'oxygène et du métabolisme basal, sensibilité et intolérance au froid, hypothermie générale, hypothermie cutanée, recherche de la chaleur, gain pondéral, constipation, intolérance à l'effort, réduction de la fréquence cardiaque, pouls faible, choc systolique, réduction du voltage à l'électrocardiographie.

Reproduction : incapacité reproductive, avortement, mortalité, rachitisme, retard de la puberté, fléchissement de l'activité génitale, perturbation de la spermatogenèse, irrégularité oestrienne ou suppression des chaleurs, galactorrhée.

Peau et pelage : myxoédème facial, blépharoptose, atrophie de l'épiderme, hypertrophie du derme, hyperkératose superficielle ou folliculaire, hyperpigmentation, pelage terne, ébouriffé et clairsemé, poils secs et cassants, repousse lente, alopecie bilatérale.

Résultats de laboratoire : faible T-4 sérique, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, augmentation de la créatinine phosphokinase sérique, anémie (normochrome, normocytaire).

Contre-indications: L'administration de lévothyroxine sodique est contre-indiquée en présence de thyrotoxicose, d'infarctus aigu du myocarde, d'insuffisance surrénalienne non corrigée. Il existe, en outre, certaines affections (p. ex. l'hypertension essentielle, l'euthyroïdie, la gestation) au cours desquelles l'administration de lévothyroxine sodique peut être contre-indiquée ou, à tout le moins, doit être envisagée avec prudence.

Précautions: Aucune étude n'a été réalisée afin de déterminer l'innocuité de la lévothyroxine sodique chez les chiens destinés à la reproduction, y compris les femelles en gestation. Des recherches indiquent que l'administration de ce médicament à des femelles gestantes peut, dans certains cas, entraver le développement normal de la glande thyroïde chez le fœtus.

La réponse clinique à un traitement à la lévothyroxine sodique est lente à se manifester. Le surdosage d'un médicament thyrotrope, sans égard à sa provenance, peut provoquer une thyrotoxicose se manifestant par une symptomatologie comprenant entre autres la polydypsie, la polyurie, la polyphagie, l'intolérance à la chaleur, l'hyperactivité, la modification du comportement, etc. Les comprimés Thyro-Tabs Canine de 0,7 mg contiennent de la tartrazine (jaune FD&C n°5) associée à certaines réactions allergiques (y compris l'asthme bronchique) chez les humains qui y sont sensibles. On ignore si ce type de réaction peut également se produire chez les animaux.

Effets secondaires: Aucun effet secondaire n'est associé à la lévothyroxine sodique aux doses recommandées. L'administration de doses excessives provoque les signes cliniques de thyrotoxicose dont il a été question dans les paragraphes précédents. (voir Précautions).

Posologie: La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg à par 4,5 kg de poids corporel en dose unique ou en doses fractionnées. On ajustera ultérieurement la posologie en fonction de la concentration sérique de T-4, déterminée mensuellement jusqu'à l'établissement d'une dose d'entretien appropriée. La dose quotidienne est généralement de 0,1 mg par 4,5 kg. Chez la plupart des chiens de plus de 36 kg, la dose maximale de 0,8 mg à 1,0 mg s'avère suffisante.

Administration: On peut administrer Thyro-Tabs Canine par voie orale ou l'incorporer à la nourriture.

Présentation: Thyro-Tabs Canine (comprimés de lévothyroxine sodique), USP, offert sous forme de comprimés sécables de couleurs diverses, renferme 0,1 mg (jaune), 0,2 mg (rose), 0,3 mg (vert), 0,4 mg (marron), 0,5 mg (blanc), 0,6 mg (pourpre), 0,7 mg (orange) et 0,8 mg (bleu) de lévothyroxine sodique. Flacons de 120 comprimés.

Entreposage: Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Tenir hors de portée des enfants.

Bibliographie:

- Dickerson, WM. 1993. Endocrine glands. Pages 629-664 in M. J. Swenson and W. O. Reece, eds. *Dukes' Physiology of domestic animals*. 11th ed. Cornell University Press, Ithaca, N.Y.
- Chastain, CB. 1992. Unusual manifestations of hypothyroidism in dogs. Pages 330-334 in R. W. Kirk et J. D. Bonagura, eds. *Current veterinary therapy XI*. W. B. Saunders Company, Philadelphia, PA.
- Peterson, ME. 1991. The use of endocrine testing in the diagnosis and treatment of endocrine disorders. *Proc. ACVIM Forum* 9:109-114.
- Pancieria DL. 1990. Canine hypothyroidism, Part 1. Clinical findings and control of thyroid hormone secretion and metabolism. *The Compendium* 12:689-701.
- McDonald LE. 1986. Hormones influencing metabolism. Pages 616-655 in N. H. Booth and L. E. McDonald, eds. *Veterinary pharmacology and therapeutics*, 6th ed., Iowa State University Press, Ames, IA.
- Nelson, RW. and S. L. Ihle. 1987. Treating hypothyroidism through hormone supplementation. *Vet. Med.* 82:153-156.
- Nelson, RW. and S. L. Ihle. 1987. Hypothyroidism in dogs and cats: A difficult deficiency to diagnose. *Vet. Med.* 82:60-70.
- Chastain, CB. and V.K. Ganjam. 1986. The thyroid. Pages 110-175 in *Clinical endocrinology of companion animals*. Lea and Febiger, Philadelphia, PA.

Fabriqué par : LLOYD, Inc.
Shenandoah, Iowa 51601, É.-U.



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent
Oldcastle, ON, Canada N0R 1L0

MMYY

0.1 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231021 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.1 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231021 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.1 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.1 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.1 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,1 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,1 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.2 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231022 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.2 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231022 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.2 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.2 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMYYY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.2 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMYYY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,2 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,2 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.3 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231023 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.3 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231023 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.3 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.3 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMYY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.3 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg
of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMYY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,3 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,3 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.4 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231024 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.4 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231024 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.4 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.4 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.4 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,4 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,4 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.5 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231025 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.5 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231025 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.5 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.5 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.5 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,5 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,5 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.6 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231026 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.6 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231026 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.6 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.6 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight
in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.6 mg
levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated
with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial
recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg
of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDDDYY
MMMY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,6 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,6 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.7 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231027 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs[®]MD Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.7 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231027 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs[®]MD Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.7 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.7 mg levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDYY
MMYY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.7 mg levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDYY
MMYY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,7 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,7 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

0.8 mg

Principle Panel--Updated

Pr DIN 02231028 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.8 mg



Principle Panel—Current with Mark-ups

Pr DIN 02231028 120 Tablets/
Comprimés

Thyro-Tabs^{®MD} Canine
Levothyroxine Sodium Tablets, USP
Comprimés de lévothyroxine sodique, USP

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Keep out of reach of children.
Tenir hors de portée des enfants.

0.8 mg



Left Panel--Updated

Active ingredients: Each tablet contains 0.8 mg levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa, USA



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDYY
MMYY

Left Panel—Current with Mark-ups

Active ingredients: Each tablet contains 0.8 mg levothyroxine sodium USP.

Indication: For use in the correction of conditions associated with hypothyroidism in dogs.

Dosage: See package insert before use. The initial recommended daily dose is 0.1 mg per 4.5 kg of body weight in single or divided doses.

Storage: Store at 15° - 30°C and protect from light and moisture.

Manufactured by:
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa



Distributed by:
Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0



KXDDYY
MMYY

Right Panel-Updated

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,8 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY

Right Panel-Current with Mark-ups

Ingrédients actifs : Chaque comprimé renferme 0,8 mg de lévothyroxine sodique USP.

Indication : Pour corriger certains états pathologiques associés à l'hypothyroïdie chez le chien.

Posologie : Avant l'emploi, lire attentivement le notice du produit. La dose initiale quotidienne recommandée est de 0,1 mg par 4,5 kg de poids corporel, administrée en une seule dose ou en doses fractionnées.

Entreposage : Conserver entre 15° - 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Fabriqué par :
LLOYD, Inc., Shenandoah, Iowa. USA



Distribué par : Veterinary Healthcare Solutions, Inc.
2516 Binder Crescent,
Oldcastle, ON, N0R 1L0

MMYY