

Antibiotic and Vitamin Water Soluble Powder premix for swine and calves.
Prémélange hydrosoluble d'antibiotiques et de vitamines pour porcs, et veaux.

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement

ACTIVE INGREDIENTS/INGRÉDIENTS ACTIFS:

Ingredient	per 100 g par 100 g	Ingrédient
Penicillin G Potassium	4961333 IU/UI	Pénicilline G. potassique
Streptomycin Sulfate	15333 mg	Sulfate de Streptomycine
Vitamin A	750000 IU/UI	Vitamine A
Vitamin D ₃	250000 IU/UI	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	241 mcg	Vitamine B ₁₂ (Cyanocobalamine)
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	333 mg	Vitamine B ₂ (Riboflavine)
Calcium d-pantothenate	750 mg	d-pantothéate de calcium
Niacinamide	2500 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	326 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	333 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate)	750 IU/UI	Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol)

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food during treatment and for at least 5 days after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure, and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires durant le traitement et dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

Garder hors de la portée des enfants

Net Contents / Contenu net: 10 kg

Lot.

Exp

Bio Agri Mix LP
PO Box 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



(English side panel)

DESCRIPTION: A water soluble vitamin premix medicated with Penicillin G Potassium and Streptomycin Sulfate.

INDICATIONS:

Swine and Calves: As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently

Swine: Dissolve 300 g in 250 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

Calves: 4 g of powder per 45 kg of body weight, mix with water or milk and give every 12 hours for 2 to 3 days.

1 teaspoonful equals 4 g.

CAUTIONS: These solutions are not stable for more than 24 hours. Make fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering places. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-determined.

STORAGE: Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

(French side panel)

DESCRIPTION: Un prémélange hydrosoluble de vitamines médicamenteux à la pénicilline G potassique et à la sulfate de streptomycine.

INDICATIONS:

Porcs et Veaux: Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs: Dissoudre 300 g dans 250 L d'eau de boisson et administrer pendant 4 ou 5 jours.

Veaux: 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel, mélanger dans de l'eau ou du lait et administrer à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

1 c. à thé équivaut 4 g.

PRÉCAUTIONS: Ces solutions sont stables pendant 24 heures. En préparer des fraîches chaque jour. Retrancher tout autre breuvage pendant le traitement. Fournir suffisamment d'abreuvoir. Mettre en pratique de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, un nouveau diagnostic devrait être établi.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un endroit sec et frais en dessous 23°C. Éviter le gel.

Antibiotic and Vitamin Water Soluble Powder premix for swine and calves.
Prémélange hydrosoluble d'antibiotiques et de vitamines pour porcs, et veaux.

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement

ACTIVE INGREDIENTS/INGRÉDIENTS ACTIFS:

Ingredient	per 100 g par 100 g	Ingrédient
Penicillin G Potassium	4961333 IU/UI	Pénicilline G. potassique
Streptomycin Sulfate	15333 mg	Sulfate de Streptomycine
Vitamin A	750000 IU/UI	Vitamine A
Vitamin D ₃	250000 IU/UI	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	241 mcg	Vitamine B ₁₂ (Cyanocobalamine)
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	333 mg	Vitamine B ₂ (Riboflavine)
Calcium d-pantothenate	750 mg	d-pantothéate de calcium
Niacinamide	2500 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	326 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	333 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate)	750 IU/UI	Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol)

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food during treatment and for at least 5 days after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires durant le traitement et dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

Net Contents / Contenu net: 100 g

Lot.

Exp

Bio Agri Mix LP
PO Box 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



(English side panel)

DESCRIPTION: A water soluble vitamin premix medicated with Penicillin G Potassium and Streptomycin Sulfate.

INDICATIONS:

Swine and Calves: As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently

Swine: Dissolve 300 g in 250 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

Calves: 4 g of powder per 45 kg of body weight, mix with water or milk and give every 12 hours for 2 to 3 days.

1 teaspoonful equals 4 g.

CAUTIONS: These solutions are not stable for more than 24 hours. Make fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering places. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-determined.

STORAGE: Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

(French side panel)

DESCRIPTION: Un prémélange hydrosoluble de vitamines médicamenteuses à la pénicilline G potassique et à la sulfate de streptomycine.

INDICATIONS:

Porcs et Veaux: Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs: Dissoudre 300 g dans 250 L d'eau de boisson et administrer pendant 4 ou 5 jours.

Veaux: 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel, mélanger dans de l'eau ou du lait et administrer à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

1 c. à thé équivaut 4 g.

PRÉCAUTIONS: Ces solutions sont stables pendant 24 heures. En préparer des fraîches chaque jour. Retrancher tout autre breuvage pendant le traitement. Fournir suffisamment d'abreuvoir. Mettre en pratique de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, un nouveau diagnostic devrait être établi.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un endroit sec et frais en dessous 23°C. Éviter le gel.

(Front panel)

Pr VIBIOMED BOOSTER

DIN 01918435

Antibiotic and Vitamin Water Soluble Powder premix for swine and calves.
Prémélange hydrosoluble d'antibiotiques et de vitamines pour porcs, et veaux.

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement

ACTIVE INGREDIENTS/INGRÉDIENTS ACTIFS:

Ingredient	per 100 g par 100 g	Ingrédient
Penicillin G Potassium	4961333 IU/UI	Pénicilline G. potassique
Streptomycin Sulfate	15333 mg	Sulfate de Streptomycine
Vitamin A	750000 IU/UI	Vitamine A
Vitamin D ₃	250000 IU/UI	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	241 mcg	Vitamine B ₁₂ (Cyanocobalamine)
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	333 mg	Vitamine B ₂ (Riboflavine)
Calcium d-pantothenate	750 mg	d-pantothéate de calcium
Niacinamide	2500 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	326 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	333 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate)	750 IU/UI	Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol)

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food during treatment and for at least 5 days after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure, and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires durant le traitement et dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.

Net Contents / Contenu net: 400 g

Lot.

Exp

Bio Agri Mix LP
PO Box 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY
CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE

(English side panel)

DESCRIPTION: A water soluble vitamin premix medicated with Penicillin G Potassium and Streptomycin Sulfate.

INDICATIONS:

Swine and Calves: As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently

Swine: Dissolve 300 g in 250 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

Calves: 4 g of powder per 45 kg of body weight, mix with water or milk and give every 12 hours for 2 to 3 days.

1 teaspoonful equals 4 g.

CAUTIONS: These solutions are not stable for more than 24 hours. Make fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering places. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-determined.

STORAGE: Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

(French side panel)

DESCRIPTION: Un prémélange hydrosoluble de vitamines médicamenteuses à la pénicilline G potassique et à la sulfate de streptomycine.

INDICATIONS:

Porcs et Veaux: Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs: Dissoudre 300 g dans 250 L d'eau de boisson et administrer pendant 4 ou 5 jours.

Veaux: 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel, mélanger dans de l'eau ou du lait et administrer à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

1 c. à thé équivaut 4 g.

PRÉCAUTIONS: Ces solutions sont stables pendant 24 heures. En préparer des fraîches chaque jour. Retrancher tout autre breuvage pendant le traitement. Fournir suffisamment d'abreuvoir. Mettre en pratique de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, un nouveau diagnostic devrait être établi.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un endroit sec et frais en dessous 23°C. Éviter le gel.