

Pr Wound Spray

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Néomycine (sous forme de sulfate de néomycine)..... 1 mg/mL
Violet de gentiane..... 2,4 mg/mL

INDICATIONS :

Wound Spray est un produit antibactérien topique à utiliser comme pansement sur les coupures mineures et les éraflures des bovins, des moutons et des chevaux.

REMARQUE :

Ne pas utiliser sur le pis ou près du pis.

MODE D'EMPLOI : Ouvrir le gicleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'obtention d'un jet léger ou vaporeux. UTILISER TOUJOUR DANS UNE POSITION VERTICALE.

PLAIES :

Pour usage topique seulement.
Pour les coupures mineures et les éraflures, vaporiser sur la région atteinte d'une distance d'environ 15 cm en appuyant sur la gâchette. Répéter toutes les 6 à 12 heures jusqu'à amélioration ou pour un maximum de 6 applications.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas appliquer sur une trop vaste partie du corps.
Ne pas utiliser sur les plaies profondes ou perforations, ni dans les cavités corporelles.

PRÉCAUTIONS :

Si des rougeurs, des irritations ou des enflures persistent ou augmentent, cesser l'usage de ce produit et réévaluer le diagnostic.

ENTREPOSAGE :

Garder à la température ambiante (15°C - 30°C).

**Neomycin
(as Sulfate) and
Gentian Violet
Topical Spray
Solution**

**Veterinary Use
Only
Antibiotic**

Net 500 mL

WARNINGS: No withdrawal period is required when treated according to the label. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. This spray will stain. Avoid contact with hands and clothing. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE: Un délai d'attente n'est pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Ce produit va tacher. Éviter tout contact avec les mains et les vêtements.

Garder hors de la portée des enfants.



CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY
CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE

DIN 00877190
8WOU001B

**Solution topique
de néomycine (sous
forme de sulfate)
et de violet de
gentiane à vaporiser**

**Usage vétérinaire
seulement
Antibiotique**

ACTIVE INGREDIENTS:

Neomycin (as neomycin sulfate).... 1 mg/mL
Gentian violet 2.4 mg/mL

INDICATIONS:

Wound Spray is a topical antibacterial for use as a wound dressing for minor cuts and abrasions of cattle, sheep and horses.

NOTE:

Do not use on or near the udder.

DIRECTIONS FOR USE: Open spray nozzle by twisting in a counter-clockwise direction for fine spray or stream. ALWAYS USE IN UPRIGHT POSITION.

WOUNDS: For topical use only. For minor cuts and abrasions, spray onto the affected area from a distance of approximately 15 cm by depressing trigger. Repeat every 6 to 12 hours until improvement occurs or for a maximum of 6 applications.

CONTRAINDICATIONS:

Do not apply to extensive area of the body
Do not use in deep or puncture wounds or in body cavities.

CAUTIONS:

If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use and re-evaluate the diagnosis.

STORAGE:

Store at room temperature (15°C - 30°C).

Manufactured by/

Fabriqué par:

Bimeda-MTC Animal Health Inc. /

Santé Animale Inc.

Cambridge ON, N3C 2W4

Distributed by/

Distribué par:

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges,

Lavaltrie, QC CANADA J5T 3S5

Bimeda Version: 31 October 2017

UPC

6 73994 80129 0