

Pr **CHLORTETRACYCLINE VITAMIN PREMIX CRUMBLES**

Prémélange en granules à base de chlortétracycline et vitamines

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
ANTIBIOTIQUE

DIN 02370263

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Chlorhydrate de Chlortétracycline (1)	4,4 g/kg
Vitamine A	550 000 UI/kg
Vitamine D3	55 000 UI/kg
Vitamine E	550 UI/kg

(1). Source : Chlor 100 Premix (DIN 00698210), Bio Agri Mix LP.

Remarque : Pour les bovins, le contenu de vitamines A et D dans ce prémélange fournit approximativement 50% des exigences quotidiennes. Le 50% qui reste doit être fourni par d'autres ingrédients de l'aliment complet.

MISES EN GARDE :

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours pour les bovins et veaux, et 7 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation.
3. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
4. Garder hors de la portée des enfants.

INDICATIONS :

Médicamenté avec le chlorhydrate de chlortétracycline à 4,4 g/kg pour aider lors de conditions suivantes chez les bovins et les porcs:

Bovins de boucherie et vaches laitières tarées: Pour aider à prévenir le fourchet.

Veaux: Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne.

Porcs:

1. Pour aider à prévenir l'entérite bactérienne (diarrhée).
2. Pour le traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

Remarque: Les porcs qui ont perdu l'appétit doivent être traités individuellement.

MODE D'EMPLOI :

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence et pendant la plus courte durée de temps requise pour obtenir le résultat clinique attendu.

Espèce et Indication	Dosage du chlorhydrate de chlortétracycline	Quantité de Chlortétracycline Vitamin Premix Crumbles à mélanger avec d'autres ingrédients pour préparer un aliment complet.		Administration
		Poids corporel (kg)	Quantité par animale (g)	
Bovins de boucherie et vaches laitières taries Prévention du fourchet	70 mg par tête par jour ou 0.22 mg/kg de poids corporel par jour	-	16	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange sans interruption pendant la période que les animaux sont exposés à la maladie.
Les bovins de boucherie nourris à l'aliment complet peuvent de temps en temps avoir des problèmes digestifs suite à l'incorporation soudaine du dosage complet du prémélange. Pour les bovins affectés, il est recommandé de donner un aliment avec le quart du dosage pendant 7 jours, et après d'augmenter la dose pendant les 7 jours suivants, pour atteindre la dose de 16 g du Chlortétracycline Vitamin Premix Crumbles par tête par jour.				
Veaux Prévention de la diarrhée bactérienne	55 mg/kg d'aliment complet	45-65 65-90 90-115 115-136	23 33 43 50	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange sans interruption jusqu'à 136 kg de poids corporel.
Porcs 1. Prévention de l'entérite bactérienne (diarrhée)	220 mg/kg d'aliment complet	jusqu'à 13	23	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange à l'exclusion de tout autre aliment jusqu'à la fin de la sixième semaine.
	55 mg/kg d'aliment complet	14-23 23-32	11 16	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange à l'exclusion de tout autre aliment jusqu'à 32 kg de poids corporel.
2. Traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée)	220 mg/kg d'aliment complet	jusqu'à 13	23	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange à l'exclusion de tout autre aliment jusqu'à la fin de la sixième semaine. Les porcs qui ont perdu l'appétit doivent être traités individuellement.
	110 mg/kg d'aliment complet	14-23 23-32	23 32	Distribuer l'aliment médicamenté avec ce prémélange à l'exclusion de tout autre aliment dès l'apparition des symptômes et prolonger le traitement pendant 3 jours après la disparition des symptômes. Les porcs qui ont perdu l'appétit doivent être traités individuellement.

Quelques mesures communes et leurs équivalents métriques pour ce prémélange seront : une cuillère à thé rase = 3 g, une cuillère à table rase = 9 g, et une tasse = 140 g.

Entreposage: Conserver dans un endroit sec entre 5°C and 30°C.

Contenu net : 25 kg

Fabriqué par :

Bio Agri Mix LP

CP 399

Mitchell, ON

N0K 1N0



**CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY**

**CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

No. de Lot :

Exp. :