

version : 2017-09-05

VARNISH



Lincomix^{MD} 100

DIN 00813745

Lincomix^{MD} 100

solution injectable de chlorhydrate de lincomycine

Usage vétérinaire seulement stérile

antibiotique pour porcs



Mises en garde : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 48 heures après le dernier traitement avec ce médicament.

Garder hors de la portée des enfants

Net 100 mL

zoetis



Ingrédient médicamenteux : 100 mg de lincomycine (sous forme de chlorhydrate de lincomycine), par mL.

Agent de conservation : 9 mg d'alcool benzilique, par mL.

Indications : Pour le traitement de l'arthrite infectieuse chez les porcs causée par des souches sensibles de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Erysipelothrix* spp. et *Mycoplasma* spp., et pour le traitement de la dysenterie porcine.

Posologie et administration : Administrer par voie intramusculaire, dès les premiers signes d'infection, 1 mL par 10 kg de poids corporel une fois par jour, pendant 3 à 7 jours.

Précautions : Utiliser chez les porcs seulement. Les porcs traités peuvent présenter un amollissement des selles mais ces effets sont légers et passagers.

Il n'est pas recommandé d'utiliser la solution injectable Lincomix 100 afin de traiter ou contrôler les épidémies de dysenterie porcine. On peut prendre soin de ce problème par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement ou la moulée puisque tous les animaux dans l'enclos doivent être traités. L'utilisation de la solution injectable Lincomix 100 chez les porcs très malades ou moribonds à cause de la dysenterie porcine est recommandée jusqu'à ce qu'ils reprennent l'appétit et/ou consommation plus d'eau afin de permettre une consommation suffisante de médication orale.

Entreposage : Entreposer entre 15 et 25 °C. Protéger du gel.

Zoetis est une marque de commerce et Lincomix est une marque déposée de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.

DIN 00813745

Lincomix^{MD} 100

lincomycin hydrochloride injectable solution

Veterinary Use Only sterile

antibiotic for swine




Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 48 hours after the latest treatment with this drug.

Keep out of the reach of children

Net 100 mL

zoetis



Medicinal Ingredient: Lincomycin (as lincomycin hydrochloride), 100 mg/mL.

Preservative: Benzyl alcohol, 9 mg/mL.

Indications: For treatment of infectious arthritis in swine caused by susceptible strains of *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Erysipelothrix* spp. and *Mycoplasma* spp., and for the treatment of swine dysentery.

Dosage and Administration: Administer intramuscularly, 1 mL per 10 kg body weight once daily at first signs of infection and continue treatment for 3 to 7 days.

Cautions: Use only in swine. Loose stools following treatment have been rarely reported but the diarrhea is usually mild and transient.

It is not recommended that Lincomix 100 Injectable Solution be used to treat or control outbreaks of swine dysentery. This is more readily achieved through the drinking water or feed since all animals in a barn must be treated. The use of Lincomix 100 Injectable Solution in extremely sick or moribund pigs suffering from swine dysentery is recommended until appetite and/or water consumption improvements allow adequate intake of oral medication.

Storage: Store between 15 and 25°C. Protect from freezing.

Zoetis is a trademark and Lincomix is a registered trademark of Zoetis or its licensors, used under license by Zoetis Canada Inc.

Zoetis Canada Inc.
Kirkland QC H9H 4M7

1610-14-1

40017067

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|
| zoetis Artwork Center / Louvain-la-Neuve / BELGIUM | | LLN | |
| GRAPHIST | Corinne STEVENS | PRODUCT NAME | LINCOMIX 100 |
| CR NR | 200002887 | ITEM | BOX 100 ml Z58 |
| DIR NR / 1 ^{er} | 503982 | QTN | NA |
| COUNTRY / RES | CANADA | NEW CODE | 40017067 |
| DATE(S) & VERSION(S) NR | 05/04/2017 - v1 | TECHNICAL MASTER / LAYOUT | B051-b1/LOB-032 |
| | 11/04/2017 - v2 | OLD CODE | NA |
| | | SIZE (mm) | 55 x 56,5 x 110 |
| | | DESCRIPTION OF REQUEST: | 18-1 / 63-1 |
| | | | New launch |
| DATAMATRIX CHECK | 40017067 | BARCODE CHECK | 694254001120 |
| | | FONT SIZE(S) | 7 pt |

version : 2017-09-05

DEV 00813745

Lincomix 100
 Incomycin hydrochloride
 injectable solution / solution
 injectable de chlorhydrate
 de lincomycine

Veterinary Use Only
 Usage vétérinaire seulement

sterile / stérile
 antibiotic / antibiotique
 for swine / pour porcs

Net 100 mL

zoetis

Ingrédient médicamenteux : 100 mg de lincomycine (sous forme de chlorhydrate de lincomycine), par mL.
Agent de conservation : 9 mg d'édétat benzotriazole.

Indications : Pour le traitement de l'arthrite infectieuse chez les porcs causée par des bactéries sensibles de *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Erysipelothrix* spp. et *Mycoplasma* spp., et pour le traitement de la dysenterie porcine.

Posologie et administration : Administrez par voie intramusculaire, deux fois par jour, pendant 1 à 7 jours.

Mises en garde : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 48 heures après le dernier traitement avec ce médicament. Gardez hors de la portée des enfants.

Entreposage : Entreposer entre 15 et 25 °C. Protéger du gel.

Valable toute sa durée de conservation.
 Zoetis est une marque de commerce et Lincomix est une marque déposée de Zoetis ou de ses associés dans de nombreux pays. Zoetis Canada Inc. 1610-05-1

Medicinal Ingredient: Lincomycin (as lincomycin hydrochloride), 100 mg/mL.
Preservative: Benzyl alcohol, 9 mg/mL.

Indications: For treatment of infectious arthritis in swine caused by susceptible strains of *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Erysipelothrix* spp. and *Mycoplasma* spp., and for the treatment of swine dysentery.

Dosage and Administration: Administer intramuscularly, 1 mL per 10 kg body weight once daily at first signs of infection and continue treatment for 3 to 7 days.

Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 48 hours after the last treatment with this drug. Keep out of the reach of children.

Storage: Store between 15 and 25°C. Protect from freezing.

See carton for Caution.

Zoetis is a trademark and Lincomix is a registered trademark of Zoetis or its licensors, used herein by Zoetis Canada Inc. Zoetis Canada Inc. Kirkland QC H9H 4M7 1610-05-1

LOT / CDM

UNVARNISHED

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|
| zoetis Artwork Center / Louvain-la-Neuve / BELGIUM | | LLN | |
| GRAPHIST | Corinne STEVENS | PRODUCT NAME | LINCOMIX 100 |
| CR NR | 200002887 | ITEM | LABEL 100 ml Z64 |
| DIR NR / V° | 503912 | NO-GTAL-NR | |
| COUNTRY (IES) | CANADA | NEW CODE | 40017066 L108 |
| DATE(S) & VERSION(S) NR | 05/04/2017 - v1 | TECHNICAL MASTER / LAYOUT | |
| | 11/04/2017 - v2 | OLD CODE | NA |
| | 11/04/2017 - v3 | DESCRIPTION OF REQUEST: | New launch |
| DATAMATRIX CHECK | 40017066 | SIZE (mm) | 40 x 92 |
| | | FONT SIZE(S) | 4 pt |