

DIN 00738336

 **Pig Zest**

**Antibiotic and Vitamin Suspension for Piglets
Veterinary Use Only**

Active Ingredients	per mL
Neomycin (as sulfate)	19.92 mg
Streptomycin (as sulfate)	15.50 mg
Vitamin A	958.30 I.U.
Vitamin D ₃	176.70 I.U.
Thiamine	0.88 mg
Riboflavin	2.07 mg
Niacin	1.47 mg
Calcium d-pantothenate	0.88 mg
Pyridoxine hydrochloride	0.075 mg
Vitamin B ₁₂	0.88 µg

INDICATIONS:

As an aid in the prevention or treatment of bacterial scours in piglets.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

For oral use only.

As an aid in the prevention of bacterial scours in piglets of 2 to 4 days of age:

Give each piglet one dose (1.2 mL).

As an aid in the treatment of bacterial scours in newborn piglets only:

Give each piglet one dose (1.2 mL). Repeat in 24 hours, if necessary.

If no improvement is noted, the diagnosis should be re-evaluated.

WARNINGS:

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 14 days after the latest treatment with this drug. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

STORAGE:

Store between 15 and 30°C.

Net Contents: 12 mL

Manufactured By:

Remedy Animal Health Products Ltd.

9526 Haldane Road
Kelowna, British Columbia V4V 2K5
Lot:
Exp.:

DIN 00738336

 **Pig Zest**

Suspension d'antibiotiques et de vitamines pour les porcelets
Usage vétérinaire seulement

Ingrédients actifs	par mL
Néomycine (sous forme de sulfate)	19.92 mg
Streptomycine (sous forme de sulfate)	15.50 mg
Vitamine A	958.30 U.I.
Vitamine D ₃	176.70 U.I.
Thiamine	0.88 mg
Riboflavine	2.07 mg
Niacine	1.47 mg
d-pantothénate de calcium	0.88 mg
Chlorhydrate de pyridoxine	0.075 mg
Vitamine B ₁₂	0.88 µg

INDICATIONS :

Pour aider à prévenir ou à traiter la diarrhée bactérienne chez les porcelets.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Par voie orale seulement.

Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne chez les porcelets âgés de 2 à 4 jours :

Donner à chaque porcelet une dose (1,2 ml).

Pour aider au traitement de la diarrhée bactérienne chez les porcelets naissants seulement :

Donner à chaque porcelet une dose (1,2 ml). Si nécessaire, répéter après 24 heures.

Si aucune amélioration n'est notée, le diagnostic devrait être réévalué.

MISES EN GARDE :

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE :

Entreposer entre 15 et 30 °C.

Contenu Net : 12 mL

Fabriqué par :

Remedy Animal Health Products Ltd.

9526 Haldane Road

Kelowna, British Columbia V4V 2K5