

Main panel Label-English and French:

Pr Oribiotic

Neomycin sulfate, Bacitracin, Nystatin, Triamcinolone Acetonide and Lidocaine Ointment
Onguent de sulfate de néomycine, bacitracine, nystatine, acétonide de triamcinolone et de lidocaïne

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Antibiotic/Antifungal/Anti-inflammatory
Antibiotique/Antifongique/Anti-inflamatoire

DIN 02080478

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Net 15 mL



Lot Exp

Bimeda-MTC
Animal Health Inc.
Santé Animale Inc.

Side panel Label- English:

ACTIVE INGREDIENTS: Each mL contains:

Triamcinolone Acetonide 0.86 mg
Neomycin Base (as sulfate) 3.0 mg
Nystatin 86 000 IU
Bacitracin..... 430 IU
Lidocaine..... 8.6 mg

INDICATIONS:

As an aid in the treatment of acute and chronic external otitis, associated with bacterial and fungal infections in dogs.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

DOGS: Carefully clean and dry the affected area. Apply into the ear canal 2-3 times daily for 4 days. If the expected results are not seen, the diagnosis should be re-evaluated.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use in the presence of purulent discharge.

CAUTIONS:

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Sensitivity to neomycin may occur. If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use.

Absorption of triamcinolone through topical application and by licking may occur. Animals should be observed for signs of polydipsia, polyuria and increased weight gain.

STORAGE:

Store at room temperature (15°-30°C).

Manufactured by/ Fabriqué par :

Bimeda-MTC Animal Health Inc./Santé Animale Inc.

Cambridge ON N3C 2W4

8BTL015B

Side panel Label-French:

INGRÉDIENTS ACTIFS : Chaque mL contient :

Acétonide de triamcinolone	0.86 mg
Néomycine base (comme sulfate)	3.0 mg
Nystatine	86 000 UI
Bacitracine	430 UI
Lidocaïne.....	8.6 mg

INDICATIONS :

Employer comme aide dans le traitement de l'otite externe aiguë et chronique associés aux infections bactériennes et fongiques chez les chiens.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

CHIENS: Nettoyer avec soin la région affectée et assécher. Appliquer dans le canal externe de l'oreille 2 à 3 fois par jour, pendant 4 jours consécutifs. Si les résultats attendus ne sont pas observés, le diagnostic devrait être réévalué.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en présence de décharge purulente.

PRÉCAUTIONS :


POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.

Une réaction au néomycine peut se produire. Si rougeur, irritation ou enflure persiste ou augmente, cesser l'utilisation.

L'absorption de triamcinolone après application topique peut se produire en léchant. Tout animal doit être observé régulièrement pour symptôme de polydipsie, polyurie, et gain de poids.

ENTREPOSAGE :

Garder à la température ambiante (15° -30°C).



Main panel Label:

Pr Oribiotic

Neomycin sulfate, Bacitracin, Nystatin, Triamcinolone Acetonide and Lidocaine Ointment
Onguent de sulfate de néomycine, bacitracine, nystatine, acétonide de triamcinolone et de lidocaïne

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Antibiotic/Antifungal/Anti-inflammatory
Antibiotique/Antifongique/Anti-inflamatoire

DIN 02080478

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Net 250 mL



Lot Exp

Bimeda-MTC
Animal Health Inc.
Santé Animale Inc.

Side panel Label: English

ACTIVE INGREDIENTS: Each mL contains:

Triamcinolone Acetonide	0.86 mg
Neomycin Base (as sulfate)	3.0 mg
Nystatin	86 000 IU
Bacitracin.....	430 IU
Lidocaine.....	8.6 mg

INDICATIONS:

As an aid in the treatment of acute and chronic external otitis associated with bacterial and fungal infections in dogs.

DOSAGE:

DOGS: Carefully clean and dry the affected area. Apply into the ear canal 2-3 times daily for 4 days. If expected results are not seen, the diagnosis should be re-evaluated.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use in the presence of purulent discharge.

CAUTION:

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Sensitivity to neomycin may occur. If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use.

Absorption of triamcinolone through topical application and by licking may occur. Animals should be observed for signs of polydipsia, polyuria and increased weight gain.

STORAGE:

Store at room temperature (15°-30°C).

Manufactured by/ Fabriqué par :

Bimeda-MTC Animal Health Inc./Santé Animale Inc.

Cambridge ON N3C 2W4

8BTL015B

Side panel Label: French

INGRÉDIENTS ACTIFS : Chaque mL contient :

Acétonide de triamcinolone	0.86 mg
Néomycine base (comme sulfate)	3.0 mg
Nystatine	86 000 UI
Bacitracine	430 UI
Lidocaïne.....	8.6 mg

INDICATIONS :

Employer comme aide dans le traitement de l'otite externe aiguë et chronique associés aux infections bactériennes et fongiques chez les chiens.

POSOLOGIE :

CHIENS : Nettoyer avec soin la région affectée et assécher. Appliquer dans le canal externe de l'oreille 2 à 3 fois par jour, pendant 4 jours consécutifs. Si les résultats attendus ne sont pas observés, le diagnostic devrait être réévalué.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en présence de décharge purulente.

PRÉCAUTION :

POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.

Une réaction au néomycine peut se produire. Si rougeur, irritation ou enflure persiste ou augmente, cesser l'utilisation.

L'absorption de triamcinolone après application topique peut se produire en léchant. Tout animal doit être observé régulièrement pour symptôme de polydipsie, polyurie, et gain de poids.

ENTREPOSAGE :

Garder à la température ambiante (15° -30°C).

