

Pr **TETRA 1000**

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE USP / CHLORHYDRATE DE TÉTRACYCLINE USP

Water soluble Powder / Poudre hydrosoluble

**FOR VETERINARY USE ONLY / POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
ANTIBIOTIC/ANTIBIOTIQUE**

ANTIBIOTIC: For oral administration

ACTIVE INGREDIENT: Each g contains 1000 mg of tetracycline hydrochloride.

Each teaspoon contains 5 g of tetracycline hydrochloride approximately.

INDICATIONS:

CALVES - For bacterial scours and bacterial pneumonia.

SWINE - For bacterial enteritis and bacterial pneumonia.

POULTRY - For the treatment and prevention of synovitis and bacterial enteritis.

DOSAGE:

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

CALVES - Use 225 mg per 45 kg body weight twice daily for 2 or 3 days.

SWINE - Use 225 mg per 45 kg body weight twice daily for 3 or 4 days.

POULTRY - Use 550 mg per 3 gallons of water for 3 or 4 days.

Note: 1 teaspoon contains approximately 5 g (5000 mg) of tetracycline hydrochloride.

WARNINGS:

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment. Do not use in laying birds. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.

Keep out of reach of children.

STORAGE: Store at room temperature (15 - 30°C).

ANTIBIOTIQUE : Par voie orale

INGRÉDIENT ACTIF: Chaque g contient 1000 mg de chlorhydrate de tétracycline.

Chaque cuillerée à thé contient approximativement 5 g de chlorhydrate de tétracycline.

INDICATIONS :

Veaux : Pour la diarrhée bactérienne et la pneumonie bactérienne.

Porcs : Pour l'entérite bactérienne et la pneumonie bactérienne.

Volailles : Pour le traitement et la prévention des synovites et des entérites bactériennes.

POSOLOGIE :

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Veaux : Utiliser 225 mg par 45 kg de poids vif, 2 fois par jour, pendant 2 ou 3 jours.

Porcs : Utiliser 225 mg par 45 kg de poids vif, 2 fois par jour, pendant 3 ou 4 jours.

Volailles : Utiliser 550 mg par 3 gallons (11,35 litres) d'eau, pendant 3 ou 4 jours.

Remarque : 1 cuillerée à thé contient approximativement 5 g (5000 mg) de chlorhydrate de tétracycline.

MISES EN GARDE :

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas administrer aux volailles en période de ponte. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE : Conserver à la température ambiante (de 15 à 30 °C).

Manufactured by / Fabriqué par: JAAPHARM CANADA INC.

510 Rowntree Dairy Road, Unit # 4, Woodbridge, Ontario L4L 8H2



JAAPHARM
CANADA INC.

NET WEIGHT / POIDS NET: 500 g
LOT EXP