

**PrTETRA 55**

Tetracycline Hydrochloride Water Soluble Powder  
Poudre hydrosoluble de chlorhydrate de tétracycline

**Veterinary use only/Usage vétérinaire seulement  
Antibiotic/Antibiotique**

**ACTIVE INGREDIENT:** Each g contains 55.0 mg of tetracycline hydrochloride.

**INDICATIONS:**

**Calves:** As an aid in the treatment of bacterial scours and bacterial pneumonia.

**Swine:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis and bacterial pneumonia.

**Sheep:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis.

**Poultry:** As an aid in the treatment and prevention of synovitis and bacterial enteritis, Blue comb or hexamitiasis (diseases specific to turkeys), chronic respiratory disease (CRD).

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

**Swine:** 11.2 g powder (2 3/4 teaspoonful) per 5L of water or milk for 4 to 5 days.

**Newborn pigs:** 8 g (2 teaspoons) powder to 28 mL of water. Administer 5 mL of this mixture once every 24 hours for three days.

**Calves:** For calves under 45 kg, 5.6 g (1 ½ teaspoon) powder once daily; for calves over 45 kg, 11.2 g (2 ¾ teaspoonful) powder once daily for 3 to 5 days.

**Sheep:** 4 g (1 teaspoonful) powder to 136 mL of milk administered as a drench once a day for 3 to 5 days.

**Poultry:** 8 g (2 teaspoonful) per 4.5 litres of water for 3 to 5 days.

**Note:** 4 g (1 teaspoon) powder contains approximately 220 mg of tetracycline hydrochloride.

**CAUTION:** In all cases provide only medicated drinking water during the treatment period and prepare a fresh solution daily.

**WARNINGS:** Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment. Do not use in laying birds. Do not use in lactating dairy cattle. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

**STORAGE:** Store at room temperature (15 - 30° C).

**INGRÉDIENT ACTIF:** Chaque g contient 55,0 mg de chlorhydrate de tétracycline.

**INDICATIONS :**

**Veaux :** Comme aide au traitement des diarrhées bactériennes et des pneumonies bactériennes.

**Porcs :** Comme aide au traitement des entérites bactériennes et des pneumonies bactériennes.

**Agneaux :** Comme aide au traitement des entérites bactériennes.

**Volailles :** Comme aide au traitement et à la prévention des synovites, entérites bactériennes, maladies de la crête bleue, hexamitiase (maladie du dinde) et maladies respiratoires chroniques (MRC).

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

**Porcs :** 11,2 g (2 ¾ cuillerées à thé) de poudre dans 5 L d'eau ou de lait pendant 4 ou 5 jours.

**Porcelets nouveau-nés :** 8 g (2 cuillerées à thé) de poudre dans 28 mL d'eau. Administrer 5 mL de ce mélange toutes les 24 heures pendant trois (3) jours.

**Veaux :** Pour les veaux de moins de 45 kg, utiliser 5,6 g (1 ½ cuillerée à thé) de poudre une fois par jour; et pour les veaux de plus de 45 kg, utiliser 11,2 g (2 ¾ cuillerées à thé) de poudre par jour pendant 3 à 5 jours.

**Agneaux :** Dissoudre 4 g (1 cuillerée à thé) de poudre dans 136 mL de lait; administrer à la bouteille une fois par jour pendant 3 à 5 jours.

**Volailles :** Dissoudre 8 g (2 cuillerées à thé) de poudre dans 4,5 litres d'eau pendant 3 à 5 jours.

**Remarque :** 4 g (1 cuillerée à thé) de poudre contient environ 220 mg de chlorhydrate de tétracycline.

**PRÉCAUTION :** Ne donner à boire que de l'eau médicamenteuse pendant le traitement et administrer chaque jour une solution fraîchement préparée.

**MISES EN GARDE :** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas administrer aux volailles en période de ponte. Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

**ENTREPOSAGE :** Conserver à la température ambiante (de 15 à 30 °C).

**Manufactured by / Fabriqué par:** JAAPHARM CANADA INC.

510 Rountree Dairy Rd., Unit # 4, Woodbridge, Ontario L4L 8H2



**JAAPHARM**  
CANADA INC.

**NET WEIGHT / POIDS NET:454 g**  
**LOTEXP**