

Outsert – English & French:

Distributed by/ Distribué par : Vetoquinol N.-A. Inc. 2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC CANADA J5T 3S5	DIN 01940295 Pr Oxy LP OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE INJECTABLE SOLUTION SOLUTION INJECTABLE DE CHLORHYDRATE D'OXYTÉTRACYCLINE Veterinary Use Only Usage Vétérinaire Seulement Antibiotic/Antibiotique Sterile/Stérile <i>Net 500 mL</i> WARNINGS: In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site. Milk taken from treated animals during treatment and within 72 hours after the latest treatment must not be used as food. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 18 days after the latest treatment with this drug. Keep out of reach of children. MISES EN GARDE: Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 ml de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 72 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 18 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Garder hors de la portée des enfants.	ACTIVE INGREDIENT: Oxytetracycline hydrochloride 100 mg / mL in an aqueous solution. INDICATIONS: Treatment of all infections in cattle, swine and sheep caused by oxytetracycline susceptible bacteria. DOSAGE AND ADMINISTRATION: For intravenous or intramuscular use. Inject at the rate of 3 mL per 45 kg body weight once daily for 2 to 3 days. See package insert for complete directions. CAUTIONS: Occasional sensitivity (anaphylaxis) to oxytetracycline has been known to occur. In such cases, administer epinephrine immediately. STORAGE: Store at room temperature, between 15° and 25°C. Do not freeze. Protect from light. See package insert for complete product information. INGRÉDIENT ACTIF: Chlorhydrate d'oxytétracycline 100 mg/ml en solution aqueuse. INDICATIONS: Traitement de toutes les infections chez les bovins, les porcs et les moutons causées par les bactéries sensibles à l'oxytétracycline. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Pour usage intraveineux ou intramusculaire. Injecter à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel une fois par jour pendant 2 à 3 jours. Pour les instructions complètes, consulter le dépliant ci-joint. PRÉCAUTIONS: Une sensibilité (anaphylaxie) à l'oxytétracycline a parfois été signalée. Si cela se produit, administrer de l'épinéphrine immédiatement. ENTREPOSAGE: Entreposer à une température ambiante, entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. Voir le dépliant pour les informations complètes du produit.
1 80023 6 73994	8OXY025B	



Label Outsert (extendable booklet) – English:

DIN 01940295

Pr Oxy LP

Oxytetracycline Hydrochloride Injection

Veterinary Use Only

Antibiotic

Sterile

DESCRIPTION:

Oxy LP is a sterile, clear, stable solution of oxytetracycline hydrochloride, for intravenous or intramuscular administration.

Oxy LP offers:

1. Broad spectrum activity for clinical efficacy where narrow spectrum antibiotics fail.
2. Product can be used in lactating dairy cattle.
3. Pain on injection is minimized.
4. Viscosity and syringeability are satisfactory at both 5°C and 24°C.

ACTIVE INGREDIENT:

Each mL contains 100 mg of oxytetracycline hydrochloride in an aqueous solution.

ABSORPTION AND EXCRETION:

By intravenous injection, immediate therapeutic blood levels are achieved. By intramuscular injection, therapeutic levels are achieved within 2 hours. These levels persist for 24 hours or longer. Further, oxytetracycline diffuses readily into the tissues, so that high concentrations are found in the lungs and mammary gland, as well as in the urine, feces and milk. For this reason, parenteral therapy is ideally suited in the treatment of pneumonia, enteritis, mastitis and many other systemic conditions.

INDICATIONS:

Oxy LP is indicated in the treatment of all infections caused by oxytetracycline susceptible bacteria in cattle, swine and sheep.

Cattle: Bacterial Pneumonia, Pasteurellosis (associated with shipping fever complex), Mastitis, Metritis, Calf Scours (Bacterial Enteritis), Foot Rot, Navel Ill, Calf Diphtheria, Leptospirosis, Blackleg/Malignant Edema, Peritonitis, and Joint Ill.

Swine: Erysipelas, Bacterial Enteritis, Leptospirosis, Metritis, Mastitis, and Bacterial Pneumonia.

Sheep: Bacterial Pneumonia, Pasteurellosis, Mastitis, Metritis, and Joint Ill.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Oxy LP should be warmed to body temperature prior to administration. Administer by intramuscular or intravenous injection at the rate of 3 mL per 45 kg body weight once daily for 2 to 3 days. Higher blood levels can be achieved following IV administration of this dosage.

Bacterial Enteritis (Scours) in Nursing Pigs: As an aid in the prevention of bacterial enteritis (scours) in nursing pigs, inject the sow intramuscularly at the rate of 3 mL per 45 kg body weight when clinical signs of scours are first noticed.

CAUTIONS:

1. Do not inject more than 20 mL of Oxy LP at one site. In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site. For intravenous administration, Oxy LP should be diluted with isotonic saline, dextrose or similar solutions. For this, use 25 mL to each 100 mL or more of diluent and administer slowly.
2. Occasional sensitivity reactions have been observed following the parenteral administration of oxytetracycline. If such adverse reactions occur, discontinue use of drug immediately. Epinephrine solution given intramuscularly is indicated.
3. Shock can occur occasionally as a result of rapid intravenous injection.

WARNINGS:

1. In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site.
2. Milk taken from treated animals during treatment and within 72 hour after the latest treatment must not be used as food.
3. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 18 days after the latest treatment with this drug.
4. Keep out of reach of children.

STORAGE:

Store at room temperature, between 15°C and 25°C. Do not freeze. Protect from light.

PRESENTATION:

Oxy LP is packed in 250 mL and 500 mL vials.

Manufactured by:

Citadel Animal Health

Cambridge, ON N3C 2W4

Distributed by

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC

CANADA J5T 3S5

Label Outsert (extendable booklet) – French:

DIN 01940295

Pr Oxy LP

Injection de chlorhydrate d'oxytétracycline

Usage vétérinaire seulement

Antibiotique

Stérile

DESCRIPTION :

Oxy LP est une solution limpide, stérile et stable de chlorhydrate d'oxytétracycline pour administration intraveineuse ou intramusculaire.

Oxy LP offre :

1. Un large spectre d'activité antibactérien pour une efficacité clinique là où les antibiotiques à spectre restreint échouent.
2. Le produit peut être utilisé chez les vaches laitières en lactation.
3. La douleur au moment de l'injection est atténuée.
4. Sa viscosité et sa facilité d'emploi sont satisfaisantes à 5°C et 24°C.

INGRÉDIENT ACTIF :

Chaque ml contient 100 mg de chlorhydrate d'oxytétracycline en solution aqueuse.

ABSORPTION ET EXCRÉTION :

En injection intraveineuse, des taux sanguins thérapeutiques sont obtenus immédiatement. En injection intramusculaire, des taux thérapeutiques sont atteints dans les 2 heures. Ces taux durent 24 heures et plus. En outre, l'oxytétracycline se diffuse facilement dans les tissus de sorte qu'on retrouve des concentrations élevées dans les poumons et la glande mammaire, ainsi que dans l'urine, les selles et le lait. C'est pourquoi le traitement parentéral convient de façon idéale dans la pneumonie, l'entérite et beaucoup d'autres maladies.

INDICATIONS :

Oxy LP est indiquée dans le traitement de toutes les infections causées par les bactéries sensibles à l'oxytétracycline chez les bovins, les porcs et les moutons.

Bovins : Pneumonie bactérienne, Pasteurellose (associée au complexe de la Fièvre du transport), Mammite, Métrite, Diarrhée des veaux (Entérite bactérienne), Piétin, Omphalo-phlébite (Maladie du nombril), Diphthérie des veaux, Leptospirose, Charbon symptomatique / oedème malin, Péritonite, et Arthrite de veaux.

Porcs : Rouget, Entérite bactérienne, Leptospirose, Métrite, Mammite, et Pneumonie bactérienne.

Moutons : Pneumonie bactérienne, Pasteurellose, Mammite, Métrite, et Arthrite des agneaux.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Oxy LP doit être réchauffée à la température du corps avant d'être administré. Injecter par voie intramusculaire ou intraveineuse à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel une fois par jour pendant 2 ou 3 jours. On peut obtenir des taux sanguins plus élevés avec l'administration intraveineuse de cette posologie.

Entérite bactérienne (diarrhée) chez les porcelets à la mamelle : Pour aider à la prévention de l'entérite bactérienne (diarrhée) chez les porcelets à la mamelle, injecter la truie par voie intramusculaire à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel dès que les signes cliniques de diarrhée se manifestent.

PRÉCAUTIONS :

1. Ne pas injecter plus de 20 mL de Oxy LP en un même point. Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 mL de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection. Pour l'administration intraveineuse, il faut diluer Oxy LP à l'aide d'une solution saline isotonique, de dextrose ou d'autres solutions du même genre. Pour effectuer la dilution, utilisez 25 mL Oxy LP à 100 mL au minimum de solution à diluer et administrez-la lentement.
2. Des réactions de sensibilité ont parfois été observées à la suite de l'administration parentérale d'oxytétracycline. Si de tels réactions indésirables se produisent, discontinuer immédiatement l'emploi du

médicament. L'administration intramusculaire d'une solution d'épinéphrine est indiquée.

3. Des réactions de sensibilité (choc) se sont parfois produites à la suite d'injections intraveineuses rapide.

MISES EN GARDE :

1.Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 ml de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection.

2. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 72 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.

3. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 18 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

4. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE :

Entreposer à une température ambiante entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

PRÉSENTATION :

Oxy LP est présentée en fioles de 250 mL et 500 mL.

Fabriqué par :

Citadel Santé Animale

Cambridge, ON N3C 2W4

Distribué par :

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC

CANADA J5T 3S5

Outsert – English & French:

Distributed by/ Distribué par : Vetoquinol N.-A. Inc. 2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC CANADA J5T 3S5	DIN 01940295 Pr Oxy LP OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE INJECTABLE SOLUTION SOLUTION INJECTABLE DE CHLORHYDRATE D'OXYTÉTRACYCLINE Veterinary Use Only Usage Vétérinaire Seulement Antibiotic/Antibiotique Sterile/Stérile Net 250 mL WARNINGS: In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site. Milk taken from treated animals during treatment and within 72 hours after the latest treatment must not be used as food. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 18 days after the latest treatment with this drug. Keep out of reach of children. MISES EN GARDE: Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 ml de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 72 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 18 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Garder hors de la portée des enfants.	ACTIVE INGREDIENT: Oxytetracycline hydrochloride 100 mg / mL in an aqueous solution. INDICATIONS: Treatment of all infections in cattle, swine and sheep caused by oxytetracycline susceptible bacteria. DOSAGE AND ADMINISTRATION: For intravenous or intramuscular use. Inject at the rate of 3 mL per 45 kg body weight once daily for 2 to 3 days. See package insert for complete directions. CAUTIONS: Occasional sensitivity (anaphylaxis) to oxytetracycline has been known to occur. In such cases, administer epinephrine immediately. STORAGE: Store at room temperature, between 15° and 25°C. Do not freeze. Protect from light. See package insert for complete product information. INGRÉDIENT ACTIF: Chlorhydrate d'oxytétracycline 100 mg/ml en solution aqueuse. INDICATIONS: Traitement de toutes les infections chez les bovins, les porcs et les moutons causées par les bactéries sensibles à l'oxytétracycline. POSÉLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Pour usage intraveineux ou intramusculaire. Injecter à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel une fois par jour pendant 2 à 3 jours. Pour les instructions complètes, consulter le dépliant ci-joint. PRÉCAUTIONS: Une sensibilité (anaphylaxie) à l'oxytétracycline a parfois été signalée. Si cela se produit, administrer de l'épinéphrine immédiatement. ENTREPOSAGE: Entreposer à une température ambiante, entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. Voir le dépliant pour les informations complètes du produit.
1 80023 6 73994		8OXY025B

Label Outsert (extendable booklet) – English:

DIN 01940295

Pr Oxy LP

Oxytetracycline Hydrochloride Injection

Veterinary Use Only

Antibiotic

Sterile

DESCRIPTION:

Oxy LP is a sterile, clear, stable solution of oxytetracycline hydrochloride, for intravenous or intramuscular administration.

Oxy LP offers:

1. Broad spectrum activity for clinical efficacy where narrow spectrum antibiotics fail.
2. Product can be used in lactating dairy cattle.
3. Pain on injection is minimized.
4. Viscosity and syringeability are satisfactory at both 5°C and 24°C.

ACTIVE INGREDIENT:

Each mL contains 100 mg of oxytetracycline hydrochloride in an aqueous solution.

ABSORPTION AND EXCRETION:

By intravenous injection, immediate therapeutic blood levels are achieved. By intramuscular injection, therapeutic levels are achieved within 2 hours. These levels persist for 24 hours or longer. Further, oxytetracycline diffuses readily into the tissues, so that high concentrations are found in the lungs and mammary gland, as well as in the urine, feces and milk. For this reason, parenteral therapy is ideally suited in the treatment of pneumonia, enteritis, mastitis and many other systemic conditions.

INDICATIONS:

Oxy LP is indicated in the treatment of all infections caused by oxytetracycline susceptible bacteria in cattle, swine and sheep.

Cattle: Bacterial Pneumonia, Pasteurellosis (associated with shipping fever complex), Mastitis, Metritis, Calf Scours (Bacterial Enteritis), Foot Rot, Navel Ill, Calf Diphtheria, Leptospirosis, Blackleg/Malignant Edema, Peritonitis, and Joint Ill.

Swine: Erysipelas, Bacterial Enteritis, Leptospirosis, Metritis, Mastitis, and Bacterial Pneumonia.

Sheep: Bacterial Pneumonia, Pasteurellosis, Mastitis, Metritis, and Joint Ill.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Oxy LP should be warmed to body temperature prior to administration. Administer by intramuscular or intravenous injection at the rate of 3 mL per 45 kg body weight once daily for 2 to 3 days. Higher blood levels can be achieved following IV administration of this dosage.

Bacterial Enteritis (Scours) in Nursing Pigs: As an aid in the prevention of bacterial enteritis (scours) in nursing pigs, inject the sow intramuscularly at the rate of 3 mL per 45 kg body weight when clinical signs of scours are first noticed.

CAUTIONS:

1. Do not inject more than 20 mL of Oxy LP at one site. In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site. For intravenous administration, Oxy LP should be diluted with isotonic saline, dextrose or similar solutions. For this, use 25 mL to each 100 mL or more of diluent and administer slowly.
2. Occasional sensitivity reactions have been observed following the parenteral administration of oxytetracycline. If such adverse reactions occur, discontinue use of drug immediately. Epinephrine solution given intramuscularly is indicated.
3. Shock can occur occasionally as a result of rapid intravenous injection.

WARNINGS:

1. In lactating dairy cattle, no more than 10 mL of this product should be injected intramuscularly at one injection site.
2. Milk taken from treated animals during treatment and within 72 hour after the latest treatment must not be used as food.
3. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 18 days after the latest treatment with this drug.
4. Keep out of reach of children.

STORAGE:

Store at room temperature, between 15°C and 25°C. Do not freeze. Protect from light.

PRESENTATION:

Oxy LP is packed in 250 mL and 500 mL vials.

Manufactured by:

Citadel Animal Health

Cambridge, ON N3C 2W4

Distributed by

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC

CANADA J5T 3S5

Label Outsert (extendable booklet) – French:

DIN 01940295

Pr Oxy LP

Injection de chlorhydrate d'oxytétracycline

Usage vétérinaire seulement

Antibiotique

Stérile

DESCRIPTION :

Oxy LP est une solution limpide, stérile et stable de chlorhydrate d'oxytétracycline pour administration intraveineuse ou intramusculaire.

Oxy LP offre:

1. Un large spectre d'activité antibactérien pour une efficacité clinique là où les antibiotiques à spectre restreint échouent.
2. Le produit peut être utilisé chez les vaches laitières en lactation.
3. La douleur au moment de l'injection est atténuée.
4. Sa viscosité et sa facilité d'emploi sont satisfaisantes à 5°C et 24°C.

INGRÉDIENT ACTIF :

Chaque ml contient 100 mg de chlorhydrate d'oxytétracycline en solution aqueuse.

ABSORPTION ET EXCRÉTION :

En injection intraveineuse, des taux sanguins thérapeutiques sont obtenus immédiatement. En injection intramusculaire, des taux thérapeutiques sont atteints dans les 2 heures. Ces taux durent 24 heures et plus. En outre, l'oxytétracycline se diffuse facilement dans les tissus de sorte qu'on retrouve des concentrations élevées dans les poumons et la glande mammaire, ainsi que dans l'urine, les selles et le lait. C'est pourquoi le traitement parentéral convient de façon idéale dans la pneumonie, l'entérite et beaucoup d'autres maladies.

INDICATIONS :

Oxy LP est indiquée dans le traitement de toutes les infections causées par les bactéries sensibles à l'oxytétracycline chez les bovins, les porcs et les moutons.

Bovins : Pneumonie bactérienne, Pasteurellose (associée au complexe de la Fièvre du transport), Mammite, Métrite, Diarrhée des veaux (Entérite bactérienne), Piétin, Omphalo-phlébite (Maladie du nombril), Diphtérie des veaux, Leptospirose, Charbon symptomatique / oedème malin, Périctonite, et Arthrite de veaux.

Porcs : Rouget, Entérite bactérienne, Leptospirose, Métrite, Mammite, et Pneumonie bactérienne.

Moutons : Pneumonie bactérienne, Pasteurellose, Mammite, Métrite, et Arthrite des agneaux.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Oxy LP doit être réchauffée à la température du corps avant d'être administré. Injecter par voie intramusculaire ou intraveineuse à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel une fois par jour pendant 2 ou 3 jours. On peut obtenir des taux sanguins plus élevés avec l'administration intraveineuse de cette posologie.

Entérite bactérienne (diarrhée) chez les porcelets à la mamelle :

Pour aider à la prévention de l'entérite bactérienne (diarrhée) chez les porcelets à la mamelle, injecter la truie par voie intramusculaire à raison de 3 mL par 45 kg de poids corporel dès que les signes cliniques de diarrhée se manifestent.

PRÉCAUTIONS :

1. Ne pas injecter plus de 20 mL de Oxy LP en un même point. Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 mL de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection. Pour l'administration intraveineuse, il faut diluer Oxy LP à l'aide d'une solution saline isotonique, de dextrose ou d'autres solutions du même genre. Pour effectuer la dilution, utilisez 25 mL Oxy LP à 100 mL au minimum de solution à diluer et administrez-la lentement.
2. Des réactions de sensibilité ont parfois été observées à la suite de l'administration parentérale d'oxytétracycline. Si de tels réactions indésirables se produisent, discontinuer immédiatement l'emploi du

médicament. L'administration intramusculaire d'une solution d'épinéphrine est indiquée.

3. Des réactions de sensibilité (choc) se sont parfois produites à la suite d'injections intraveineuses rapide.

MISES EN GARDE :

1. Chez les vaches laitières en lactation, ne pas injecter plus de 10 mL de ce produit par voie intramusculaire en un même point d'injection.
2. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 72 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.
3. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 18 jours après le dernier traitement avec ce médicament.
4. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE :

Entreposer à une température ambiante entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

PRÉSENTATION :

Oxy LP est présentée en fioles de 250 mL et 500 mL.

Fabriqué par :

Citadel Santé Animale

Cambridge, ON N3C 2W4

Distribué par :

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC

CANADA J5T 3S5

