

**DIN 01976338**

**Pr NEO-TETRAMED**

**Neomycin sulfate/Tetracycline hydrochloride soluble powder  
Poudre soluble de sulfate de Néomycine/chlorhydrate de Tétracycline**

**VETERINARY USE ONLY  
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

Soluble antibiotics for chickens, turkeys, swine, and calves.  
Antibiotiques hydrosolubles pour poulets, dindes, porcs et veaux.

**ACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS ACTIFS :**

	<b>Each g contains</b> <b>Chaque g contient</b>	<b>Each 400 g contains</b> <b>Chaque 400 g contient</b>
Tetracycline Hydrochloride /	0.2 g	80 g
Chlorhydrate de Tétracycline		
Neomycin Sulfate /	0.2 g	80 g
Sulfate de Néomycine		
<i>neomycin eq. / néomycine éq.</i>	0.14 g	56 g

**WARNINGS:** Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least:  
Calves – 30 days, Swine – 14 days, Turkeys – 14 days, Broiler chickens – 7 days, after  
the latest treatment with this drug. This product must not be used in laying birds. When  
handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.  
Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins  
alimentaires dans un délai d'au moins: Veaux – 30 jours, Porcs – 14 jours, Dindes – 14  
jours, Poulets de gril – 7 jours, après le dernier traitement avec ce médicament. Ce  
produit ne doit pas être utilisé pour les volailles en période de ponte. Lors de la  
manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la  
peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.



**Bio Agri Mix LP**  
PO Box 399  
Mitchell, ON  
N0K 1N0



Net Contents / Contenu Net: 400 g

Lot :

Exp. :

BAM Oct 30/17

**DESCRIPTION:** NEO-TETRAMED contains two antibiotics: neomycin and tetracycline. The first one is known for its action against *E. coli* and other bacteria in the digestive system and the second is a broad-spectrum antibiotic readily absorbed from the digestive tract for activity throughout the body.

**INDICATIONS:**

**Chickens and turkeys:** As an aid in the treatment of infectious diseases caused by microorganisms susceptible to tetracycline and neomycin such as chronic respiratory disease (CRD), Bluecomb, synovitis and enteritis.

**Swine and Calves:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours) and respiratory diseases caused by microorganisms susceptible to tetracycline and neomycin.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

**Chickens and Turkeys:** 400 g or 800 g per 900 L of drinking water for 3 to 5 days.

**Swine (scours):** Add 2 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and administer as a drench or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

**Newborn Piglets (scours):** Mix 4 g of powder with 60 mL of water and give 5 mL of this solution orally to each piglet twice daily for 4 or 5 days.

**Swine and Newborn Piglets (respiratory diseases):** Add 4 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and give as a drench or mix 800 g per 900 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

**Calves (scours):**

Individual Treatment: Add 2 g of powder to 60 mL of water or milk substitute per 45 kg of body weight as a drench for 4 or 5 days.

Herd Treatment: Add 2 g of powder per 4.5 L of water or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

**Calves (respiratory diseases):**

Double above dosage for 4 or 5 days.

**Notes:** Fresh solutions should be prepared daily. The dosage is based on an average water intake. Care must be taken to ensure adequate water intake. 1 teaspoonful equals 4 g.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

**DESCRIPTION :** NEO-TETRAMED renferme deux antibiotiques: La néomycine et la tétracycline. Le premier est un antibiotique efficace pour combattre *E. coli* et autres bactéries du système digestif et le deuxième est un antibiotique à large spectre qui, suite à son absorption à travers l'appareil digestif, combat la plupart des bactéries qui envahissent l'organisme.

**INDICATIONS :**

**Poulets et dindes :** Pour aider au traitement des infections causées par des micro-organismes sensibles à la tétracycline et à la néomycine, telles que maladie respiratoire chronique (MRC), Crête bleue, synovite et entérite.

**Porcs et veaux :** Pour aider au traitement des maladies des voies respiratoires et de l'entérite bactérienne (diarrhée) causées par des micro-organismes sensibles à la tétracycline et la néomycine.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

**Poulets et dindes :** 400 g ou 800 g par 900 L d'eau de boisson pendant 3 à 5 jours.

**Porcs (diarrhée) :** Dissoudre 2 g dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Porcelets nouveau-nés (diarrhée) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 60 mL d'eau et donner 5 mL de cette solution à chaque porcelet oralement, 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours.

**Porcs et porcelets nouveau-nés (troubles respiratoires) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou dissoudre 800 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Veaux (diarrhée) :**

Individuel: Dissoudre 2 g de poudre dans 60 mL d'eau ou du substitut de lait par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage pendant 4 ou 5 jours.

Troupeau: Mélanger 2 g de poudre par 4.5 L d'eau ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Veaux (troubles respiratoires) :**

Doubler la dose précédente pendant 4 ou 5 jours.

**Remarques :** Préparer des solutions fraîches chaque jour. La posologie est basée sur une consommation moyenne d'eau. S'assurer que la consommation est suffisante. 1 c. à thé équivaut à 4 g.

**ENTREPOSAGE :** Conserver dans un endroit sec et frais en-dessous de 23°C. Éviter le gel.

NEO-TETRAMED 2.5 kg

Side Panel – English

**DIN 01976338**

**Pr NEO-TETRAMED**

**Neomycin sulfate/Tetracycline hydrochloride soluble powder  
Poudre soluble de sulfate de Néomycine/chlorhydrate de Tétracycline**

**VETERINARY USE ONLY  
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

Soluble antibiotics for chickens, turkeys, swine, and calves.  
Antibiotiques hydrosolubles pour poulets, dindes, porcs et veaux.

**ACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS ACTIFS :**

	<b>Each g contains</b> <b>Chaque g contient</b>	<b>Each 400 g contains</b> <b>Chaque 400 g contient</b>
Tetracycline Hydrochloride /	0.2 g	80 g
Chlorhydrate de Tétracycline		
Neomycin Sulfate /	0.2 g	80 g
Sulfate de Néomycine		
<i>neomycin eq. / néomycine éq.</i>	0.14 g	56 g

**WARNINGS:** Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least:  
Calves – 30 days, Swine – 14 days, Turkeys – 14 days, Broiler chickens – 7 days, after  
the latest treatment with this drug. This product must not be used in laying birds. When  
handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.  
Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins  
alimentaires dans un délai d'au moins: Veaux – 30 jours, Porcs – 14 jours, Dindes – 14  
jours, Poulets de gril – 7 jours, après le dernier traitement avec ce médicament. Ce  
produit ne doit pas être utilisé pour les volailles en période de ponte. Lors de la  
manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la  
peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.



**Bio Agri Mix LP**  
PO Box 399  
Mitchell, ON  
N0K 1N0



Net Contents / Contenu Net: 2.5 kg

Lot:

Exp.:

## NEO-TETRAMED 2.5 kg

Side Panel – English

**DESCRIPTION:** NEO-TETRAMED contains two antibiotics: neomycin and tetracycline. The first one is known for its action against *E. coli* and other bacteria in the digestive system and the second is a broad-spectrum antibiotic readily absorbed from the digestive tract for activity throughout the body.

### **INDICATIONS:**

**Chickens and turkeys:** As an aid in the treatment of infectious diseases caused by micro-organisms susceptible to tetracycline and neomycin such as chronic respiratory disease (CRD), Bluecomb, synovitis and enteritis.

**Swine and Calves:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours) and respiratory diseases caused by microorganisms susceptible to tetracycline and neomycin.

### **DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

**Chickens and Turkeys:** 400 g or 800 g per 900 L of drinking water for 3 to 5 days.

**Swine (scours):** Add 2 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and administer as a drench or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

**Newborn Piglets (scours):** Mix 4 g of powder with 60 mL of water and give 5 mL of this solution orally to each piglet twice daily for 4 or 5 days.

**Swine and Newborn Piglets (respiratory diseases):** Add 4 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and give as a drench or mix 800 g per 900 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

### **Calves (scours):**

Individual Treatment: Add 2 g of powder to 60 mL of water or milk substitute per 45 kg of body weight as a drench for 4 or 5 days.

Herd Treatment: Add 2 g of powder per 4.5 L of water or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

### **Calves (respiratory diseases):**

Double above dosage for 4 or 5 days.

**Notes:** Fresh solutions should be prepared daily. The dosage is based on an average water intake. Care must be taken to ensure adequate water intake. 1 teaspoonful equals 4 g.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

## NEO-TETRAMED 2.5 kg

Side Panel – French

**DESCRIPTION :** NEO-TETRAMED renferme deux antibiotiques: La néomycine et la tétracycline. Le premier est un antibiotique efficace pour combattre *E. coli* et autres bactéries du système digestif et le deuxième est un antibiotique à large spectre qui, suite à son absorption à travers l'appareil digestif, combat la plupart des bactéries qui envahissent l'organisme.

### **INDICATIONS :**

**Poulets et dindes :** Pour aider au traitement des infections causées par des micro-organismes sensibles à la tétracycline et à la néomycine, telles que maladie respiratoire chronique (MRC), Crête bleue, synovite et entérite.

**Porcs et veaux :** Pour aider au traitement des maladies des voies respiratoires et de l'entérite bactérienne (diarrhée) causées par des micro-organismes sensibles à la tétracycline et la néomycine.

### **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

**Poulets et dindes :** 400 g ou 800 g par 900 L d'eau de boisson pendant 3 à 5 jours.

**Porcs (diarrhée) :** Dissoudre 2 g dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Porcelets nouveau-nés (diarrhée) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 60 mL d'eau et donner 5 mL de cette solution à chaque porcelet oralement, 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours.

**Porcs et porcelets nouveau-nés (troubles respiratoires) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou dissoudre 800 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

### **Veaux (diarrhée) :**

Individuel: Dissoudre 2 g de poudre dans 60 mL d'eau ou du substitut de lait par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage pendant 4 ou 5 jours.

Troupeau: Mélanger 2 g de poudre par 4.5 L d'eau ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

### **Veaux (troubles respiratoires) :**

Doubler la dose précédente pendant 4 ou 5 jours.

**Remarques :** Préparer des solutions fraîches chaque jour. La posologie est basée sur une consommation moyenne d'eau. S'assurer que la consommation est suffisante. 1 c. à thé équivaut à 4 g.

NEO-TETRAMED 2.5 kg  
Side Panel – French

**ENTREPOSAGE :** Conserver dans un endroit sec et frais en-dessous de 23°C. Éviter le gel.

NEO-TETRAMED 10 kg  
Main Panel - Bilingual

DIN 01976338

**Pr NEO-TETRAMED**

**Neomycin sulfate/Tetracycline hydrochloride soluble powder**  
**Poudre soluble de sulfate de Néomycine/chlorhydrate de Tétracycline**

**VETERINARY USE ONLY**  
**USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

Soluble antibiotics for chickens, turkeys, swine, and calves.  
Antibiotiques hydrosolubles pour poulets, dindes, porcs et veaux.

**ACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS ACTIFS :**

	<b>Each g contains</b> <b>Chaque g contient</b>	<b>Each 400 g contains</b> <b>Chaque 400 g contient</b>
Tetracycline Hydrochloride /	0.2 g	80 g
Chlorhydrate de Tétracycline		
Neomycin Sulfate /	0.2 g	80 g
Sulfate de Néomycine		
<i>neomycin eq. / néomycine éq.</i>	0.14 g	56 g

**WARNINGS:** Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least:  
Calves – 30 days, Swine – 14 days, Turkeys – 14 days, Broiler chickens – 7 days, after  
the latest treatment with this drug. This product must not be used in laying birds. When  
handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.  
Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :** Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins  
alimentaires dans un délai d'au moins: Veaux – 30 jours, Porcs – 14 jours, Dindes – 14  
jours, Poulets de gril – 7 jours, après le dernier traitement avec ce médicament. Ce  
produit ne doit pas être utilisé pour les volailles en période de ponte. Lors de la  
manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la  
peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.



**Bio Agri Mix LP**  
PO Box 399  
Mitchell, ON  
N0K 1N0



Net Contents / Contenu Net: 10 kg

Lot:  
Exp.:

BAM Oct 30/17

## NEO-TETRAMED 10 kg

Side Panel - English

**DESCRIPTION:** NEO-TETRAMED contains two antibiotics: neomycin and tetracycline. The first one is known for its action against *E. coli* and other bacteria in the digestive system and the second is a broad-spectrum antibiotic readily absorbed from the digestive tract for activity throughout the body.

### INDICATIONS:

**Chickens and turkeys:** As an aid in the treatment of infectious diseases caused by microorganisms susceptible to tetracycline and neomycin such as chronic respiratory disease (CRD), Bluecomb, synovitis and enteritis.

**Swine and Calves:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours) and respiratory diseases caused by microorganisms susceptible to tetracycline and neomycin.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

**Chickens and Turkeys:** 400 g or 800 g per 900 L of drinking water for 3 to 5 days.

**Swine (scours):** Add 2 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and administer as a drench or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

**Newborn Piglets (scours):** Mix 4 g of powder with 60 mL of water and give 5 mL of this solution orally to each piglet twice daily for 4 or 5 days.

**Swine and Newborn Piglets (respiratory diseases):** Add 4 g of powder to 170 mL of water per 45 kg of body weight and give as a drench or mix 800 g per 900 L of drinking water and give for 4 or 5 days.

### Calves (scours):

Individual Treatment: Add 2 g of powder to 60 mL of water or milk substitute per 45 kg of body weight as a drench for 4 or 5 days.

Herd Treatment: Add 2 g of powder per 4.5 L of water or 400 g per 900 L of drinking water for 4 or 5 days.

### Calves (respiratory diseases):

Double above dosage for 4 or 5 days.

**Notes:** Fresh solutions should be prepared daily. The dosage is based on an average water intake. Care must be taken to ensure adequate water intake. 1 teaspoonful equals 4 g.

**STORAGE:** Store in a cool, dry place below 23°C. Keep from freezing.

NEO-TETRAMED 10 kg

Side Panel - French

**DESCRIPTION :** NEO-TETRAMED renferme deux antibiotiques: La néomycine et la tétracycline. Le premier est un antibiotique efficace pour combattre *E. coli* et autres bactéries du système digestif et le deuxième est un antibiotique à large spectre qui, suite à son absorption à travers l'appareil digestif, combat la plupart des bactéries qui envahissent l'organisme.

**INDICATIONS :**

**Poulets et dindes :** Pour aider au traitement des infections causées par des microorganismes sensibles à la tétracycline et à la néomycine, telles que maladie respiratoire chronique (MRC), Crête bleue, synovite et entérite.

**Porcs et veaux :** Pour aider au traitement des maladies des voies respiratoires et de l'entérite bactérienne (diarrhée) causées par des micro-organismes sensibles à la tétracycline et la néomycine.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

**Poulets et dindes :** 400 g ou 800 g par 900 L d'eau de boisson pendant 3 à 5 jours.

**Porcs (diarrhée) :** Dissoudre 2 g dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Porcelets nouveau-nés (diarrhée) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 60 mL d'eau et donner 5 mL de cette solution à chaque porcelet oralement, 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours.

**Porcs et porcelets nouveau-nés (troubles respiratoires) :** Dissoudre 4 g de poudre dans 170 mL d'eau par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage ou dissoudre 800 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Veaux (diarrhée) :**

Individuel: Dissoudre 2 g de poudre dans 60 mL d'eau ou du substitut de lait par 45 kg de poids vif et administrer comme breuvage pendant 4 ou 5 jours.

Troupeau: Mélanger 2 g de poudre par 4.5 L d'eau ou 400 g par 900 L d'eau de boisson et donner pendant 4 ou 5 jours.

**Veaux (troubles respiratoires) :**

Doubler la dose précédente pendant 4 ou 5 jours.

**Remarques :** Préparer des solutions fraîches chaque jour. La posologie est basée sur une consommation moyenne d'eau. S'assurer que la consommation est suffisante. 1 c. à thé équivaut à 4 g.

NEO-TETRAMED 10 kg  
Side Panel - French

**ENTREPOSAGE :** Conserver dans un endroit sec et frais en-dessous de 23°C. Éviter le gel.