

| | | |
|--|---|--|
| <p>Active Ingredients: Each bolus contains: Sulfapyridine 13 g Ethylenediamine dihydroiodide ... 400 mg (Organic Iodide)</p> <p>Indications: As an aid in the treatment of foot rot in cattle when caused by <i>Sphaerophorus necrophorus</i> and/or other organisms susceptible to sulfapyridine or organic iodide.</p> <p>Directions for Use: <i>To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.</i></p> <p>Cleanse affected foot, remove debris, necrotic tissue and apply an antiseptic such as iodine. Initially administer, orally 1 to 1½ boluses for each 200 lbs. of body weight. Repeat every 12 hours with 1 bolus for each 400 lbs. body weight for 2 or 3 days. Lubricate bolus with mineral oil or petroleum jelly before administering. Treated animals should be kept in dry, clean pens until lesions heal.</p> <p>Cautions: Do not administer to animals showing symptoms of acute respiratory conditions. As with other sulfa drugs, absorption may be closely followed by toxic reactions. Constant supervision of the animals is recommended. Supply ample drinking water. If symptoms persist after using this drug for 2 or 3 days the diagnosis should be re-evaluated.</p> <p>Warnings: Milk taken from treated animals during treatment and within 96 hours after the latest treatment must not be used in food. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 10 days after the latest treatment with this drug. Sulfonamides can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of the reach of children.</p> <p>Storage: Store at room temperature (15-30°C).</p> <p>Professional Veterinary Laboratories 1199 Sanford Street</p> | <p>DIN 00319414</p> <p>Pr FOOT-ROT BOLUSES</p> <p>Veterinary use only Usage vétérinaire seulement</p> <p>Antibiotic/Antibiotique</p> <p>Warnings: Keep out of reach of children. For complete warnings see side panel. Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Voir le panneau latéral pour les mises en garde complètes.</p> <p>Net Contents/Contenu Net: 50 Boluses/Bols</p> | <p>Ingrédients actifs : Chaque bol contient : Sulfapyridine 13 g Dihydroiodure d'éthylènediamine ... 400 mg (Iodure organique)</p> <p>Indications : Pour aider à traiter la pourriture des pieds chez les bovins lorsqu'ils sont causés par <i>Sphaerophorus necrophorus</i> et/ou d'autres organismes sensibles à la sulfapyridine ou à l'iodure organique.</p> <p>Mode d'emploi : <i>Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.</i></p> <p>Nettoyer le pied affecté, enlever les débris, le tissu nécrotique et appliquer un antiseptique tel que l'iode. Administrer initialement, par voie orale 1 à 1 ½ bolus pour chaque 200 livres. du poids corporel. Répétez toutes les 12 heures avec 1 bolus pour chaque 400 livres. poids corporel pendant 2 ou 3 jours. Lubrifier bolus avec de l'huile minérale ou de la vaseline avant d'administrer. Les animaux traités doivent être gardés dans des enclos propres et secs jusqu'à ce que les lésions guérissent.</p> <p>Précautions : Ne pas administrer aux animaux présentant des symptômes d'affections respiratoires aiguës. Comme avec les autres sulfamides, l'absorption peut être suivie de près par des réactions toxiques. Une surveillance constante des animaux est recommandée. Fournir de l'eau potable abondante. Si les symptômes persistent après l'utilisation de ce médicament pendant 2 ou 3 jours, le diagnostic devrait être réévalué.</p> <p>Mises en garde : Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au 10 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les sulfamidés peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.</p> |
|--|---|--|

LABEL

VER – 11DEC2017

Winnipeg, Manitoba R3E 3A1
1-800-465-7122 - www.domvet.com

Entreposage :
Entreposer à température ambiante (15-30°C).

(L)
EXP

LABEL

VER - 11DEC2017