

MAIN BODY OF LABEL (MAIN PANEL)

Ormond Logo

ORMOND

VETERINARY SUPPLY LTD.

ANCASTER, ONTARIO L9G 3K9

500 tablets

500 comprimés

Pr NEO – ATROPEC

Anti-Diarrheal Tablets / Comprimés antidiarrhéiques

VETERINARY USE ONLY / USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIC / ANTIBIOTIQUE

DIN 00153990

Active Ingredients:

Each tablet contains:

| | |
|------------------------------|--------|
| Neomycin Sulfate | 25 mg |
| (Equivalent to 17.5 mg base) | |
| Atropine Methylnitrate..... | 0.5 mg |
| Sulfaguanidine..... | 195 mg |
| Sulfacetamide..... | 130 mg |
| Kaolin..... | 390 mg |
| Aluminum Hydroxide..... | 130 mg |
| Pectin..... | 65 mg |

Indications: Antimicrobial and anticholinergic for use as an aid in the treatment of diarrhea in dogs and cats.

Dosage and Administration: *To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

Dogs and Cats: One tablet for 4.5 kg (10 lbs) body weight daily administered in two or three equal doses. Treatment may be continued for three to five days.

Warnings: Sulfonamides can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

Storage: 15 – 30 Celsius

Ingrédients actifs:

Chaque comprimé contient:

Ormond Decemeber 11, 2017

| | |
|------------------------------------|--------|
| Sulfate de néomycine..... | 25 mg |
| (équivalent à une base de 17,5 mg) | |
| Méthylnitrate d`atropine..... | 0,5 mg |
| Sulfaguanidine..... | 195 mg |
| Sulfacétamide..... | 130 mg |
| Kaolin..... | 390 mg |
| Hydroxyde d`aluminium..... | 130 mg |
| Pectine..... | 65 mg |

Indications: Antimicrobien et anticholinergique à utiliser pour aider au traitement de la diarrhée chez les chiens et les chats.

Posologie et mode d'administration: *Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

Chiens et chats: Un comprimé par 4,5 kg (10 lb) de poids de l'animal, chaque jour, administré en deux ou trois doses égales. Le traitement peut se poursuivre pendant trois à cinq jours.

Mises en garde: Les sulfamidés peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage:15 – 30 Celsius

Lot:

Exp. Date / Date d'exp.: