

## MAIN BODY OF LABEL (MAIN PANEL)

Ormond Logo

**ORMOND**

VETERINARY SUPPLY LTD.

ANCASTER, ONTARIO L 9G 3K9

500 tablets

500 comprimés

Pr **NEO-ATROPEC-C**

Anti-Diarrheal Tablets / Comprimés antidiarrhéiques

VETERINARY USE ONLY / USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIC / ANTIBIOTIQUE

DIN 00379387

### Active Ingredients / Ingrédients actifs :

Each tablet contains :

Chaque comprimé contient :

Neomycin Sulfate..... 12.5 mg

Sulfate de néomycine..... 12,5 mg

Atropine Methylnitrate.... 0.25 mg

Méthylnitrate d atropine.... 0,25 mg

Sulfaguanidine..... 97.5 mg

Sulfaguanidine..... 97,5 mg

Sulfacetamide..... 65 mg

Sulfacétamide..... 65 mg

Kaolin..... 195 mg

Kaolin..... 195 mg

Aluminum Hydroxide..... 65 mg

Hydroxyde d'aluminium..... 65 mg

Pectin..... 32.5 mg

Pectine..... 32,5 mg

**Warnings:** See the side panel.

**Mises en garde :** Voir le panneau latéral.

## **LEFT SIDE OF LABEL (LEFT PANEL)**

**Dosage and Administration:** *To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

Dogs and Cats: One tablet for 2.3 kg (5lbs) body weight daily administered in two or three equal doses. Treatment may be continued for three to five days.

**Posologie et mode d'administration :** *Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

Chiens et chats : Un comprimé par 2,3 kg (5 lb) de poids de l'animal, chaque jour, administré en deux ou trois doses égales. Le traitement peut se poursuivre pendant trois à cinq jours.

**Exp. Date / Date d'exp.**

## **RIGHT SIDE OF LABEL (RIGHT PANEL)**

**Indications:** Antimicrobial and anticholinergic for use as an aid in the treatment of diarrhea in dogs and cats.

**Warnings:** Sulfonamides can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

**Storage:15 – 30 Celsius**

**Indications :** Antimicrobien et anticholinergique, à utiliser pour aider au traitement de la diarrhée chez les chiens et les chats.

**Mises en garde :** Les sulfamidés peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

**Entreposage : 15 – 30 Celsius**

**Lot No.**