

<p>A counter-irritant, astringent and antimicrobial powder for use in cattle, goats, horses, sheep, swine, and poultry for slow healing wounds with a tendency towards PROUD FLESH (exuberant granulations).</p> <p>Active Ingredients: Copper Sulfate 51.5 % Sulfathiazole 5.0 % Sulfanilamide 5.0 % Boric Acid 15.0 % Tannic Acid 5.0 % Talcum 18.0 % Magnesium Stearate 0.5 %</p> <p>Directions for use: <i>To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently and for the shortest duration required to achieve the desired clinical outcome</i> Dust wounds twice daily. Repeat as indicated.</p> <p>Warnings: Sulfonamides can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.</p> <p>HAZARDOUS LIVESTOCK REMEDY.</p> <p>Cautions: This preparation has not been sterilized. Do not use in body cavities or deep wounds. If the condition persists or increases, discontinue use. Alternative therapy should be considered.</p> <p>Storage:</p>	<p>DIN 00346152</p> <p>Pr PROUD FLESH DUST DUSTING POWDER POUDRE</p> <p>Veterinary use only Usage vétérinaire seulement</p> <p>Antibiotic/Antibiotique</p> <p>Warnings/Mises en garde : Refer to the side panel for complete warnings. Référez-vous au panneau latéral pour les mises en garde complètes</p> <p>Net Contents/Contenu Net : 200 g</p>	<p>Une poudre révulsif, astringent, et antimicrobien pour utiliser dans les bovins, les chèvres, les chevaux, les moutons, les porcs et les volailles pour des plaies qui guérie lentement et qui ont une tendance au "PROUD FLESH".</p> <p>Ingrédients actifs : Cupric Sulfate 51,5 % Sulfathiazole 5,0 % Sulfanilamide 5,0 % Acide Borique 15,0 % Acide Tannique 5,0 % Talcum 18,0 % Stearate de Magnesium .. 0,5 %</p> <p>Mode d'emploi : <i>Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence et pendant la plus courte durée de temps requise pour obtenir le résultat clinique attendu.</i> Appliqué la poudre sur la blessure deux fois par jour. Répète comme nécessaire.</p> <p>Mises en garde : Les sulfamidés peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.</p> <p>REMEDE DE BÉTAIL HAZARDEUX.</p> <p>Précautions : Cette préparation n'as pas été stérilisé. Appliqué seulement sur des blessures superficiel et non-profonds. Si la condition</p>
---	--	---

LABEL

VER 13 DEC 2017

<p>Store at room temperature (15-30°C).</p> <p>Dominion Veterinary Laboratories Ltd. 1199 Sanford Street Winnipeg, Manitoba R3E 3A1 1-800-465-7122 - www.domvet.com</p> <p>(L) EXP</p>		<p>continue ou empire, arrêtez l'usage. Une thérapie alternative devrait être envisagée.</p> <p>Entreposage : Conserver entre 15 et 30°C.</p>