

Indications: Traitement, chez les bovins et les porcs, des infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.
Posologie: 1 mL/15 kg de poids vif. Au besoin, 2^e dose après 72 heures.
Mode d'administration: IM et SC chez les bovins tarés; IM chez les porcs.
Entreposage: Au dessous de 25°C.
Ne pas congeler.
Voir la notice pour les détails et la Mises en garde.
Manufactured by/ Fabriqué par
Norbrook Laboratories Limited,
Newry, Northern Ireland



Pr PROC PEN LA

**Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension**
Suspension injectable stérile de
procaine pénicilline G

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement
A long acting antibiotic.
Contains per mL:
Procaine penicillin G 300 mg
Antibiotique d'action prolongée.
Contient par mL:
Procaine pénicilline G 300 mg
DIN 02227320

100 mL

Indications: Treatment, in cattle and swine, of infections caused by bacteria susceptible to penicillin.
Dosage: 1 mL/15 kg body weight. As needed, 2nd dose after 72 hours.
Administration: IM and SC in non-lactating cattle. IM in swine.
Storage: Below 25°C. Do not freeze.
See Package Insert for Details and Warnings
Distributed by/Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street, Edmonton, AB,
T5S 2W2

Lot:
Exp:



011154L04



PROC PEN LA

Suspension injectable stérile de procaine pénicilline G

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIQUE

DIN 02227320

Description:

Proc Pen LA est une formule spécifique apportant une activité antibactérienne prolongée chez les bovins et les porcs après une seule injection.

Proc Pen LA est une suspension stérile stable d'action prolongée, pour administration parentérale, contenant l'équivalent de 300 mg de procaine pénicilline (Ph. Eur.) par mL.

Proc Pen LA offre une activité antibactérienne avec sériques antibactériens durables après une administration unique, réduisant ainsi le nombre d'injections nécessaires dans une pénicilliothérapie.

Indications:

Proc Pen LA est indiqué dans le traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.

BOVINS: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

PORCS: Pneumonie bactérienne, érysipèle (rouget), plaies infectées.

Mode d'administration et

Posologie:

BOVINS: Proc Pen LA peut être administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire aux bovins tarés.

PORCS: Proc Pen LA doit être administré exclusivement par voie intramusculaire.

La dose recommandée est de 20 mg de procaine pénicilline par kg de poids corporel, soit 1 mL par 15 kg. Au besoin, une deuxième dose peut être administrée 72 heures plus tard.

Ne pas administrer plus de 15 mL au même site d'injection chez les bovins ou plus de 10 mL au même site d'injection chez les porcs.

Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 heures suivant l'administration de la première dose, une ré-évaluation clinique peut être requise. Un traitement antibactérien alternatif devrait être envisagé.

Agiter vigoureusement avant emploi.

Précautions:

Ce produit est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à la pénicilline.

En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche, position couchée), administrer de l'épinéphrine immédiatement pour prévenir la mort.

Occasionnellement l'administration de ce produit chez les porcs peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes gestantes, des avortements peuvent en résulter.

Mises en garde:

Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.

Administration sous-cutanée: Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Administration intramusculaire: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 21 jours pour les bovins et 10 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage:

Entreposer au dessous de 25°C.
Ne pas congeler.

Présentation:

Proc Pen LA est présenté en flacons multidoses de 50 mL, 100 mL, 250 mL et 500 mL.

Fabriqué par:

Norbrook Laboratories Limited
NEWRY, BT35 6JP
Irlande du Nord
Grande Bretagne

Distribué au Canada par:

Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB
T5S 2W2



PROC PEN LA

Procaine Penicillin G Sterile Injectable Suspension

VETERINARY USE ONLY

ANTIBIOTIC

DIN 02227320

Description:

Proc Pen LA is specifically formulated to provide sustained antibacterial activity in cattle and pigs following a single administration.

Proc Pen LA is a sterile, long acting stable suspension for parenteral administration containing Procaine Penicillin Ph. Eur. equivalent to 300 mg procaine penicillin per mL.

Proc Pen LA offers a combining antibacterial effectiveness, with prolonged antibiotic blood levels following a single treatment, thereby reducing the number of injections required in a course of penicillin therapy.

Indications:

Proc Pen LA is indicated for the treatment of the following infections caused by bacteria susceptible to penicillin.

CATTLE: Bacterial pneumonia, calf diphtheria, footrot, metritis, wound infections.

SWINE: Bacterial pneumonia, erysipelas, wound infections.

Dosage and Administration:

CATTLE: Proc Pen LA may be administered by either the subcutaneous or intramuscular route of administration to non-lactating cattle.

SWINE: Proc Pen LA may be administered by the intramuscular route only.

The recommended dose rate is 20 mg procaine penicillin per kg bodyweight, equivalent to 1 mL per 15 kg bodyweight. If necessary, a second dose may be administered after 72 hours.

Do not exceed 15 mL per injection site in cattle and 10 mL per injection site in pigs.

Note: If animals do not respond within 48 hours of administration of the first dose, clinical re-evaluation may be required. An alternative antibacterial therapy should be considered.

Shake well before using.

Cautions:

Contra-indicated in known cases of hypersensitivity to penicillin.

In case of anaphylactic reaction (acute respiratory distress, mouth breathing, recumbency), administer epinephrine immediately to prevent death.

In pigs the administration of this product may occasionally cause a fever, vomiting, shivering, listlessness, incoordination and possibly death. In pregnant sows and gilts, it may result in abortions.

Warnings:

Do not administer to lactating dairy cattle.

Subcutaneous Administration: Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 14 days after the latest treatment with this drug.

Intramuscular Administration: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 21 days for cattle and 10 days for swine after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

Storage:

Store below 25°C.
Do not freeze.

Presentation:

Proc Pen LA is available in multi-dose vials of 50 mL, 100 mL, 250 mL and 500 mL.

Manufactured by:

Norbrook Laboratories Limited,
NEWRY, BT35 6JP
Northern Ireland

Distributed in Canada by:

Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB
T5S 2W2



TRIAL



011564

Indications: Traitement, chez les bovins et les porcs, des infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.

Posologie: 1 mL /15 kg de poids vif.

Au besoin, 2^e dose après 72 heures.

Mode d'administration: IM et SC chez les bovins tarés. IM chez les porcs.

Entreposage: Au dessous de 25°C.
Ne pas congeler.

Voir la notice pour les détails et la Mises en garde.

Manufactured by/ Fabriqué par
Norbrook Laboratories Limited,
Newry, Northern Ireland



Pr **PROC PEN LA**

**Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension**
**Suspension injectable stérile
de procaine pénicilline G**

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement
A long acting antibiotic.
Contains per mL:
Procaine penicillin G 300 mg
Antibiotique d'action prolongée.
Contient par mL:
Procaine pénicilline G 300 mg
DIN 02227320

250 mL



Indications: Treatment, in cattle and swine, of infections caused by bacteria susceptible to penicillin.

Dosage: 1 mL/15 kg body weight.

As needed, 2nd dose after 72 hours.

Administration: IM and SC in non-lactating cattle. IM in swine.

Storage: Below 25°C. Do not freeze.

See Package Insert for Details and Warnings

Distributed by/Distribué par:

Kane Veterinary Supplies Ltd,
11204 - 186 Street, Edmonton, AB,
T5S 2W2

Lot:

Exp:

012154L04

TRIAL



Exp:
Lot:

Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension
Suspension injectable stérile de
procaine pénicilline G

Pr PROC PEN LA

DIN 02227320

DIN 02227320

Pr PROC PEN LA

**Suspension injectable
stérile de procaine
pénicilline G**

**Usage Vétérinaire
Seulement**

Antibiotique d'action prolongée.

Contient par mL:
Procaine pénicilline G 300 mg

Antioxydants:
Hydroxyanisole de butyle;
Hydroxytoluène de butyle

Fabriqué par:
NORBROOK LABORATORIES LIMITED
Newry, Irlande du Nord

250 mL



F7 - 69 X 69 X 148 mm

Indications: Pour le traitement des infections suivantes
causées par des bactéries sensibles à la pénicilline:
Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux;
piéfin; métrite; plaies infectées.
Porcs: Pneumonie bactérienne, erysipèle (rouget);
plaies infectées.

Posologie: Injecter à raison de 1 mL par 15 kg de poids
corporel. Au besoin, une deuxième dose peut être
administrée 72 heures plus tard. Pour les instructions
complètes consulter la notice ci-jointe.

Mode d'administration: Pour injections
intramusculaires et sous-cutanées chez les bovins
tarés. Pour administrer exclusivement par voie
intramusculaire aux porcs. Agiter vigoureusement
avant emploi.

Mises en Garde: Ne pas administrer aux vaches
laitières en lactation.

Administration sous-cutanée:
Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des
fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours
après le dernier traitement avec ce médicament.

Administration intramusculaire:
Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des
fins alimentaires dans un délai d'au moins 21 jours
pour les bovins et 10 jours pour les porcs après le
dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions
allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la
manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition
orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.

Précautions: En cas de réaction anaphylactique
(détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche,
position couchée), administrer de l'épinéphrine
immédiatement pour prévenir la mort.

Occasionnellement l'administration de ce produit chez
les porcs peut causer de la fièvre, des vomissements,
des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination
et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes
gestantes des avortements peuvent en résulter.

Entreposage:
Entreposer au dessous de 25°C. Ne pas congeler.

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB,
T5S 2W2

DIN 02227320

Pr PROC PEN LA

**Procaine Penicillin G
Sterile Injectable
Suspension**

Veterinary Use Only

A long acting antibiotic.

Contains per mL:
Procaine penicillin G 300 mg

Antioxydants:
Butyl hydroxyanisole;
Butyl hydroxytoluène

Manufactured by:
NORBROOK LABORATORIES LIMITED
Newry, Northern Ireland

250 mL



216754C02

Indications: For the treatment of the following
infections caused by bacteria susceptible to penicillin:
Cattle: Bacterial pneumonia; calf diphtheria; footrot;
metritis; wound infections.
Swine: Bacterial pneumonia; erysipelas; wound
infections.

Dosage: Inject at a rate of 1 mL/15 kg bodyweight. If
necessary, a second dose may be administered after
72 hours. See package insert for complete directions.

Administration: For intramuscular and subcutaneous
administration in non-lactating cattle. For
intramuscular administration only in swine. Shake
well before using.

Warnings: Do not administer to lactating dairy cattle.

Subcutaneous Administration:
Treated cattle must not be slaughtered for use in food
for at least 14 days after the latest treatment with this
drug.

Intramuscular Administration:
Treated animals must not be slaughtered for use in
food for at least 21 days for cattle and 10 days for
swine after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized
individuals. When handling the product, avoid
inhalation, oral exposure and direct contact with skin
or eyes. Keep out of reach of children.

Cautions: In case of anaphylactic reaction (acute
respiratory distress, mouth breathing, recumbency)
administer epinephrine immediately to prevent death.
In pigs the administration of this product may
occasionally cause a fever, vomiting, shivering,
listlessness, incoordination and possibly death. In
pregnant sows and gilts it may result in abortions.

Storage: Store below 25°C. Do not freeze.

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB,
T5S 2W2



8 74642 00250 6



TRIAL

PROC PEN LA
Suspension injectable stérile de procaine pénicilline G

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIQUE

DIN 02227320

Description:

Proc Pen LA est une formule spécifique apportant une activité antibactérienne prolongée chez les bovins et les porcs après une seule injection. Proc Pen LA est une suspension stérile stable d'action prolongée, pour administration parentérale, contenant l'équivalent de 300 mg de procaine pénicilline (Ph. Eur.) par mL.

Proc Pen LA offre une activité antibactérienne avec sériques antibactériens durables après une administration unique, réduisant ainsi le nombre d'injections nécessaires dans une pénicilliothérapie.

Indications:

Proc Pen LA est indiqué dans le traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.

BOVINS: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

POFCS: Pneumonie bactérienne, érysipèle (rouget), plaies infectées.

Mode d'administration et Posologie:

BOVINS: Proc Pen LA peut être administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire aux bovins laites.

POFCS: Proc Pen LA doit être administré exclusivement par voie intramusculaire.

La dose recommandée est de 20 mg de procaine pénicilline par kg de poids corporel, soit 1 mL par 15 kg. Au besoin, une deuxième dose peut être administrée 72 heures plus tard.

Ne pas administrer plus de 15 mL au même site d'injection chez les bovins ou plus de 10 mL au même site d'injection chez les porcs.

Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 heures suivant l'administration de la première dose, une ré-évaluation clinique peut être requise. Un traitement antibactérien alternatif devrait être envisagé.

Agiter vigoureusement avant emploi.

Précautions: Ce produit est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à la pénicilline.

En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche, position couchée), administrer de l'éphédrine immédiatement pour prévenir la mort.

Occasionnellement l'administration de ce produit chez les porcs peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes gestantes, des avortements peuvent en résulter.

Mises en garde: Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.

Administration sous-cutanée: Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Administration intramusculaire: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 21 jours pour les bovins et 10 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage: Entreposer au dessous de 25°C. Ne pas congeler.

Présentation:

Proc Pen LA est présenté en flacons multidoses de 50 mL, 100 mL, 250 mL et 500 mL.

Fabriqué par:

Norbrook Laboratories Limited
NEWRY, BT35 6JP
Irlande du Nord
Grande Bretagne

Distribué au Canada par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB
T5S 2W2



PROC PEN LA
Procaine Penicillin G Sterile Injectable Suspension

VETERINARY USE ONLY

ANTIBIOTIC

DIN 02227320

Description: Proc Pen LA is specifically formulated to provide sustained antibacterial activity in cattle and pigs following a single administration.

Proc Pen LA is a sterile, long acting stable suspension for parenteral administration containing Procaine Penicillin Ph. Eur. equivalent to 300 mg procaine penicillin per mL.

Proc Pen LA offers a combining antibacterial effectiveness, with prolonged antibiotic blood levels following a single treatment, thereby reducing the number of injections required in a course of penicillin therapy.

Indications:

Proc Pen LA is indicated for the treatment of the following infections caused by bacteria susceptible to penicillin.

CATTLE: Bacterial pneumonia, calf diptheria, footrot, metritis, wound infections.

SWINE: Bacterial pneumonia, erysipelas, wound infections.

Dosage and Administration: **CATTLE:** Proc Pen LA may be administered by either the subcutaneous or intramuscular route of administration to non-lactating cattle.

SWINE: Proc Pen LA may be administered by the intramuscular route only.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

Storage: Store below 25°C. Do not freeze.

Presentation: Proc Pen LA is available in multi-dose vials of 50 mL, 100 mL, 250 mL and 500 mL.

Manufactured by: Norbrook Laboratories Limited, NEWRY, BT35 6JP, Northern Ireland

Distributed in Canada by: Kane Veterinary Supplies Ltd. 11204 - 186 Street, Edmonton, AB T5S 2W2



TRIAL



The recommended dose rate is 20 mg procaine penicillin per kg bodyweight, equivalent to 1 mL per 15 kg bodyweight. If necessary, a second dose may be administered after 72 hours.

Do not exceed 15 mL per injection site in cattle and 10 mL per injection site in pigs.

Note: If animals do not respond within 48 hours of administration of the first dose, clinical re-evaluation may be required. An alternative antibacterial therapy should be considered.

Shake well before using.

Cautions:

Contra-indicated in known cases of hypersensitivity to penicillin.

In case of anaphylactic reaction (acute respiratory distress, mouth breathing, recumbency), administer epinephrine immediately to prevent death.

In pigs the administration of this product may occasionally cause a fever, vomiting, shivering, listlessness, incoordination and possibly death. In pregnant sows and gilts, it may result in abortions.

Warnings:

Do not administer to lactating dairy cattle.

Subcutaneous Administration: Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 14 days after the latest treatment with this drug.

Intramuscular Administration: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 21 days for cattle and 10 days for swine after the latest treatment with this drug.

Indications: Traitement, chez les bovins et les porcs, des infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.

Posologie: 1 mL/15 kg de poids vif. Au besoin, 2^e dose après 72 heures.

Mode d'administration: IM et SC chez les bovins tarés. IM chez les porcs.

Entreposage: Au dessous de 25°C. Ne pas congeler.

Voir la notice pour les détails et la Mises en garde.

Manufactured by/ Fabriqué par
Norbrook Laboratories Limited,
Newry, Northern Ireland



Pr **PROC PEN LA**

**Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension**

**Suspension injectable stérile
de procaine pénicilline G**

Veterinary Use Only
Usage Vétérinaire Seulement
A long acting antibiotic.
Contains per mL:
Procaine penicillin G 300 mg
Antibiotique d'action prolongée.
Contient par mL:
Procaine pénicilline G 300 mg
DIN 02227320

500 mL


Norbrook

Indications: Treatment, in cattle and swine, of infections caused by bacteria susceptible to penicillin.

Dosage: 1 mL/15 kg body weight.

As needed, 2nd dose after 72 hours.

Administration: IM and SC in non-lactating cattle. IM in swine.

Storage: Below 25°C. Do not freeze.

See Package Insert for Details and Warnings


Distributed by/Distribué par:

Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street, Edmonton, AB,
T5S 2W2

Lot:

Exp:

013154L04



THIS AREA
VARNISH FREE
30 x 50 mm

Exp:
Lot:

Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension
Suspension injectable stérile de
procaine pénicilline G

Pr **PROC PEN LA**

DIN 02227320

DIN 02227320

Pr **PROC PEN LA**

**Suspension injectable
stérile de procaine
pénicilline G**

**Usage Vétérinaire
Seulement**

**Antibiotique d'action
prolongée.**

**Contient par mL:
Procaine pénicilline G 300 mg**

**Antioxydants:
Hydroxyanisole de butyle;
Hydroxytoluène de butyle**

Fabriqué par:
NORBROOK LABORATORIES LIMITED
Newry, Irlande du Nord

500 mL



Indications: Pour le traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline:
Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux; piétin; métrite; plaies infectées.
Porcs: Pneumonie bactérienne; érysipèle (rouget); plaies infectées.

Posologie: Injecter à raison de 1 mL par 15 kg de poids corporel. Au besoin, une deuxième dose peut être administrée 72 heures plus tard. Pour les instructions complètes consulter la notice ci-jointe.

Mode d'administration: Pour injections intramusculaires et sous-cutanées chez les bovins tarés. Pour administrer exclusivement par voie intramusculaire aux porcs. Agiter vigoureusement avant emploi.

Mises en Garde: Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.

Administration sous-cutanée:
Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Administration intramusculaire:
Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 21 jours pour les bovins et 10 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Précautions: En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche, position couchée), administrer de l'épinéphrine immédiatement pour prévenir la mort. Occasionnellement l'administration de ce produit chez les porcs peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes gestantes des avortements peuvent en résulter.

Entreposage:
Entreposer au dessous de 25°C. Ne pas congeler.

Distribué par:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB,
T5S 2W2

DIN 02227320

Pr **PROC PEN LA**

**Procaine Penicillin G
Sterile Injectable
Suspension**

Veterinary Use Only

A long acting antibiotic.

**Contains per mL:
Procaine penicillin G 300 mg**

**Antioxydants:
Butyl hydroxyanisole;
Butyl hydroxytoluène**

Manufactured by:
NORBROOK LABORATORIES LIMITED
Newry, Northern Ireland

500 mL



216755C0X

Indications: For the treatment of the following infections caused by bacteria susceptible to penicillin:
Cattle: Bacterial pneumonia; calf diphtheria; footrot; metritis; wound infections.
Swine: Bacterial pneumonia; erysipelas; wound infections.

Dosage: Inject at a rate of 1 mL/15 kg bodyweight. If necessary, a second dose may be administered after 72 hours. See package insert for complete directions.

Administration: For intramuscular and subcutaneous administration in non-lactating cattle. For intramuscular administration only in swine. Shake well before using.

Warnings: Do not administer to lactating dairy cattle.

Subcutaneous Administration:
Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 14 days after the latest treatment with this drug.

Intramuscular Administration:
Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 21 days for cattle and 10 days for swine after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

Cautions: In case of anaphylactic reaction (acute respiratory distress, mouth breathing, recumbency) administer epinephrine immediately to prevent death. In pigs the administration of this product may occasionally cause a fever, vomiting, shivering, listlessness, incoordination and possibly death. In pregnant sows and gilts it may result in abortions.

Storage: Store below 25°C. Do not freeze.

Distributed by:
Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB,
T5S 2W2



2609

Pr PROC PEN LA
Procaine Penicillin G Sterile
Injectable Suspension

VETERINARY USE ONLY

ANTIBIOTIC

DIN 02227320

Description:

Proc Pen LA is specifically formulated to provide sustained antibacterial activity in cattle and pigs following a single administration.

Proc Pen LA is a sterile, long acting stable suspension for parenteral administration containing Procaine Penicillin Ph. Eur. equivalent to 300 mg procaine penicillin per mL.

Proc Pen LA offers a combining antibacterial effectiveness, with prolonged antibiotic blood levels following a single treatment, thereby reducing the number of injections required in a course of penicillin therapy.

Indications:

Proc Pen LA is indicated for the treatment of the following infections caused by bacteria susceptible to penicillin.

CATTLE: Bacterial pneumonia, calf diphtheria, footrot, metritis, wound infections.

SWINE: Bacterial pneumonia, erysipelas, wound infections.

Dosage and Administration:

CATTLE: Proc Pen LA may be administered by either the subcutaneous or intramuscular route of administration to non-lactating cattle.

SWINE: Proc Pen LA may be administered by the intramuscular route only.

The recommended dose rate is 20 mg procaine penicillin per kg bodyweight, equivalent to 1 mL per 15 kg bodyweight. If necessary, a second dose may be administered after 72 hours.

Do not exceed 15 mL per injection site in cattle and 10 mL per injection site in pigs.

Note: If animals do not respond within 48 hours of administration of the first dose, clinical re-evaluation may be required. An alternative antibacterial therapy should be considered.

Shake well before using.

Cautions:

Contra-indicated in known cases of hypersensitivity to penicillin.

In case of anaphylactic reaction (acute respiratory distress, mouth breathing, recumbency), administer epinephrine immediately to prevent death.

In **pigs** the administration of this product may occasionally cause a fever, vomiting, shivering, listlessness, incoordination and possibly death. In pregnant sows and gilts, it may result in abortions.

Warnings:

Do not administer to lactating dairy cattle.

Subcutaneous Administration:

Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 14 days after the latest treatment with this drug.

Intramuscular Administration:

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 21 days for cattle and 10 days for swine after the latest treatment with this drug.

Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

Storage:

Store below 25°C.
Do not freeze.

Presentation:

Proc Pen LA is available in multi-dose vials of 50 mL, 100 mL, 250 mL and 500 mL.

Manufactured by:

Norbrook Laboratories Limited,
NEWRY, BT35 6JP,
Northern Ireland.

Distributed in Canada by:

Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB
T5S 2W2

Pr PROC PEN LA

Suspension injectable stérile
de procaine pénicilline G

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIQUE

DIN 02227320

Description:

Proc Pen LA est une formule spécifique apportant une activité antibactérienne prolongée chez les bovins et les porcs après une seule injection.

Proc Pen LA est une suspension stérile stable d'action prolongée, pour administration parentérale, contenant l'équivalent de 300 mg de procaine pénicilline (Ph. Eur.) par mL.

Proc Pen LA offre une activité antibactérienne avec sériques antibactériens durables après une administration unique, réduisant ainsi le nombre d'injections nécessaires dans une pénicillothérapie.

Indications:

Proc Pen LA est indiqué dans le traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline.

BOVINS: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

PORCS: Pneumonie bactérienne, érysipèle (rouget), plaies infectées.

Mode d'administration et Posologie:

BOVINS: Proc Pen LA peut être administré par voie sous-cutanée ou intramusculaire aux bovins tarés.

PORCS: Proc Pen LA doit être administré exclusivement par voie intramusculaire.

La dose recommandée est de 20 mg de procaine pénicilline par kg de poids corporel, soit 1 mL par 15 kg. Au besoin, une deuxième dose peut être administrée 72 heures plus tard.

Ne pas administrer plus de 15 mL au même site d'injection chez les bovins ou plus de 10 mL au même site d'injection chez les porcs.

Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 heures suivant l'administration de la première dose, une ré-évaluation clinique peut être requise. Un traitement antibactérien alternatif devrait être envisagé.

Agiter vigoureusement avant emploi.

Précautions:

Ce produit est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à la pénicilline.

En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche, position couchée), administrer de l'épinéphrine immédiatement pour prévenir la mort.

Occasionnellement l'administration de ce produit chez les **porcs** peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes gestantes, des avortements peuvent en résulter.

Mises en garde:

Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation.

Administration sous-cutanée:

Les bovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 14 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Administration intramusculaire:

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 21 jours pour les bovins et 10 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament.

Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage:

Entreposer au dessous de 25°C.
Ne pas congeler.

Présentation:

Proc Pen LA est présenté en flacons multidoses de 50 mL, 100 mL, 250 mL et 500 mL.

Fabriqué par:

Norbrook Laboratories Limited,
NEWRY, BT35 6JP, Irlande du Nord
Grande Bretagne

Distribué au Canada par:

Kane Veterinary Supplies Ltd.
11204 - 186 Street,
Edmonton, AB
T5S 2W2


Norbrook[®]

321154101

6092