

Penicillin G Potassium USP Soluble Powder 500 000 000 IU jar

Main panel - bilingual

DIN 02139219

Pr PENICILLIN G POTASSIUM USP SOLUBLE POWDER

Penicillin G Potassium USP
Pénicilline G Potassique USP

**VETERINARY USE ONLY / USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
ANTIBIOTIC / ANTIBIOTIQUE**

FOR USE IN TURKEY, SWINE AND BROILER CHICKEN DRINKING WATER ONLY
POUR USAGE DANS L'EAU D'ABREUVEMENT DES DINDES, PORCS ET POULETS DE GRIL
SEULEMENT

ACTIVE INGREDIENT/ INGRÉDIENT ACTIF :

Each jar contains 500 000 000 I.U. of Penicillin G Potassium USP.
Chaque pot renferme 500 000 000 U.I. de Potassium de Pénicilline G USP.

Manufactured and Distributed by / Fabriqué et distribué par :



Bio Agri Mix LP

PO Box 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



**CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY
CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

Lot:
EXP:

Penicillin G Potassium USP Soluble Powder 500 000 000 IU jar
Side panel - English

INDICATIONS

Turkeys:

As an aid in the prevention and treatment of infections due to penicillin-susceptible organisms such as *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Broiler chickens:

As an aid in reducing symptoms associated with necrotic enteritis caused by penicillin-susceptible *Clostridium perfringens* when administered at the beginning of an outbreak in a flock.

Swine:

For the treatment of infections caused by penicillin-susceptible *Streptococcus suis*.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

Swine, Broiler Chickens and Turkeys:

Dissolve the contents of one (1) jar in 1682 litres (370 Imperial gallons) of drinking water (or approximately 0.2 g of powder per litre of drinking water). This will provide approximately 297 000 I.U. of penicillin per litre of drinking water.

Administer as the sole source of drinking water for:

3 – 5 days to turkeys.

5 days to swine and broiler chickens.

Prepare fresh solutions daily.

WARNINGS

1. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 1 day after the latest treatment with this drug.
2. Do not use in birds producing eggs for human consumption.
3. Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.
4. Keep out of reach of children.

STORAGE

Store in a cool dry place below 30°C. Keep from freezing.

PRESENTATION

Penicillin G Potassium USP Soluble Powder is supplied in a jar (500 000 000 I.U.) or in a pail (15 000 000 000 I.U.).

Penicillin G Potassium USP Soluble Powder 500 000 000 IU jar

Side panel - French

INDICATIONS

Dindes :

Comme adjuvant à la prévention et au traitement d'infections chez les dindes causées par des organismes sensibles à la pénicilline tels que *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Poulets de grill :

Pour aider à réduire les symptômes d'entérite nécrotique causée par *Clostridium perfringens* sensibles à la pénicilline lorsque administré au moment où la maladie se déclare dans un troupeau.

Porcs :

Pour le traitement d'infections causées par *Streptococcus suis* sensible à la pénicilline.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs, Poulets de Grill et Dindes :

Dissoudre le contenu d'un (1) pot dans 1682 litres (370 gal. imp.) d'eau d'abreuvement (ou approximativement 0,2 g de poudre par litre d'eau d'abreuvement). Cette quantité fournira approximativement 297 000 U.I de pénicilline par litre d'eau d'abreuvement.

Administrer comme seule source d'eau d'abreuvement pendant :

3 à 5 jours chez les dindes.

5 jours chez les porcs et les poulets de grill.

Préparer des solutions fraîches chaque jour.

MISES EN GARDE

1. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 1 jour après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Ne pas utiliser chez les oiseaux produisant des œufs pour des fins alimentaires.
3. Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
4. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec et frais en dessous de 30°C. Éviter le gel.

PRÉSENTATION

Penicillin G Potassium USP Poudre Soluble est fournie en pot (500 000 000 U.I.) ou en seau (15 000 000 000 U.I.).