

Pr Poudre Hydrosoluble de Tiamuline
(Fumarate de tiamuline USP)

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
ANTIBIOTIQUE

INGRÉDIENT ACTIF

Chaque pot de 152,5 g contient:

Tiamuline (comme fumarate de tiamuline USP).....55,7 g

CONTENU NET 152.5 g

INDICATION

Porcs - Pour le traitement de la dysenterie porcine causée par *Serpulina hyodysenteriae*.

MODE D'EMPLOI

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs - 1 pot (152,5 g) dans 1136 L (250 gallons impériales) de l'eau d'abreuvement. Administrer continuellement durant une période de 5 jours.

Consultez le feuillet pour mode d'emploi détaillé.

CONTRE-INDICATION

Les porcs qui reçoivent la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline ne doivent pas avoir accès à ni être traités avec les ionophores (ex. monensin, salinomycine, narasine).

PRÉCAUTIONS

N'utiliser que dans l'eau médicamenteuse pour les porcs. Ce médicament ne doit pas être administré aux truies pendant 4 semaines après l'insémination.

MISES EN GARDE

Les animaux ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 3 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Contacte directe avec ce produit pendant la préparation des solutions peut irriter la peau et les membranes muqueuses. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE

TIAMULIN SOLUBLE POWDER _ French Label

Entreposer dans un endroit sec entre 15 et 30°C.



Bio Agri Mix LP
CP 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



**CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY**
**CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

Rev: Oct 30/17

Lot No.

Exp.

Tiamulin Soluble Powder
French Package Insert

DIN 02324407

Pr Poudre Hydrosoluble de Tiamuline
(Fumarate de tiamuline USP)

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT
ANTIBIOTIQUE

INGRÉDIENT ACTIF

Chaque pot de 152,5 g contient :

Tiamuline (comme fumarate de tiamuline USP).....55,7 g

CONTENU NET 152.5 g

INDICATION

Pour le traitement de la dysenterie porcine causée par *Serpulina hyodysenteriae*.

MODE D'EMPLOI

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Ajouter le contenu de ce pot à 1136 L (250 gallons impériales) d'eau d'abreuvement (ceci fournira 49 mg d'activité antibiotique par litre). Administrer à ce dosage comme seule eau d'abreuvement pendant 5 jours.

Pour les distributeurs automatiques qui distribuent 7,8 mL de solution mère par litre (1 oz. par gallon américain), préparer la solution mère en dissolvant le contenu de ce pot en 8,87 L d'eau.

Préparation des solutions médicamenteuse

Ajouter le contenu d'un pot de la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline dans récipient propre et net. N'utiliser pas un récipient galvanisé (ou autre métal) si corrodé car la corrosion peut diminuer l'efficacité de cette drogue.

Ajouter approximativement 4 L d'eau d'abreuvement.

Mélanger soigneusement jusqu'à toute la poudre est dissous.

Ajouter cette solution à la quantité exacte de l'eau d'abreuvement ou corriger le volume au volume exact de la solution mère pour le distributeur automatique.

Remarques: Préparer l'eau médicamenteuse à nouveau chaque jour.

Servir l'eau médicamenteuse avec la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline comme seule source d'eau d'abreuvement pendant la période de traitement.

Durant le traitement, les porcs doivent être logés dans les conditions d'espace et sanitaires adéquates.

CONTRE-INDICATION

Les porcs qui reçoivent la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline ne doivent pas avoir accès à ni être traités avec les ionophores (ex. monensin, salinomycine, narasine).

PRÉCAUTIONS

Tiamulin Soluble Powder
French Package Insert

N'utiliser que dans l'eau médicamentée pour les porcs. Ce médicament ne doit pas être administré aux truies pendant 4 semaines après l'insémination.

Si aucune amélioration est observée après 5 jours, rétablir le diagnostic. La défaillance du traitement peut être due à la présence des organismes non-susceptibles à la tiamuline ou autre complication.

MISES EN GARDE

Les animaux traités avec ce médicament ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 3 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Contacte directe avec ce produit pendant la préparation des solutions peut irriter la peau et les membranes muqueuses. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

EFFETS INDÉSIRABLES

Un sur dosage à la tiamuline a quelques fois provoqué une salivation transitoire, des vomissements et un effet calmant apparent chez les porcs.

Dans de rares occasions, des rougeurs de la peau, surtout au niveau des cuisses et du ventre, ont été observées durant la médication.

Si des signes de toxicité ou de rougeissements de la peau se produisent, arrêter immédiatement le traitement avec l'eau médicamentée et donner de l'eau d'abreuvement fraîche.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec entre 15 et 30°C.



Bio Agri Mix LP
CP 399
Mitchell, ON
N0K 1N0



**CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY**
**CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

Rev: Oct 30/17