

FRONT PANEL

 **Deracin® 22% Granular Premix**

Chlortetracycline premix  
Prémélange de chlortétracycline  
Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement  
Antibiotic/Antibiotique  
DIN 02407558

Active Ingredient: Chlortetracycline calcium complex equivalent to chlortetracycline hydrochloride 220 g/kg  
Ingrédient actif : Complexe de calcium de chlortétracycline équivalent au chlorhydrate de chlortétracycline 220 g/kg

See complete product information on back panel.  
Voir les renseignements complets au sujet du produit sur le panneau arrière.

**WARNINGS:**

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 7 days for swine and 5 days for cattle and calves after the latest treatment with this drug.

Do not use in lactating dairy cattle.

When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.

Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :**

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 7 jours pour les porcs et 5 jours pour les bovins et les veaux après le dernier traitement avec ce médicament.

Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation.

Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

Pharmgate LLC  
1800 Sir Tyler Road  
Wilmington, NC 28405 USA

Imported and Distributed by:/Importé et distribué par: Pharmgate Animal Health Canada Inc./ 5204 Tenth Line RR #2,  
Erin, ON Canada NOB 1T0 1 800 465-2450

LOT:

EXP:

Net: 25 kg

BACK PANEL

Pr Deracin® 22% Granular Premix  
Chlortetracycline calcium complex  
Complexe de calcium de chlortétracycline Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement  
Antibiotic/Antibiotique

Active Ingredient: Chlortetracycline calcium complex equivalent to chlortetracycline hydrochloride 220 g/kg  
Ingrédient actif : Complexe de calcium de chlortétracycline équivalent au chlorhydrate de chlortétracycline 220 g/kg

Version 13 18 JAN 2018  
Supercedes Version 12 21 Dec 2017

## INDICATIONS AND DIRECTIONS FOR USE/INDICATIONS ET MODE D'EMPLOI :

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently and for the shortest duration required to achieve the desired clinical outcome.*

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence et pendant la plus courte durée de temps requise pour obtenir le résultat clinique attendu.*

Deracin 22% Granular Premix is an antibiotic that may be used for the following indications and dosages:

Deracin 22% Granular Premix est un antibiotique qui peut être utilisé selon les indications et les posologies qui suivent :

SWINE: 0.011% (110 mg/kg) of complete feed:

As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours, bacterial diarrhea). Feed continuously as the sole ration following the appearance of symptoms and until 3 days after symptoms disappear.

Notes:

1. Pigs off feed should be given individual treatment.
2. Pre-Starters and feeds to be fed up to and including 6 weeks of age are required to contain 0.022% chlortetracycline calcium complex equivalent to chlortetracycline hydrochloride.

0.0055% (55 mg/kg) of complete feed:

As an aid in prevention of bacterial enteritis (scours, bacterial diarrhea). Feed as the sole ration during the period of early growth up to 32 kg (70 lbs).

Notes:

Pre-Starters and feeds to be fed up to and including 6 weeks of age should contain 0.022% of chlortetracycline calcium complex equivalent to chlortetracycline hydrochloride.

PORCS : 0.011% (110 mg/kg) d'aliments complet :

Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée bactérienne). Donner de façon continue à l'exclusion de tout autre aliment dès l'apparition des symptômes et jusqu'à 3 jours après la disparition des symptômes.

Remarques :

1. Les porcs qui ont perdu l'appétit doivent être traités individuellement.
2. Les aliments de pré-début et les aliments donnés jusqu'à l'âge de 6 semaines inclusivement devraient avoir une concentration de 0,022 % de complexe de calcium de chlortétracycline équivalent au chlorhydrate de chlortétracycline.

0,0055 % (55 mg/kg) de l'aliment complet :

Pour aider à prévenir l'entérite bactérienne (diarrhée bactérienne). Donner comme ration principale à l'exclusion de tout autre aliment au début de la croissance jusqu'à au poids de 32 kg (70 lbs).

Remarques :

Les aliments de pré-début et les aliments donnés jusqu'à l'âge de 6 semaines inclusivement devraient avoir une concentration de 0,022% de complexe de calcium de chlortétracycline équivalent au chlorhydrate de chlortétracycline.

BEEF CATTLE: 0.22 mg/kg of bodyweight/day or 70 mg/head/day in complete feed:

As an aid in the prevention of foot rot.

Feed continuously during the period animals are exposed to this disease.

BOVINS DE BOUCHERIE : 0,22 mg/kg de poids corporel/jour ou 70 mg/tête/jour dans l'aliment complet :

Pour aider à prévenir le piétin.

Donner de façon continue pendant la période au cours de laquelle les animaux sont exposés à la maladie.

CALVES UP TO 136 kg: 0.0055% (55 mg/kg) of complete feed:

As an aid in the prevention of bacterial diarrhea in calves. Feed continuously during periods of early growth.

VEAUX JUSQU'À 136 kg : 0.0055% (55 mg/kg) d'aliments complet :

Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne chez les veaux. Donner de façon continue au début de la croissance.

CALVES (Milk replacers): 0.0055% (55 mg/kg) of milk replacer powder:

As an aid in the prevention of bacterial diarrhea in calves. Feed continuously during periods of early growth.

VEAUX (lait de remplacement) : 0.0055% (55 mg/kg) de la poudre de lait de remplacement :

Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne chez les veaux. Donner de façon continue au début de la croissance.

Mixing Instructions for manufacture of feeds (1000 kg):

To obtain	0.0055%	0.011%	0.022%
Add	250 g	500 g	1 kg

70 mg/head/day. Add 320 g Deracin 22% Granular Premix per tonne of supplement and feed at 1 kg /head/day.

Instructions de mélange pour la préparation des aliments (1000 kg) :

Pour obtenir	0.0055%	0.011%	0.022%
Ajouter	250 g	500 g	1 kg

70 mg/tête/jour. Ajouter 320 g Deracin 22% Granular Premix par tonne de supplément alimentaire et donner 1 kg/tête/jour.

WARNINGS: See main panel

MISES EN GARDE : Voir le panneau principal

STORAGE: Store below 30°C.

ENTREPOSAGE : Entreposer à une température inférieure à 30°C.

Pharmgate LLC

1800 Sir Tyler Road

Wilmington, NC 28405 USA

Imported and Distributed by/Importé et distribué par : Pharmgate Animal Health Canada Inc./ Inc. 5204 Tenth Line RR #2, Erin, ON Canada NOB 1T0 1 800 465-2450

024022-1604-02