version 2018-01-25

DIN 02242693

Pr Aureomycin®

220 G

Granular • Granulaire

Chlortetracycline Premix Veterinary Use Only

For Feed Manufacturing Use Only

Active Ingredient: Chlortetracycline calcium complex equivalent to 220 g/kg chlortetracycline hydrochloride
Granular antibiotic product.

WARNINGS:

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 7 days for swine and turkeys, 5 days for cattle, and 4 days for lambs after the latest treatment with this drug.
Do not administer to lactating dairy cattle.
When handling the product, avoid inhalation, oral exposure, and direct contact with skin or eyes.
Keep out of rech of children.

Prémélange de chlortétracycline Usage vétérinaire seulement

Réservé à la fabrication de moulées

Ingrédient actifs : Complexe de calcium de chlortétracycline équivalent à 220 g/kg chlorhydrate de chlortétracycline

Antibiotique sous forme de granules.

MISES EN GARDE :

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 7 jours pour les porcs et les dindons,5 jours pour les bovins, et 4 jours pour les agneaux après le dernier traitement avec ce médicament.
Ne pas administrer aux vaches laitières en lactations.
Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.

NET 25 kg

Zoetis is a trademark and Aureomycin is a registered trademark of Zoetis or its licensors, used under license by Zoetis Canada Inc.

Zoetis est une marque de commerce et Aureomycin est une marque déposée de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.

zoetis

Pr Aureomycin®

220 G

Granular • Granulaire

Pr Aureomycin®

220 G

Granular • Granulaire

zoetis

short lap (except full coverage color)

recommend no print on sho

Pr Aureomycin®

220 G

Granular • Granulaire

Short Lap

®AUREOMYCIN® 220 G (contiene 220 gramos clorotetraciclina hydrochloride activity per kg) MIXING INSTRUCTIONS FOR MANUFACTURE OF FEED						
To Obtain	22[1] mg/kg (g/tonne)[2]	55 mg/kg (g/tonne)	110 mg/kg (g/tonne)	220 mg/kg (g/tonne)	440 mg/kg (g/tonne)	880 mg/kg (g/tonne)	1100 mg/kg (g/tonne)
Add	100 g	250 g	500 g	1 kg	2 kg	4 kg	5 kg

1. mg/kg = g/tonne of feed 2. grammes per metric tonne (1000 kg) of feed

Beef cattle supplements
70 mg per head per day. Add 320 g Aureomycin® 220 G per tonne of supplement and feed at 1 kg per head per day.

Indications for use and directions
To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness,use this antibiotic prudently and for the shortest duration required to achieve thedesired clinical outcome.

Beef cattle and non-lactating dairy cattle

1. **Claim:** As an aid in the prevention of foot rot.
Level of Drug: Level in the feed such that each animal will receive 0.22 mg/kg of body weight per day or 70 mg per head per day.
Directions: Feed this medicated feed continuously during the period animals are exposed to this disease.

Calves up to 136 kg

1. **Claim:** As an aid in the prevention of bacterial diarrhea in calves.
Level of Drug: 55 mg/kg (0.0055%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed continuously during periods of early growth.

Calves (Milk replacers)

1. **Claim:** As an aid in prevention of bacterial diarrhea in calves.
Level of Drug: 55 mg/kg (0.0055%) of milk replacer powder.

Swine

1.**Claim:** As an aid in prevention of bacterial enteritis (scours, bacterial diarrhea).

Level of Drug: 55 mg/kg (0.0055%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed as the sole ration during the period of early growth up to 32 kg body weight.
Note: Pre-starter and starter feeds to be fed up to and including 6 weeks of age should contain 220 mg/kg (0.022%) of chlortetracycline hydrochloride.

2. **Claim:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours, bacterial diarrhea).
Level of Drug: 110 mg/kg (0.011%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed continuously as the sole ration following the appearance of symptoms and until 3 days after symptoms disappear.
Note: a) Labels must show this statement: Pigs off feed should be given individual treatment.
b) Pre-starter and starter feeds to be fed up to and including 6 weeks of age are required to contain 220 mg/kg (0.022%) chlortetracycline hydrochloride.

3. **Claim:** As an aid in the prevention of porcine proliferative enteropathy (ileitis) caused by *Lawsonia intracellularis* sensitive to chlortetracycline HCl.
Level of Drug: Level in the feed such that each animal will receive 22 mg/kg of body weight per day.
Directions: Feed this medication as the sole ration for 14 days.
Note: Feed levels of this medication will vary according to feed intake and body weight. The appropriate feed level can be calculated as follows:
Feed level (mg/kg) = 22 mg/kg Body weight X Body weight (kg) / Average Daily Feed Intake (kg).
The table below provides additional guidance.

FEED LEVELS (mg chlortetracycline/kg of Feed)

	Body weight (kg)							
ADFI[1] (kg)	5 kg	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg	120 kg	250 kg
0.25	440	2200	-	-	-	-	-
0.50	220	1100	2200	3300	-	-	-
1.00	-	550	1100	1650	2200	2640	-
1.50	-	367	733	1100	1467	1760	-
2.00	-	275	550	825	1100	1320	-
2.50	-	-	440	660	880	1056	-
3.00	-	-	367	550	733	880	1833
4.00	-	-	275	413	550	660	1375

[1] ADFI = Average Daily Feed Intake (kg/day).

Turkeys

1. **Claim:** As an aid in the prevention of Hexamitiasis. (This disease is not common in Canada. This product may be used on those farms having a history of this condition.)
Level of Drug: 55 mg/kg (0.0055%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed as the sole ration for as long as birds are expected to be exposed to infection.

2. **Claim:** As an aid in treatment of Hexamitiasis. (This disease is not common in Canada.)
Level of Drug: 110 mg/kg (0.011%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed as the sole ration when symptoms appear and continue for a few days after symptoms disappear.

3. **Claim:** As an aid in the prevention of synovitis and infectious sinusitis.
Level of Drug: 110 mg/kg (0.011%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed as the sole ration for as long as birds are expected to be exposed to the infection.

4. **Claim:** As an aid in treatment of synovitis.
Level of Drug: 220 mg/kg (0.022%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed as the sole ration when symptoms appear and continue for at least 2 weeks after symptoms disappear.

Lambs

1. **Claim:** As an aid in reduction of losses due to Enterotoxemia in feedlot lambs.
Level of Drug: 22 mg/kg (0.0022%) of the complete feed.
Directions: Feed this medicated feed continuously as the sole ration while lambs are in feedlot.

Storage:
Keep in a dry place at room temperature.

®AUREOMYCIN® 220 G (renferme l'acide de 220 g de chlortétracycline par kg) TABLEAU DE MÉLANGE POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS						
Pour avoir	22[1] mg/kg (g/tonne)[2]	55 mg/kg (g/tonne)	110 mg/kg (g/tonne)	220 mg/kg (g/tonne)	440 mg/kg (g/tonne)	880 mg/kg (g/tonne)	1100 mg/kg (g/tonne)
Ajouter	100 g	250 g	500 g	1 kg	2 kg	4 kg	5 kg

1. mg/kg = g/tonne d'aliment 2. grammes par tonne métrique (1000 kg) d'aliment

Suppléments pour bovins de boucherie
70 mg par tête par jour - ajouter 320 g d'Aureomycin® 220 G par tonne de supplément et servir 1 kg par tête par jour.

Indications et mode d'emploi
Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenirl'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence et pendant la plus courte durédé temps requise pour obtenir le résultat clinique attendu.

Bovins de boucherie et vaches laitières non en lactation

1. **Indication :** Pour aider à prévenir le pietin.
Posologie : Doit être établie de façon que chaque animal reçoive la substance médicamenteuse au taux de 0.22 mg/kg de poids corporel par jour ou 70 mg par tête par jour.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté sans interruption pendant la période où les animaux sont exposés à cette maladie.

Veaux jusqu'à 136 kg

1. **Indication :** Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne chez les veaux.
Posologie : 55 mg/kg (0.0055 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté sans interruption au début de la croissance.

Veaux (succédanés du lait)

1. **Indication :** Pour aider à prévenir la diarrhée bactérienne chez les veaux.
Posologie : 55 mg/kg (0.0055 %) de la poudre succédanée du lait.

Porcs

1. **Indication :** Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée, diarrhée bactérienne).
Posologie : 55 mg/kg (0.0055 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté à l'exclusion de tout autre aliment pendant la période de première croissance jusqu'au poids de 32 kg.
Note : a) Les aliments de pré-début et de début destinés à l'alimentation jusqu'à l'âge de 6 semaines inclusivement doivent renferme 220 mg/kg (0,022 %) de chlorhydrate de chlortétracycline.

2. **Indication :** Pour aider à prévenir l'entérite bactérienne (diarrhée, diarrhée bactérienne).
Posologie : 110 mg/kg (0,011 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenteux pour bétail sans interruption et à l'exclusion de tout autre aliment de l'apparition des symptômes jusqu'à 3 jours après leur disparition.
Note : a) Les étiquettes doivent porter la déclaration suivante : Les porcs qui ne s'alimentent pas doivent être individuellement traités.
b) Les aliments de pré-début et de début destinés à l'alimentation jusqu'à l'âge de 6 semaines inclusivement doivent contenir 220 mg/kg (0,022 %) de chlorhydrate de chlortétracycline.

3. **Indication :** Pour aider à prévenir l'entéropathie proliférative porcine (iléite) associée à *Lawsonia intracellularis* sensible au chlorhydrate de chlortétracycline.
Posologie : Doit être établie de façon que chaque animal reçoive la substance médicamenteuse au taux de 22 mg/kg de poids corporel par jour.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenteux pour bétail sans interruption et à l'exclusion de tout autre aliment pendant 14 jours.
Note : La ratio d'administration de ce médicament varie selon l'ingestion alimentaire quotidienne moyenne des animaux. Le ratio d'administration approprié peut être calculé comme suit :
Ratio d'administration (mg/kg) = 22 mg chlortétracycline/kg de poids corporel x Poids corporel (kg)
Consommation moyenne par jour (kg)
Pour des indications additionnelles, vous référer au tableau suivant :

Ratio d'administration (mg de chlortétracycline par kg de nourriture)

	Poids corporel (kg)						
CMJ[1] (kg)	5 kg	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg	120 kg	250 kg
0.25	440	2200	-	-	-	-	-
0.50	220	1100	2200	3300	-	-	-
1.00	-	550	1100	1650	2200	2640	-
1.50	-	367	733	1100	1467	1760	-
2.00	-	275	550	825	1100	1320	-
2.50	-	-	440	660	880	1056	-
3.00	-	-	367	550	733	880	1833
4.00	-	-	275	413	550	660	1375

[1] CMJ = consommation d'aliments moyenne par jour (kg/jour)

Dindons

1. **Indication :** Pour aider à prévenir l'hexamitiase. (Cette maladie n'est pas fréquente au Canada. Ce produit peut être utilisé dans les basses-cours où l'hexamitiase n'est déjà présente.)
Posologie : 55 mg/kg (0,0055 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté à l'exclusion de tout autre aliment aussi longtemps que les dindons sont censés être exposés à l'infection.

2. **Indication :** Pour aider au traitement de l'hexamitiase. (Maladie peu fréquente au Canada.)
Posologie : 110 mg/kg (0,011 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment dès l'apparition des symptômes et continuer le traitement jusqu'à quelques jours après la disparition des symptômes.

3. **Indication :** *Pour aider à prévenir* la synovite et la sinusite infectieuse.
Posologie : 110 mg/kg (0,011 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté à l'exclusion de tout autre aliment aussi longtemps que les dindons sont censés être exposés à l'infection.

4. **Indication :** Pour aider au traitement de la synovite.
Posologie : 220 mg/kg (0,022 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté à l'exclusion de tout autre aliment dès l'apparition des symptômes et continuer jusqu'à au moins deux semaines après leur disparition.

Agneaux

1. **Indication :** Pour aider à diminuer les pertes dues à l'entéro-toxémie chez les agneaux engraissés en enclos.
Posologie : 22 mg/kg (0,0022 %) de l'aliment complet.
Mode d'emploi : Distribuer cet aliment médicamenté sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment pendant que les agneaux sont dans l'enclos d'engraissement.

Entreposage :
Entreposer dans un endroit sec à la température ambiante.

Lot See bag seal / Voir le cachet du sac
Exp. See bag seal / Voir le cachet du sac

Zoetis Canada Inc.
Kirkland QC H9H 4M7

Net 25 kg
700118-78-0
30352700

6 74254 00197 7

CONTAINS ANTIMICROBIAL AS AUREOMYCIN® CONTIENT DU ANTIMICROBIEN COMME DU AUREOMYCIN®

Pr Aureomycin®

220 G

Granular • Granulaire

zoetis

Black Line Indicates actual Cuttout of finished bag

Time/Date: 30352700.pdf 1 6/16/14 8:29 AM

zoetis	Project No.	Artwork Number	Description	Country
	12955	30352700	Aureomycin 220G	Canada
	Dimensions	Drawing No.	SKU No.	Name
	34"L x 15"W x 6"	DWG-300042-00	700118	Bag

Additional Info:

Colors: Black, PMS 032, Dieline

EDITOR'S COPY GS: DATE:

Mgr	J. Rustad	Rev	GA	PR	GS / ART REV (LCA)	GS / ART REV (FA)
GS	W. Floyd	2		CHANGES OK	CHANGES OK	CHANGES OK
GA	A. Russell					

2015 09 21 Aureo 220 Clean Bag Label