

Bottle – 250 mL

MAIN PANEL:

DIN XXXXXXXX

Sterile/ Stérile

Sodium Iodide 20%

Sodium Iodide Injection 200 mg/mL/ Injection d'iodure de sodium 200 mg/mL

Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

WARNINGS: MILK TAKEN FROM TREATED ANIMALS DURING TREATMENT AND WITHIN 72 HOURS AFTER THE LATEST TREATMENT WITH THIS DRUG MUST NOT BE USED IN FOOD. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN./ **MISES EN**

GARDE: LE LAIT PROVENANT DES ANIMAUX TRAITÉS QUI EST EXTRAIT PENDANT LE TRAITEMENT ET DANS LES 72 HEURES APRÈS LA DERNIÈRE DOSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME ALIMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

250 mL

Alberta Veterinary Laboratories Ltd.
411 – 19th Street SE, Calgary, AB T2E 6J7

SIDE PANEL:

Each mL contains:

ACTIVE INGREDIENTS:

Sodium Iodide USP 200 mg

PRESERVATIVES:

Benzyl Alcohol 2.5 mg

INDICATIONS:

For the treatment of actinomycosis and actinobacillosis in cattle and as an expectorant in mild respiratory disease of cattle, horses and sheep.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administer by intravenous injection.

Cattle: Actinomycosis and actinobacillosis: 15 mL per 45 kg body weight. Repeat in 7-10 days.

Cattle, Horses and Sheep: As expectorant: 1 to 3 mL per 40 kg body weight. Repeat in 7-10 days if necessary.

CONTRAINDICATIONS:

Contraindicated in hyperthyroidism, advanced pregnancy and acute metal poisoning.

CAUTIONS:

Discontinue immediately if toxic signs such as excessive lacrimation, dyspnea or tachypnea occur. Subcutaneous injection causes severe irritation and local swelling.

STORAGE CONDITIONS:

Store at 15°C and 25°C. Keep from freezing.

Lot:

EXP.:

FRENCH:

Chaque ml contient:

INGRÉDIENT ACTIF:

Iodure de sodium 200 mg

Agent de conservation:

Alcool benzylique 2.5 mg

INDICATIONS: Pour aider au traitement de l'actinomycose et l'actinobacillose chez les bovins et comme expectorant dans les cas de maladies respiratoires bénignes chez les bovins, les chevaux et les moutons.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Administrer par injection intraveineuse.

Bovins: Actinomycose et actinobacillose: 15 ml par 45 kg de poids corporel. Répéter après 7 à 10 jours.

Bovins, chevaux et moutons: Comme expectorant: 1-3 ml par 40 kg de poids corporel. Répéter après 7 à 10 jours si nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS: Contre-indiqué lors d'hyperthyroïdisme, de gestation avancée et d'intoxication aiguë aux métaux.

PRÉCAUTIONS: Cesser immédiatement si des signes toxiques, tels que larmoiement excessif, dyspnée ou tachypnée, se produisent. L'injection par voie sous-cutanée cause de l'irritation sévère et de l'enflure locale.

ENTREPOSAGE: Conserver entre 15 et 25°C. Éviter le gel.