

RENSEIGNEMENTS D'ORDONNANCE

PrPENTAMYCETIN®

Solution ophtalmique de chloramphénicol USP
0,25 %, 0,5 %

Onguent ophtalmique de chloramphénicol USP
1 %

Antibiotique

PrPENTAMYCETIN/HC®

Suspension ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone
(chloramphénicol 0,2 % et acétate d'hydrocortisone 1%)

Onguent ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone
(chloramphénicol 1 % et acétate d'hydrocortisone 1%)

Antibiotique/corticostéroïde

Sandoz Canada Inc.
145, Jules-Léger
Boucherville (Québec) Canada
J4B 7K8

Date de révision : 14 juin 2018

Numéro de contrôle de la présentation : 214703

PrPENTAMYCETIN®

Solution ophtalmique de chloramphénicol USP
0,25 %, 0,5 %

Onguent ophtalmique de chloramphénicol USP
1 %

Antibiotique

PrPENTAMYCETIN/HC®

Suspension ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone
(chloramphénicol 0,2 % et acétate d'hydrocortisone 1%)

Onguent ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone
(chloramphénicol 1 % et acétate d'hydrocortisone 1%)

Antibiotique/corticostéroïde

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

PENTAMYCETIN, solution et onguent ophtalmique

Traitement des infections oculaires superficielles de la conjonctive et/ou de la cornée causées par des microorganismes sensibles, selon des études bactériologiques, au chloramphénicol.

PENTAMYCETIN/HC, suspension et onguent ophtalmique et otique

À usage topique pour le traitement des infections oculaires et auriculaires superficielles, comme la conjonctivite non purulente et l'otite externe, causées par des microorganismes sensibles, selon des études bactériologiques, au chloramphénicol. L'acétate d'hydrocortisone a des effets anti-inflammatoires.

Pour réduire l'apparition de bactéries pharmacorésistantes et pour maintenir l'efficacité de PENTAMYCETIN & PENTAMYCETIN/HC et d'autres antibactériens, PENTAMYCETIN & PENTAMYCETIN/HC doivent être utilisés uniquement pour traiter les infections pour lesquelles il est démontré ou fortement présumé que des bactéries sensibles en sont la cause.

MISES EN GARDE

On a signalé une hypoplasie de la moelle osseuse, incluant l'anémie aplastique et le décès, à la

suite de l'application topique de chloramphénicol.

Le chloramphénicol ne doit pas être utilisé lorsqu'un agent moins potentiellement dangereux pourrait offrir un traitement efficace.

Sensibilité et résistance

Développement de bactéries résistantes aux médicaments

Prescrire PENTAMYCETIN ou PENTAMYCETIN/HC en l'absence d'une infection bactérienne démontrée ou fortement soupçonnée est peu susceptible de procurer des bienfaits aux patients, et une telle utilisation augmente le risque de voir apparaître des bactéries pharmacorésistantes.

Risque de surcroissance microbienne

L'usage prolongé de chloramphénicol peut quelquefois entraîner une prolifération de microorganismes non sensibles au médicament, y compris des champignons. En cas de surinfection, il faut mettre fin au traitement pour adopter un traitement de remplacement.

CONTRE-INDICATIONS

Sensibilité au chloramphénicol avec des signes d'irritation locale, des symptômes de brûlure, une maladie de Quincke, des démangeaisons, de l'urticaire, une dermatite vésiculaire et maculopapulaire. Si ces signes font leur apparition, cesser l'utilisation du médicament et consulter un médecin.

Hypersensibilité à l'un des composants du médicament.

La suspension et l'onguent PENTAMYCETIN/HC sont particulièrement contre-indiqués en cas d'herpès, de kératite, de vaccine, de varicelle, de maladies virales de la cornée et de la conjonctive, de tuberculose oculaire, de mycoses oculaires, d'infections oculaires purulentes graves non traitées qui, comme les autres maladies causées par des microorganismes, peuvent être masqués ou aggravés en présence du stéroïde.

PRÉCAUTIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Il convient de se souvenir qu'un patient peut développer une sensibilité au chloramphénicol lorsqu'il est appliqué en usage topique. L'utilisation prolongée des médicaments corticostéroïdes pour les yeux peut entraîner chez certaines personnes une augmentation de la pression intraoculaire; on a signalé des cas de perforation pour les maladies causant un amincissement de la cornée ou de la sclérotique. Il est recommandé de vérifier fréquemment la pression intraoculaire.

L'innocuité de l'utilisation des corticostéroïdes pendant la grossesse n'a pas été établie.

Pour toutes les infections graves, l'usage topique du chloramphénicol doit être accompagné d'un médicament systémique adéquat.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Solutions ophtalmiques PENTAMYCETIN

2 gouttes de solution ophtalmique dans l'œil ou les yeux affecté(s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Onguent ophtalmique Pentamycetin

Une petite quantité d'onguent dans l'œil ou les yeux affecté (s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Suspension ophtalmique et otique PENTAMYCETIN/HC

2 gouttes de solution ophtalmique dans l'œil (les yeux) ou l'oreille (les oreilles) affecté (s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Onguent ophtalmique et otique PENTAMYCETIN/HC

Une petite quantité d'onguent dans l'œil (les yeux) ou l'oreille (les oreilles) affecté (s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Réduire la fréquence après 48 heures; le traitement doit être poursuivi au moins 48 heures après que les yeux (ou les oreilles) affectés seront revenus à leur état normal.

SURDOSAGE

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région immédiatement.

FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT; ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

PENTAMYCETIN (solution ophtalmique de chloramphénicol USP à 0,25 %) 10 mL

Chaque millilitre contient 2,5 mg (0,25 %) de chloramphénicol et 0,5 % de chlorobutanol comme agent de conservation dans une solution tampon stérile. Disponible en fiole avec compte-gouttes. Garder réfrigéré (2-8 °C) jusqu'à la délivrance du médicament. Protéger du gel. Une fois remise au patient, la solution peut être conservée à la température ambiante pendant 21 jours; après cette

période, jeter toute portion non utilisée. Éviter de contaminer le bout du compte-gouttes. Ne pas utiliser si le capuchon du compte-gouttes est détaché de l'anneau de sécurité.

PENTAMYCETIN (solution ophtalmique de chloramphénicol USP à 0,5 %) 10 mL

Chaque millilitre contient 5 mg (0,5 %) de chloramphénicol et 0,5 % de chlorobutanol comme agent de conservation dans une solution tampon stérile. Disponible en fiole avec compte-gouttes. Garder réfrigéré (2-8 °C) jusqu'à la délivrance du médicament. Protéger du gel. Une fois remise au patient, la solution peut être conservée à température ambiante pendant 21 jours; après cette période, jeter toute portion non utilisée. Éviter de contaminer le bout du compte-gouttes. Ne pas utiliser si le capuchon du compte-gouttes est détaché de l'anneau de sécurité.

PENTAMYCETIN (onguent ophtalmique de chloramphénicol USP à 1 %) 3,5 g

Chaque gramme contient 10 mg (1 %) de chloramphénicol dans une base de vaseline stérile. Disponible en tube souple. Éviter de contaminer le bout du tube. Conserver entre 15 et 30 °C. Protéger du gel.

PENTAMYCETIN/HC (suspension ophtalmique et otique de chloramphénicol à 0,2 % et de l'acétate d'hydrocortisone à 1 %) 5 mL

Chaque millilitre contient 2 mg (0,2 %) de chloramphénicol et 10 mg (1 %) d'acétate d'hydrocortisone dans un excipient tampon stérile. **Bien agiter avant chaque utilisation.** Disponible en bouteille avec compte-gouttes. Garder réfrigéré (2-8°C) jusqu'à la délivrance du médicament. Protéger du gel. Une fois remise au patient, la solution peut être conservée à la température ambiante pendant 21 jours; après cette période, jeter toute portion non utilisée. Éviter de contaminer le bout du compte-gouttes. Ne pas utiliser si le capuchon du compte-gouttes est détaché de l'anneau de sécurité.

PENTAMYCETIN/HC (onguent ophtalmique et otique de chloramphénicol à 1 % et de l'acétate d'hydrocortisone à 1 %) 3,5 g

Chaque gramme contient 10 mg (1 %) de chloramphénicol et 10 mg (1 %) d'acétate d'hydrocortisone dans une base de vaseline stérile. Disponible en tube souple. Éviter de contaminer le bout du tube. Conserver entre 15 et 30 °C. Protéger du gel.

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DE VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

PrPENTAMYCETIN®

Solution ophtalmique de chloramphénicol USP 0,25 %, 0,5 %

Onguent ophtalmique de chloramphénicol USP 1 %

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre PENTAMYCETIN et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de PENTAMYCETIN

Pourquoi PENTAMYCETIN est-il utilisé?

PENTAMYCÉTIN est utilisé pour traiter les infections de l'œil et de l'oreille.

Les médicaments antibactériens comme PENTAMYCETIN ne traitent que les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales.

Comment PENTAMYCETIN agit-il?

PENTAMYCÉTIN est un antibiotique qui :

- freine la croissance des bactéries
- tue les bactéries

Quels sont les ingrédients de PENTAMYCETIN?

Solution ophtalmique

Ingrédients médicinaux : chloramphénicol

Ingrédients non médicinaux : chlorobutanol comme agent de conservation polyéthylène glycol, polyoxyéthylène stéarate, l'eau purifiée et l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Onguent ophtalmique

Ingrédients médicinaux : chloramphénicol

Ingrédients non médicinaux : base de vaseline

PENTAMYCETIN est offert sous les formes posologiques qui suivent :

Pentamycetin (Solution ophtalmique 0.25% et 0.5%) : en bouteille de 10 mL

Pentamycetin (Onguent ophtalmique 1%) : en tube de 3.5 g

Ne prenez pas PENTAMYCETIN si:

Ne pas utiliser ce produit, sauf sous le conseil et la surveillance d'un médecin si:

- vous êtes allergique au chloramphénicol ou à tout autre ingrédient contenu dans PENTAMYCÉTIN.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser PENTAMYCETIN afin de réduire le risque d'effets indésirables et d'assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- vous présentez une douleur à l'œil, une altération de la vision, une rougeur ou une irritation persistante de l'œil ou si votre état empire ou persiste, consultez un médecin.

Autres mises en garde à connaître :

- Une surutilisation de ce produit pourrait accroître la rougeur oculaire.
- Pour usage externe seulement.
- Si aucune amélioration n'est constatée au bout de deux jours de traitement, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- Votre vision pourrait être trouble pendant quelques minutes suite à l'utilisation du produit. Vous ne devez pas conduire ou opérer de machinerie tant que votre vision n'est pas claire

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

Pourquoi PENTAMYCETIN est-il utilisé?

- Bien que l'on puisse se sentir mieux tôt au début du traitement, PENTAMYCETIN doit être pris exactement comme il vous a été prescrit.
- Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de PENTAMYCETIN pourrait entraîner la prolifération des bactéries qui ne seront pas détruites par PENTAMYCETIN (résistance). Cela signifie que PENTAMYCETIN pourra, dans le futur, s'avérer inefficace pour vous.
- Ne partagez pas vos médicaments

Comment utiliser PENTAMYCETIN Onguent?

Une petite quantité d'onguent dans l'œil ou les yeux affecté (s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire

Comment appliquer PENTAMYCETIN Onguent dans l'œil (les yeux) :

- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Asseyez-vous devant un miroir pour voir ce que vous allez faire.
- Enlevez le capuchon du tube.
- Penchez la tête par en arrière.
- Tirez doucement sur la paupière inférieure et regardez vers le haut.
- Tenez le tube au-dessus de l'œil, pressez doucement et déposer une ligne d'onguent de 1 cm le long de l'intérieur de la paupière inférieure, en prenant soin de ne pas toucher les cils ou l'œil (les yeux) avec l'embout du tube.
- Clignez de l'œil (des yeux) pour répartir l'onguent sur toute la surface du globe oculaire.

- Vous verrez peut-être flou lorsque vous ouvrirez les yeux - NE vous frottez PAS les yeux. Votre vision redeviendra normale en quelques instants si vous continuez à cligner des yeux.
- Essuyez tout excès d'onguent avec un mouchoir en papier propre.
- Répétez cette opération pour l'autre œil si votre médecin ou votre pharmacien vous l'a conseillé.
- Refermez le tube.
- Veillez à ne pas toucher l'embout du tube avec les doigts.
- Ne portez pas de verres de contact tant que l'infection n'est pas guérie.

Comment utiliser PENTAMYCETIN Solution ophtalmique?

Instillez deux gouttes de solution ophtalmique dans l'œil ou les yeux affecté(s) toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Comment utiliser PENTAMYCETIN Solution ophtalmique :

- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Renversez la tête en arrière ou allongez-vous sur le dos et levez les yeux vers le plafond.
- Les yeux ouverts, tirez doucement sur la paupière inférieure afin de former une « poche ».
- Tenez le contenant à au moins 2 cm de l'œil et versez une goutte dans la poche ainsi formée.
- Relâchez doucement la paupière inférieure.
- Gardez l'œil fermé pendant une ou deux minutes. Ne le frottez pas et essayez de ne pas cligner des yeux.
- S'il faut mettre plusieurs gouttes, attendez de trois à cinq minutes entre les applications.
- Ne mettez pas le stilligoutte en contact avec l'œil.
- Ne portez pas de verres de contact tant que l'infection n'est pas guérie.

Surdosage :

Si vous croyez avoir pris trop de PENTAMYCETIN, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PENTAMYCETIN?

En prenant PENTAMYCETIN, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme ou effet	Symptôme ou effet		Symptôme ou effet
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
Irritation locale : symptômes de brûlure, d'enflure (œdème angioneurotique), de démangeaison, d'urticaire, d'éruption cutanée (dermatite vésiculaire et maculopapulaire)			✓

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d'être associées avec l'utilisation d'un produit de santé par:

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

PENTAMYCETIN (solution ophtalmique 0,25 % et 0.5%) :

Garder réfrigéré (2-8 °C) jusqu'à la délivrance du médicament. Protéger du gel. Une fois remise au patient, la solution peut être conservée à la température ambiante pendant 21 jours; après cette période, jeter toute portion non utilisée. Éviter de contaminer le bout du compte-gouttes. Ne pas utiliser si le capuchon du compte-gouttes est détaché de l'anneau de sécurité.

PENTAMYCETIN (onguent ophtalmique 1 %) :

Conserver entre 15 et 30 °C. Protéger du gel.

Garder hors de la portée de et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de PENTAMYCETIN, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est publié sur le [site Web de Santé Canada](http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) (<http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php>), le site Web du fabricant www.sandoz.ca, ou en téléphonant le 1-800-361-3062.

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc.

Dernière révision : juin 14, 2018

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DE VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

P^rPENTAMYCETIN/HC®

Suspension ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone
Onguent ophtalmique et otique de chloramphénicol et d'hydrocortisone

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre PENTAMYCETIN/HC et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de PENTAMYCETIN/HC

Pourquoi PENTAMYCETIN/HC est-il utilisé?

PENTAMYCÉTIN est utilisé pour traiter les infections de l'œil et de l'oreille.

Les médicaments antibactériens comme PENTAMYCETIN/HC ne traitent que les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales.

Comment PENTAMYCETIN/HC agit-il?

PENTAMYCÉTIN/HC contient deux médicaments :

- le chloramphénicol (antibiotique) qui tue les bactéries et freine leur croissance;
- l'acétate d'hydrocortisone (corticostéroïde) qui prévient l'inflammation.

Quels sont les ingrédients de PENTAMYCETIN/HC?

Suspension ophtalmique

Ingrédients médicinaux : chloramphénicol et de l'acétate d'hydrocortisone

Ingrédients non médicinaux : povidone, polysorbate, l'eau purifiée et l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Onguent ophtalmique et otique

Ingrédients médicinaux : chloramphénicol et de l'acétate d'hydrocortisone

Ingrédients non médicinaux : base de vaseline

PENTAMYCETIN/HC est offert sous les formes posologiques qui suivent :

Pentamycetin/HC (Suspension ophtalmique et otique) : en bouteille de 5 mL

Pentamycetin/HC (Onguent ophtalmique et otique) : en tube de 3.5 g

Ne prenez pas PENTAMYCETIN/HC si:

- vous êtes allergique au chloramphénicol ou à tout autre ingrédient contenu dans PENTAMYCÉTIN.
- vous présentez une inflammation de la cornée (partie avant de l'œil), également connue sous le nom de kératite;
- vous présentez une infection virale ou fongique de l'œil.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser PENTAMYCÉTIN afin de réduire le risque d'effets indésirables et d'assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- vous présentez une douleur à l'œil, une altération de la vision, une rougeur ou une irritation persistante de l'œil ou si votre état empire ou persiste, consultez un médecin;
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.

Autres mises en garde à connaître :

- Une surutilisation de ce produit pourrait accroître la rougeur oculaire.
- Évitez tout contact entre l'embout du tube et d'autres surfaces pour éviter la contamination.
- Si aucune amélioration n'est constatée au bout de deux jours de traitement, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- Votre vision pourrait être trouble pendant quelques minutes suite à l'utilisation du produit. Vous ne devez pas conduire ou opérer de machinerie tant que votre vision n'est pas claire.

Pourquoi PENTAMYCÉTIN/HC est-il utilisé?

- Bien que l'on puisse se sentir mieux tôt au début du traitement, PENTAMYCÉTIN/HC doit être pris exactement comme il vous a été prescrit.
- Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de PENTAMYCÉTIN/HC pourrait entraîner la prolifération des bactéries qui ne seront pas détruites par le PENTAMYCÉTIN/HC (résistance). Cela signifie que PENTAMYCÉTIN/HC pourra, dans le futur, s'avérer inefficace pour vous.
- Ne partagez pas vos médicaments

Comment utiliser PENTAMYCÉTIN/HC Onguent?

Une petite quantité d'onguent dans l'œil/les yeux affecté (s) ou dans l'oreille affectée toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire

Comment appliquer PENTAMYCÉTIN/HC Onguent dans l'œil (les yeux) :

- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Asseyez-vous devant un miroir pour voir ce que vous allez faire.
- Enlevez le capuchon du tube.
- Penchez la tête par en arrière.
- Tirez doucement sur la paupière inférieure et regardez vers le haut.
- Tenez le tube au-dessus de l'œil, pressez doucement et déposez une ligne d'onguent de 1 cm le long de l'intérieur de la paupière inférieure, en prenant soin de ne pas toucher les cils ou l'œil (les yeux) avec l'embout du tube.

- Clignez de l'œil (des yeux) pour répartir l'onguent sur toute la surface du globe oculaire.
- Vous verrez peut-être flou lorsque vous ouvrirez les yeux - NE vous frottez PAS les yeux. Votre vision redeviendra normale en quelques instants si vous continuez à cligner des yeux.
- Essuyez tout excès d'onguent avec un mouchoir en papier propre.
- Répétez cette opération pour l'autre œil si votre médecin ou votre pharmacien vous l'a conseillé.
- Refermez le tube.
- Veillez à ne pas toucher l'embout du tube avec les doigts.
- Ne portez pas de verres de contact tant que l'infection n'est pas guérie.

Comment utiliser PENTAMYCETIN/HC Solution ophtalmique?

Instillez deux gouttes de solution ophtalmique dans l'œil ou les yeux affecté(s) ou dans l'oreille affectée toutes les trois heures ou plus souvent si nécessaire.

Comment utiliser PENTAMYCETIN Solution ophtalmique dans l'œil (les yeux) :

- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Renversez la tête en arrière ou allongez-vous sur le dos et levez les yeux vers le plafond.
- Les yeux ouverts, tirez doucement sur la paupière inférieure afin de former une « poche ».
- Tenez le contenant à au moins 2 cm de l'œil et versez une goutte dans la poche ainsi formée.
- Relâchez doucement la paupière inférieure.
- Gardez l'œil fermé pendant une ou deux minutes. Ne le frottez pas et essayez de ne pas cligner des yeux.
- S'il faut mettre plusieurs gouttes, attendez de trois à cinq minutes entre les applications.
- Ne mettez pas le stilligoutte en contact avec l'œil.
- Ne portez pas de verres de contact tant que l'infection n'est pas guérie.

Administration de PENTAMYCETIN/HC solution ophtalmique ou onguent dans l'oreille

- Étendez-vous sur le côté ou penchez la tête de façon à ce que l'oreille infectée soit vers le haut.
- Tirez doucement le lobe d'oreille vers le haut, en l'éloignant du cou, et instillez les gouttes dans l'oreille.
- Laissez les gouttes s'écouler le long du conduit auditif et massez doucement l'orifice de l'oreille pour favoriser la descente des gouttes dans le conduit auditif.
- Gardez la tête inclinée pendant quelques minutes.

Surdosage :

Si vous croyez avoir pris trop de PENTAMYCETIN/HC, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PENTAMYCETIN/HC?

En prenant PENTAMYCETIN/HC, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que

ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET MESURE À PRENDRE			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
Irritation locale : symptômes de brûlure, d'enflure (œdème angioneurotique), de démangeaison, d'urticaire, d'éruption cutanée (dermatite vésiculaire et maculopapulaire)			✓

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associé avec l'utilisation d'un produit de santé par:

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

PENTAMYCETIN/HC (suspension ophtalmique et otique) :

Garder réfrigéré (2-8°C) jusqu'à la délivrance du médicament. Protéger du gel. Une fois remise au patient, la solution peut être conservée à la température ambiante pendant 21 jours; après cette période, jeter toute portion non utilisée. Éviter de contaminer le bout du compte-gouttes. Ne pas utiliser si le capuchon du compte-gouttes est détaché de l'anneau de sécurité.

PENTAMYCETIN/HC (onguent ophtalmique et otique) :

Conservé entre 15 et 30 °C. Protéger du gel.

Garder hors de la portée de et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de PENTAMYCETIN/HC, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est publié sur le [site Web de Santé Canada](http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) (<http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php>), le site Web du fabricant www.sandoz.ca, ou en téléphonant 1-800-361-3062.

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc.

Dernière révision : juin 14, 2018