



# Astri-UC

DIN XXXXXXXX

**STORAGE / ENTREPOSAGE**

Store at or below 30°C.  
Do not freeze.

Ne pas entreposer à plus de 30°C.  
Ne pas congeler.

## Sanitizing Pre- and Post-Milking Teat Dip Bain de trayons assainisseur à utiliser avant et après la traite For Veterinary Use Only | Pour usage vétérinaire seulement

**ACTIVE INGREDIENTS:**

Hydrogen peroxide ..... 0.5% w/w  
Lactic acid.....1.7% w/w  
Sodium linear alkylate sulphonate ..... 0.5% w/w

**INGRÉDIENTS ACTIFS:**

Peroxyde d'hydrogène.....0.5% p/p  
Acide lactique .....1.7% p/p  
Sulfonate alkylate linéaire de sodium .....0.5% p/p




Teat Dip  
Bain de trayon

**WARNINGS | MISES EN GARDE**

See other label for complete warnings | Voir l'autre étiquette de bouteille pour les mises en garde complètes  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN | GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

See other label for complete product information | Voir l'autre étiquette pour les informations complètes du produit.

56.7 L (15 US GAL)  
6302200





# Astri-UC

DIN XXXXXXXX

## Sanitizing Pre- and Post-Milking Teat Dip Bain de trayons assainisseur à utiliser avant et après la traite For Veterinary Use Only | Pour usage vétérinaire seulement

### ACTIVE INGREDIENTS:

Hydrogen peroxide ..... 0.5% w/w  
Lactic acid.....1.7% w/w  
Sodium linear alkylate sulphonate ..... 0.5% w/w

### INGRÉDIENTS ACTIFS:

Peroxyde d'hydrogène.....0.5% p/p  
Acide lactique .....1.7% p/p  
Sulfonate alkylate linéaire de sodium .....0.5% p/p



Teat Dip  
Bain de trayon

### WARNINGS | MISES EN GARDE


See other label for complete warnings | Voir l'autre étiquette de bouteille pour les mises en garde complètes  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN | GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

See other label for complete product information | Voir l'autre étiquette pour les informations complètes du produit.

772729/5300/XXXX

208 L (55 US GAL)  
6302197

STORAGE / ENTREPOSAGE  
Store at or below 30°C.  
Do not freeze.  
Ne pas entreposer à plus de 30°C.  
Ne pas congeler.



ECOLAB®

Astri-UC

DIN XXXXXXXX

Sanitizing Pre- and Post-Milking Teat Dip  
Bain de trayons assainisseur à utiliser avant et après la traite



# Astri-UC

DIN XXXXXXXX

**STORAGE / ENTREPOSAGE**

Store at or below 30°C.  
Do not freeze.

Ne pas entreposer à plus de 30°C.  
Ne pas congeler.

## Sanitizing Pre- and Post-Milking Teat Dip Bain de trayons assainisseur à utiliser avant et après la traite

### For Veterinary Use Only | Pour usage vétérinaire seulement

**ACTIVE INGREDIENTS:**

Hydrogen peroxide ..... 0.5% w/w  
Lactic acid.....1.7% w/w  
Sodium linear alkylate sulphonate ..... 0.5% w/w

**INGRÉDIENTS ACTIFS:**

Peroxyde d'hydrogène.....0.5% p/p  
Acide lactique .....1.7% p/p  
Sulfonate alkylate linéaire de sodium .....0.5% p/p



Teat Dip  
Bain de trayon


**WARNINGS | MISES EN GARDE**

See other label for complete warnings | Voir l'autre étiquette de bouteille pour les mises en garde complètes

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN | GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

See other label for complete product information | Voir l'autre étiquette pour les informations complètes du produit.

1150 L (304 US GAL)  
**6302198**





# Astri-UC

DIN XXXXXXXX

## Sanitizing Pre- and Post-Milking Teat Dip For Veterinary Use Only

### INDICATIONS:

Pre-milking teat dip for reducing new udder quarter infections caused by *Streptococcus uberis*. Post milking teat dip for reducing new udder quarter infections caused by *Staphylococcus aureus*.  
For use in dairy cattle.

### DIRECTIONS FOR USE:

Astri-UC can be used a post-dip alone or as a pre-and post dip. Always use fresh, full strength Astri-UC. If product in dip cup becomes visibly dirty, discard contents, rinse cup and replenish with undiluted Astri-UC. Dip cups should be washed after each milking.  
Pre-Milking: Wash and dry teats with a single service towel prior to dipping. Before each cow is milked, forestrip and check for clinical mastitis, then dip the teats as far up as possible. Leave Astri-UC teat dip on teats for at least 15-30 seconds. Wipe teat dry using a single service towel before milking.  
Post-Milking: Immediately after milking dip teats at least 2/3 to all their length in Astri-UC teat dip. Allow to air dry. DO NOT WIPE.

STORAGE: Avoid freezing. However, freezing will not affect the performance of this product, provided that the frozen contents are thawed completely and agitated thoroughly before use.

### CAUTIONS:

For external use only. Do not turn cows out in freezing weather until the dipped teats are completely dry. If teat irritation occurs, discontinue use until irritation subsides. Consult your veterinarian and milking equipment service personnel if irritation persists.

### WARNINGS

No withdrawal period for meat and withholding time for milk are required when used according to the label. Causes eye irritation. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling.

#### FIRST AID

**Eye Contact:** In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water. Remove contact lenses and flush again. Get medical attention if irritation persists.

**Skin Contact:** No known effect after skin contact. Rinse with water for a few minutes.

**Inhalation:** No special measures required. Treat symptomatically.

**Ingestion:** Get medical attention if symptoms occur.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

### READ SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USING THIS PRODUCT

**EMERGENCY HEALTH INFORMATION:** 1 800 328 0026. If located outside the United States and Canada, call collect 1 651 222 5352 (number is in the US).

**Exp. Date:**

**Lot #:**

Manufactured for / Fabriqué pour:  
Ecolab Co. • 5105 Tomken Road • Mississauga ON L4W 2X5 Canada • tel. 1 800 465 1914  
By / Par:  
Ecolab Inc. • 1 Ecolab Place • St Paul MN 55102-1390 USA • tel. 1 800 392 3392  
© 2018 Ecolab USA Inc • All rights reserved • Tous droits réservés  
772732/5300/XXXX

## Bain de trayons assainisseur à utiliser avant et après la traite Pour usage vétérinaire seulement

### INDICATIONS:

Trempage avant la traite pour réduire de nouvelles infections causées par *Streptococcus uberis* dans les quartiers du pis. Trempage après la traite pour réduire de nouvelles infections causées par *Staphylococcus aureus* dans les quartiers du pis.  
Pour utilisation chez les bovins laitiers.

### MODE D'EMPLOI:

Le bain de trayons Astri-UC peut être utilisé comme bain de trayons après la traite seulement ou comme bain de trayons avant et après la traite. Il faut toujours utiliser d'Astri-UC non dilué. Si le produit contenu dans le gobelet de trempage devient visiblement sale, il faut en jeter le contenu, rincer le gobelet et le remplir d'Astri-UC non dilué. Les godets servant à baigner les trayons doivent être lavés après chaque traite.  
Avant la traite: Laver et sécher les trayons avec une serviette à utilisation unique avant de les tremper dans le bain de trayons. Avant la traite, pour chacune des vaches, prêter attention aux premiers jets et au pis à la recherche d'éventuels signes de mammite, ensuite tremper les trayons le plus profondément possible dans les godets à trempage. Laisser le bain de trayons Astri-UC sur les trayons pendant au moins 15-30 secondes. Essuyer les trayons avec une serviette sèche à utilisation unique avant la traite.  
Après la traite: Immédiatement après la traite, tremper les trayons au 2/3 ou au complet si possible dans le bain de trayon Astri-UC. Laisser sécher à l'air. NE PAS ESSUYER LES TRAYONS APRÈS CETTE APPLICATION.

ENTREPOSAGE: Éviter le gel. Par contre, le gel n'affecte aucunement l'efficacité du produit si l'on prend des mesures appropriées pour le reconstituer. En cas de gel il conviendra de bien le faire dégeler et de l'agiter convenablement avant son utilisation.

### PRÉCAUTIONS:

Ce produit est réservé à l'usage externe. En cas de gel à l'extérieur, ne pas faire sortir les animaux traités avant que leurs trayons ne soient complètement secs. Si des signes d'irritation se manifestent au niveau des trayons, cesser l'application du produit jusqu'à disparition des signes cliniques. Si l'irritation persiste, consulter le vétérinaire ainsi que le préposé au service technique de l'appareil de traite.

### MISES EN GARDE

Un délai d'attente pour la viande et une période de retrait pour le lait ne sont pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies. Provoque une irritation des yeux. Éviter le contact avec les yeux. Laver abondamment après usage.

### PREMIERS SOINS

**Contact avec les yeux:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau. Retirer les lentilles de contact et rincer les yeux une fois de plus. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**Contact avec la peau:** Aucun effet connu en cas de contact avec la peau; rincer à l'eau pendant quelques minutes.

**Inhalation:** Aucune mesure spéciale n'est requise. Traitement symptomatique requis.

**Ingestion:** Consulter un médecin si des symptômes se développent.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

### LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

**INFORMATION DE SANTÉ D'URGENCE:** 1 800 328 0026. Si à l'extérieur des États-Unis et du Canada, appelez à frais virés le 1 651 222 5352 (numéro aux États-Unis).