

Label, front panel (bilingual) Glycol-P 100
DIN 02475871

Code YYY

Glycol-P 100

Propylene Glycol, USP
Propylène glycol, USP
Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Warnings: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children.

Mises en garde : Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait ne sont pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Net XXX



XXX: 4 L ou/or 20 L
YYY : 4 L (), 20 L ()

Label, left panel (English version) Glycol-P 100

Active Ingredients:

Propylene Glycol, USP 100% v/v

INDICATIONS:

As an aid in the treatment of acetonemia in cattle and sheep.

DOSAGE and ADMINISTRATION:

Administer orally in the drinking water, in the grain ration or as a drench. Use during 4 consecutive days or as directed by your veterinarian.

Cattle

Mild cases: 120 mL morning and evening.

Severe cases: 240 mL morning and evening.

Sheep

Mild cases: 22.5 mL morning and evening.

Severe cases: 45 mL morning and evening.

CAUTIONS:

If no improvement is noted a few days after initiation of treatment, diagnosis should be reconsidered. Please call a veterinarian if deterioration of the clinical state is noticed. Concurrent conditions such as milk fever may be present and must be treated in conjunction with the acetonemia.

STORAGE CONDITIONS:

Store between 15°C and 25°C.

Lot :

Exp:

Label, right panel (French version) Glycol-P 100

Ingrédients actifs :

Propylène glycol, USP 100% v/v

INDICATIONS :

Pour aider au traitement de l'acétonémie chez les bovins et les moutons.

POSOLOGIE et ADMINISTRATION :

Par voie orale, dans l'eau de boisson, dans la ration de grains ou comme breuvage. Utiliser durant 4 jours consécutifs ou tel que recommandé par votre vétérinaire.

Bovins :

Cas peu sévères : 120 ml matin et soir.

Cas sévères : 240 ml matin et soir.

Moutons :

Cas peu sévères : 22,5 ml matin et soir.

Cas sévères : 45 ml matin et soir.

PRÉCAUTIONS :

Si aucune amélioration n'est notée quelques jours après le début du traitement, le diagnostic devrait être reconsidéré. Appeler un vétérinaire si vous notez une détérioration de l'état de santé de l'animal. Des conditions concomitantes tel que la « fièvre du lait » pourraient être présentes et doivent être traitées en même temps que l'acétonémie.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :

Entreposer entre 15°C et 25°C.

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5