

Mock-up Label

Net: XX L = 4 L, 18.9 L, 56.8 L, 208 L, 1040 L

DIN XXXXXXXXX

Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement
Peroxy Prep
LACTIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE AND
SODIUM LINEAR ALKYLATE SULFONATE TEAT SOLUTION

SOLUTION POUR TRAYONS À BASE D'ACIDE LACTIQUE, DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET
D'ALKYLATE SULFONATE DE SODIUM LINÉAIRE

Pre and Post-Milking Antiseptic Teat Solution / Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

WARNINGS / MISES EN GARDE: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children./Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

ACTIVE INGREDIENTS: Lactic acid 1.7% w/w, Hydrogen peroxide 0.5%w/w, Sodium linear alkylate sulfonate 0.5% w/w

EMOLLIENTS: Glycerin 5% w/w

INDICATIONS:

Peroxy Prep is a pre and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

DIRECTIONS FOR USE:

PRE-MILKING: Use at full strength. Do not dilute.

Before milking, apply Peroxy Prep to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of Peroxy Prep.

POST-MILKING: Use at full strength. Do not dilute.

Apply Peroxy Prep to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0 °C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of Peroxy Prep to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of Peroxy Prep to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

Mock-up Label

CAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

STORAGE CONDITIONS: Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

Manufactured by / Fabriqué par: Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical, 451 Smith Street, P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0

INGRÉDIENTS ACTIFS : Acide lactique 1,7% p/p, Peroxyde d'hydrogène 0,5% p/p, Alkylate sulfonate de sodium linéaire 0,5% p/p

ÉMOLLIENTS : Glycérine 5% p/p

INDICATIONS :

Peroxy Prep est un solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

MODE D'EMPLOI :

AVANT LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Avant la traite, appliquer Peroxy Prep sur chaque trayon de manière à ce que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pis, puis bien les sécher avant d'appliquer Peroxy Prep.

APRÈS LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Appliquer Peroxy Prep sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de Peroxy Prep sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de Peroxy Prep sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

PRÉCAUTIONS : Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Eviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX