

P^rV-Max[®] 500

(virginiamycin premix)

DIN XXXXXX

FOR VETERINARY USE ONLY**ANTIBIOTIC****FOR FEED MANUFACTURING USE ONLY****ACTIVE INGREDIENT**

Virginiamycin, 500 g/kg

INDICATIONS

Cattle fed in confinement for slaughter: Reduction of incidence of liver abscesses.

MIXING AND FEEDING DIRECTIONS

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic only during periods of increased risk of ruminal acidosis, for the shortest duration required.

Due to the multifactorial approach needed to reduce the risk of liver abscesses, the management of the animals' vaccination status, environment and nutrition should be optimized prior to or concurrently with antibiotic treatment.

Thoroughly mix V-Max 500 premix with complete feed in quantities depending on the dosage as per the table below. To ensure proper mixing, the premix should first be diluted in an intermediate blending step prior to adding to the final blend. The medicated feed can be prepared in the form of meal or pellets.

Cattle fed in confinement for slaughter	Required level of virginiamycin per 1000 kg of complete feed	Amount of V-Max 500 premix per 1000 kg of complete feed	Approximate amount of virginiamycin provided
For the reduction of the incidence of liver abscesses. The medicated feed is to be fed continuously for up to 75 days.	20 g 100% dry matter basis	0.04 kg	200-250 mg/head/d

V-Max is a registered trademark of Phibro Animal Health Corporation.
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Net contents: 25 kg**CAUTIONS**

- (1) Not for use in pregnant, lactating females or animals intended for breeding.
- (2) Do not feed undiluted.

WARNINGS

- (1) No withdrawal period is required when treated according to label.
- (2) When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.
- (3) Do not use in calves to be processed for veal. The withdrawal period has not been established in pre-ruminating calves.
- (4) Do not use in lactating dairy cattle.
- (5) Keep out of reach of children.

STORAGE

Store in a cool, dry place below 30°C. Keep from freezing.
Keep bag closed when not in use.

Distributed by:
Bio Agri Mix LP
P.O. Box 399
Mitchell, ON N0K 1N0
www.bioagrimix.com

LOT No.:**DATE OF MANUFACTURE:****DATE OF EXPIRATION:**

9914013 102-8307-01

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

DIN XXXXXX

P^rV-Max[®] 500 (prémélange de virginiamycine)

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

ANTIBIOTIQUE

POUR UTILISER UNIQUEMENT DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX

INGRÉDIENT ACTIF Virginiamycine, 500 g/kg

INDICATIONS

Pour réduire l'incidence d'abcès au foie chez les bovins de boucherie élevés en parc d'engraissement.

MÉLANGE ET INSTRUCTIONS POUR L'ALIMENTATION

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir son efficacité, utiliser cet antibiotique uniquement pendant les périodes de risque accru d'acidose ruminal, et ce pour la plus courte durée de temps requise.

En raison de la démarche multifactorielle nécessaire à la réduction du risque d'abcès au foie, la gestion de la santé des animaux (i.e. statut vaccinal, environnement et nutrition) devraient être optimisée avant ou pendant le traitement antibactérien.

Mélangez complètement le prémélange V-Max 500 avec l'aliment complet selon le dosage indiqué ci-dessous. Pour assurer un mélange adéquat, le prémélange doit d'abord être dilué à travers un mélange intermédiaire avant d'être ajouté au mélange final. L'aliment médicamenteux peut être fabriqué sous forme de farine ou de granulés.

Bovins de boucherie élevés en parc d'engraissement	Niveau requis de virginiamycine par 1000 kg d'aliment complet	Quantité de prémélange V-Max 500 par 1000 kg d'aliment complet	Quantité approximative de virginiamycine fournie
Pour réduire l'incidence d'abcès du foie. L'aliment médicamenteux doit être donné de façon continue jusqu'à 75 jours.	20 g (basé sur 100% matières sèches)	0,04 kg	200-250 mg/animal/jour

V-Max est une marque déposée de Phibro Animal Health Corporation.
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Contenu net : 25 kg

PRÉCAUTIONS

- (1) Ne pas utiliser chez les femelles gestantes, en lactation ou chez les animaux reproducteurs.
- (2) Ne pas administrer non dilué.

MISES EN GARDE

- (1) Un délai d'attente n'est pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies.
- (2) Ne pas administrer aux veaux élevés pour la boucherie. Un délai d'attente n'a pas été établi pour ces pré-ruminants.
- (3) Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation.
- (4) Lors de la manipulation du produit, éviter une inhalation, une exposition orale ou un contact direct avec la peau ou les yeux.
- (5) Garder hors de portée des enfants.

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec en dessous de 30 °C. Ne pas congeler.
Garder le sac fermé quand il n'est pas utilisé.

Distribué par :
Bio Agri Mix LP
P.O. Box 399
Mitchell, ON N0K 1N0
www.bioagrimix.com

NO. DE LOT :

DATE DE FABRICATION :

DATE D'EXPIRATION :

9914013 102-8335-01

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM