

Vial Label

Main panel:

Sterile/Stérile

DIN XXXXXXXX

 **ATAJECT™**

Atipamezole Hydrochloride Injection, 5.0 mg/mL
Solution injectable de chlorhydrate d'atipamézole 5,0 mg/mL

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

Dexmedetomidine and Medetomidine Reversing Agent
Agent d'inversion de la dexmédétomidine et de la médétomidine

For IM administration in dogs
Pour administration IM chez les chiens

10 mL

Left side panel:

See package insert for complete directions for use
Voir la notice pour les directives d'utilisation complètes.

^{TM/MC}Grey Wolf Animal Health Inc.
Toronto, ON M5E 1B5

Right side panel:

LOT:
EXP.:

Carton Label

Main panel - English

Sterile
DIN XXXXXXXXX

10 mL

 **ATAJECT™**

Atipamezole Hydrochloride Injection, 5.0 mg/mL

Veterinary Use Only

Dexmedetomidine and Medetomidine Reversing Agent

For intramuscular administration in dogs

Warnings: Keep out of reach of children.

See also package insert.

Grey Wolf Animal Logo

Back panel - French

Stérile
DIN XXXXXXXXX

10 mL

Usage vétérinaire seulement

 **ATAJECT^{MC}**

Solution njectable de chlorhydrate d'atipamézole 5,0 mg/mL

Agent d'inversion de la dexmédétomidine et de la médétomidine

Pour administration intramusculaire chez les chiens

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants.

Consulter également la notice d'accompagnement.

Grey Wolf Animal Logo

Side panel 1:

Active ingredients: Atipamezole HCl 5.0 mg/mL

Preservative: Methylparaben 1 mg/mL

Indications: Ataject is indicated for the reversal of the clinical effects of the sedative and analgesic agents dexmedetomidine hydrochloride and medetomidine hydrochloride, in dogs.
See package insert for complete product information.

Storage: Store at 15-30°C. Keep from freezing. Discard any remaining product after 28 days.

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street E., Suite 201
Toronto, ON M5E 1B5
1-844-400-GWAH (4924)

Side panel 2:

Ingrédients actifs : chlorhydrate d'atipamézole 5,0 mg/mL

Agent de conservation : méthylparabène 1 mg/mL

Indications : Ataject est indiqué pour l'inversion des effets cliniques de chlorhydrate de dexmédétomidine et de chlorhydrate de médétomidine, deux agents sédatifs et analgésiques, chez les chiens.
Voir la notice pour l'information complète sur le produit.

Entreposage : Conserver entre 15 °C et 30 °C. Protéger du gel. Jeter toute portion du produit inutilisée après 28 jours.

TM Trademark Grey Wolf Animal Health Inc.

^{MC}marque de commerce de Grey Wolf Animal Health Inc.

Bottom Panel:

LOT:

EXP.:

Package Insert - English

Sterile


DIN XXXXXXXX

 **ATAJECT™**

Atipamezole Hydrochloride injection, 5.0 mg/mL

Veterinary Use Only

DESCRIPTION: Ataject (atipamezole hydrochloride) is a synthetic α 2-adrenergic antagonist which reverses the effects of dexmedetomidine hydrochloride and medetomidine hydrochloride in dogs. The chemical name is 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole hydrochloride. The molecular formula is C₁₄H₁₆N₂ • HCl and the structural formula is:



Each mL of Ataject contains 5.0 mg atipamezole hydrochloride as the medicinal ingredient, 1.0 mg methylparaben as the preservative, 8.5 mg sodium chloride, and water for injection.

INDICATIONS: Ataject is indicated for the reversal of the clinical effects of the sedative and analgesic agents dexmedetomidine hydrochloride and medetomidine hydrochloride, in dogs.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Ataject is administered intramuscularly regardless of the route used for dexmedetomidine hydrochloride or medetomidine hydrochloride. The concentration of Ataject has been formulated such that the volume of injection is the same (mL for mL) as the recommended dose volume of dexmedetomidine hydrochloride or medetomidine hydrochloride, and may be given at any time following their administration. Although injection volumes are the same, the concentration of Ataject (5.0 mg/mL) is 10 times that of dexmedetomidine hydrochloride (0.5 mg/mL) and 5 times that of medetomidine hydrochloride (1.0 mg/mL). Dogs that are sedated but ambulatory may be treated with Ataject, if warranted.

The dosage of Ataject is calculated based on body surface area. Use the following tables to determine the proper injection volume based on bodyweight. Note that the mcg/kg dosage decreases as bodyweight increases.

Table 1: Atipamezole dosing for reversal of IV dexmedetomidine- or medetomidine-induced sedation/analgesia:

Dose table for Ataject when dexmedetomidine or medetomidine is given IV		
Bodyweight (kg)	Dose = mcg/kg	Volume = mL Ataject
2-2.9	300	0.1
3-3.9	250	0.15
4-4.9	230	0.2
5-9.9	200	0.3
10-14.9	170	0.4
15-19.9	150	0.5
20-24.9	140	0.6
25-29.9	130	0.7
30-36.9	120	0.8
37-44.9	110	0.9
45-49.9	105	1.0
50-59.9	100	1.1
60-64.9	95	1.2

65-74.9	93	1.3
75-79.9	91	1.4
>80	90	1.5

Table 2: Atipamezole dosing for reversal of IM dexmedetomidine- or medetomidine-induced sedation/analgesia:

Dose table for Ataject when dexmedetomidine or medetomidine is given IM		
Bodyweight (kg)	Dose = mcg/kg	Volume = mL Ataject
2-2.9	400	0.15
3-3.9	350	0.2
4-4.9	300	0.3
5-9.9	250	0.4
10-12.9	230	0.5
13-14.9	210	0.6
15-19.9	200	0.7
20-24.9	180	0.8
25-29.9	170	0.9
30-32.9	160	1.0
33-36.9	150	1.1
37-44.9	145	1.2
45-49.9	140	1.3
50-54.9	135	1.4
55-59.9	130	1.5
60-64.9	128	1.6
65-69.9	125	1.7
70-79.9	123	1.8
>80	120	1.9

CAUTIONS: Ataject can produce an abrupt reversal of sedation and, presumably, analgesia. The potential for apprehensive or aggressive behavior should be considered in the handling of dogs emerging from sedation, especially those animals who are likely to be in pain.

Information on use of atipamezole with concurrent drugs is inadequate, therefore caution should be exercised when administering multiple drugs. Animals should be monitored closely, particularly for persistent hypothermia, bradycardia, and depressed respiration, until they have recovered completely. Caution should be used in administration of anesthetic agents to elderly or debilitated animals.

While atipamezole does reverse the clinical signs associated with dexmedetomidine or medetomidine sedation, complete physiologic return to pretreatment status may not be immediate and should be monitored.

Ataject has not been evaluated in breeding animals; therefore, the drug is not recommended for use in pregnant or lactating animals, or in animals intended for breeding.

NOTE TO USERS: Care should be taken to assure that Ataject is not inadvertently ingested, as safety studies have indicated that the drug is absorbed when administered orally. As with all injectable drugs causing profound physiological effects, routine precautions should be employed when handling and using filled syringes, including washing eye and skin areas affected by accidental spillage. In case of accidental human exposure, a physician should be contacted.

WARNINGS: Keep out of reach of children.

SIDE EFFECTS: Occasional vomiting may occur. Rarely, a brief state of excitement or apprehensiveness may be seen in treated dogs. Other potential side effects of α 2-antagonists include hypersalivation, diarrhea, and tremors.

OVERDOSAGE: Atipamezole was tolerated in healthy dogs receiving doses 10-fold the recommended dose and in dogs receiving repeated doses at 1-, 3-, and 5-fold doses, in the absence of an α 2-antagonist. Signs of overdose were dose-related and consistent with those expected in non-sedated dogs having received a stimulant. Signs seen at elevated doses included excitement, panting, trembling, vomiting, soft or liquid feces or vasodilation (injection) of the sclera. Some localized skeletal muscle injury was seen at the injection site; but no associated clinical signs or complications were observed. Dogs receiving the proper dose in the absence of dexmedetomidine or medetomidine, or 3-fold overdose after dexmedetomidine or medetomidine sedation, exhibited no significant clinical signs.

CLINICAL PHARMACOLOGY: Activation of peripheral and central α 2-adrenergic receptors is known to induce a pattern of pharmacological responses including sedation, reduction of anxiety, analgesia, bradycardia, and transient hypertension with subsequently reduced blood pressure. Atipamezole is a potent α 2-antagonist which selectively and competitively inhibits α 2-adrenergic receptors. The result of atipamezole administration in the dog is the rapid recovery from the sedation and other clinical effects produced by the α 2-adrenergic agonists, dexmedetomidine and medetomidine. Atipamezole is not expected to reverse the effects of other classes of sedatives, anesthetics, or analgesics.

Rapid absorption occurs following intramuscular injection, with a maximum serum concentration reached in approximately 10 minutes. Onset of arousal is usually apparent within 5 to 10 minutes of injection, depending on the depth and duration of dexmedetomidine- or medetomidine-induced sedation. Elimination half-life from serum is less than 3 hours. Atipamezole undergoes extensive hepatic biotransformation, with excretion of metabolites primarily in urine.

A transient, approximately 10%, decrease in systolic blood pressure occurs immediately after administration of atipamezole to dexmedetomidine- or medetomidine-sedated dogs, followed by an increase in pressure within 10 minutes to the pre-atipamezole level. This is the opposite of the response to α 2-agonist therapy, and is probably due to peripheral vasodilatation.

Atipamezole will produce a rapid improvement in dexmedetomidine- or medetomidine-induced bradycardia. An increase in heart rate is usually apparent within approximately 3 minutes of injection, but approximately 40% of dogs are not expected to immediately return to presedative rate. Some dogs may experience brief heart rate elevations above baseline. Respiratory rate also increases following atipamezole injection.

STORAGE: Store at 15-30°C. Keep from freezing. Discard any remaining product after 28 days.

PRESENTATION: Ataject is supplied in cartons of one 10 mL clear glass vial.

Date of preparation: July 2019

™ Grey Wolf Animal Health Inc.

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street E., Suite 201
Toronto, ON M5E 1B5
1-844-400-GWAH (4924)

Grey Wolf Logo

Package Insert - French

Stérile


DIN XXXXXXXX

Usage vétérinaire seulement

 **ATAJECT™**

Solution injectable de chlorhydrate d'atipamézole 5,0 mg/mL

DESCRIPTION : Ataject (chlorhydrate d'atipamézole) est un antiadrénergique- α_2 de synthèse qui inverse les effets de chlorhydrate de dexmédétomidine et de chlorhydrate de médétomidine chez les chiens. Son nom chimique est chlorhydrate de 4-(2-éthyle-2,3-dihydro-1H-indène-2-yl)-1H-imidazole. Sa formule moléculaire est $C_{14}H_{16}N_2 \cdot HCl$, et sa structure chimique est:



Chaque mL d'Ataject contient 5,0 mg de chlorhydrate d'atipamézole comme ingrédient médicinal, 1,0 mg de paraoxybenzoate de méthyle comme agent de conservation, 8,5 mg de chlorure de sodium et l'eau nécessaire à l'injection.

INDICATIONS : Ataject est indiqué pour l'inversion des effets cliniques du chlorhydrate de dexmédétomidine et du chlorhydrate de médétomidine, deux agents sédatifs et analgésiques, chez les chiens.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Ataject est administré par voie intramusculaire, indépendamment de la voie d'administration du chlorhydrate de dexmédétomidine ou du chlorhydrate de médétomidine. La concentration d'Ataject est telle que le volume de l'injection est le même (mL pour mL) que le volume de la dose recommandée du chlorhydrate de dexmédétomidine ou du chlorhydrate de médétomidine, et qu'il peut être administré à n'importe quel moment après l'injection du chlorhydrate de dexmédétomidine ou du chlorhydrate de médétomidine. Bien que les volumes soient identiques, la concentration d'Ataject (5,0 mg/mL) est 10 fois supérieure à celle du chlorhydrate de dexmédétomidine (0,5 mg/mL) et 5 fois supérieure à celle du chlorhydrate de médétomidine (1,0 mg/mL). Les chiens encore sous sédation mais ambulatoire à la suite d'une intervention peuvent être traités avec Ataject, si cela s'avère justifié.

La posologie d'Ataject est en fonction de la surface corporelle. Utiliser les tableaux suivants pour déterminer le volume d'injection nécessaire, selon le poids de l'animal. Il est important de noter que plus le poids corporel augmente, plus la dose en mcg/kg diminue.

Tableau 1 : Dose d'atipamézole pour l'inversion de la sédation/analgésie induite par la médétomidine ou la dexmédétomidine administrée par voie IV :

Tableau posologique pour Ataject quand la dexmédétomidine ou la médétomidine est administrée par voie IV		
Poids corporel (kg)	Dose = mcg/kg	Volume = mL d'Ataject
2-2,9	300	0,1
3-3,9	250	0,15
4-4,9	230	0,2
5-9,9	200	0,3
10-14,9	170	0,4
15-19,9	150	0,5
20-24,9	140	0,6
25-29,9	130	0,7
30-36,9	120	0,8

37-44,9	110	0,9
45-49,9	105	1,0
50-59,9	100	1,1
60-64,9	95	1,2
65-74,9	93	1,3
75-79,9	91	1,4
>80	90	1,5

Tableau 2 : Dose d'atipamézole pour l'inversion de la sédation/analgésie induite par la médétomidine ou la dexmédétomidine administrée par voie IM :

Tableau posologique pour Ataject quand la dexmédétomidine ou la médétomidine est administrée par voie IM		
Poids corporel (kg)	Dose = mcg/kg	Volume = mL d'Ataject
2-2,9	400	0,15
3-3,9	350	0,2
4-4,9	300	0,3
5-9,9	250	0,4
10-12,9	230	0,5
13-14,9	210	0,6
15-19,9	200	0,7
20-24,9	180	0,8
25-29,9	170	0,9
30-32,9	160	1,0
33-36,9	150	1,1
37-44,9	145	1,2
45-49,9	140	1,3
50-54,9	135	1,4
55-59,9	130	1,5
60-64,9	128	1,6
65-69,9	125	1,7
70-79,9	123	1,8
>80	120	1,9

PRÉCAUTIONS : Ataject peut produire une brusque inversion de la sédation et, vraisemblablement, de l'analgésie. Lors de la manipulation des chiens en période de réveil, on doit tenir compte des risques de comportement agité ou agressif, particulièrement chez les sujets qui peuvent ressentir de la douleur.

L'information concernant l'utilisation concomitante de l'atipamézole et d'autres drogues étant insuffisante, l'administration de plusieurs médicaments à la fois doit être envisagée avec prudence. Les sujets doivent être étroitement surveillés jusqu'à récupération complète, de façon à déceler, notamment, tout signe persistant d'hypothermie, de bradycardie et de diminution de la fréquence respiratoire. Un anesthésique devrait toujours être administré avec prudence à un animal âgé ou affaibli.

Bien que l'atipamézole inverse les effets cliniques associés à la sédation induite par la dexmédétomidine ou la médétomidine, il est possible que le retour complet à l'état physiologique initial ne soit pas immédiat. Les animaux devraient donc être gardés sous observation pendant la période de récupération.

Ataject n'a pas été évalué chez les animaux de reproduction; par conséquent, l'utilisation du médicament n'est pas recommandée chez les animaux en gestation ou en lactation, ni chez les sujets destinés à la reproduction.

AVIS AUX UTILISATEURS : Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour s'assurer qu'Ataject n'est pas ingéré par mégarde; en effet, les études d'innocuité indiquent que le médicament est absorbé lorsque administré par voie orale. Comme avec tout médicament injectable provoquant des effets physiologiques profonds, les précautions de routine doivent être respectées pendant la manipulation et l'utilisation de seringues pleines. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver les régions atteintes. Dans le cas où une personne serait accidentellement exposée au produit, communiquer avec un médecin.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants.

EFFETS SECONDAIRES : Des vomissements peuvent parfois être observés. Dans de rares cas, on peut observer une courte période d'excitation et d'agitation chez les chiens traités. Parmi les autres effets secondaires possibles des antagonistes- α_2 , on note l'hypersalivation, la diarrhée et les tremblements.

SURDOSAGE : Des chiens en santé ont toléré des doses d'atipamézole 10 fois supérieures à la dose recommandée et des doses répétées de 1, 3 et 5 fois la dose recommandée, en l'absence d'agoniste- α_2 . Les signes de surdosage ont été reliés à la dose et reconnus conformes à ceux attendus chez des chiens ayant reçu un stimulant en l'absence de sédatif. Parmi les signes observés aux doses élevées, on a noté l'excitation, le halètement, les tremblements, les vomissements, les fèces molles ou liquides et la vasodilatation (injection) des sclères. Certains dommages localisés aux muscles squelettiques ont été notés au site d'injection; toutefois, aucun signe clinique associé ni complication n'a été observé. Les chiens qui ont reçu la dose appropriée en l'absence de dexmédétomidine ou de médétomidine, ou une dose 3 fois supérieure après un traitement à la dexmédétomidine ou à la médétomidine, n'ont présenté aucun signe clinique significatif.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE : Il a été démontré que la stimulation des récepteurs adrénérgiques- α_2 centraux et périphériques déclenche un schéma de réponses pharmacologiques incluant la sédation, une diminution de l'anxiété, une analgésie, une bradycardie et une hypertension passagère suivie d'une baisse de la pression sanguine. L'atipamézole est un antagoniste- α_2 puissant qui inhibe de façon sélective et compétitive les récepteurs adrénérgiques- α_2 . L'administration d'atipamézole chez le chien permet la récupération rapide de la sédation et des autres effets cliniques produits par la dexmédétomidine et la médétomidine, deux agonistes des récepteurs adrénérgiques- α_2 . L'atipamézole ne devrait pas inverser les effets d'autres classes de sédatifs, d'anesthésiques ou d'analgésiques.

Le produit est rapidement absorbé à la suite de l'injection intramusculaire, et la concentration sérique atteint son pic en 10 minutes environ. Les premiers signes de réveil apparaissent habituellement 5 à 10 minutes après l'injection, selon le degré de profondeur et la durée de la sédation induite par la dexmédétomidine ou la médétomidine. Le temps de demi-vie d'élimination sérique est inférieur à 3 heures. L'atipamézole subit une importante biotransformation dans le foie, à la suite de laquelle des métabolites sont excrétés principalement dans l'urine.

Une diminution passagère d'environ 10 % de la pression artérielle systolique survient immédiatement après l'administration d'atipamézole à des chiens traités à la dexmédétomidine ou à la médétomidine; la pression revient ensuite en moins de 10 minutes à sa valeur initiale précédant l'injection d'atipamézole. Il s'agit de la réponse contraire au traitement d'agoniste- α_2 , et elle est probablement due à une vasodilatation périphérique.

L'atipamézole produit une amélioration rapide de la bradycardie induite par la dexmédétomidine ou la médétomidine. Une augmentation de la fréquence cardiaque est généralement observée moins de 3 minutes environ après l'injection, mais, chez approximativement 40 % des chiens, on ne doit pas s'attendre à ce qu'elle revienne immédiatement à sa valeur initiale d'avant la sédation. Certains sujets peuvent présenter de brefs épisodes d'élévation de la fréquence cardiaque supérieure à la valeur initiale de base. La fréquence respiratoire augmente également à la suite de l'injection d'atipamézole.

ENTREPOSAGE : Conserver entre 15 °C et 30 °C. Protéger du gel. Jeter toute portion du produit inutilisée après 28 jours.

PRÉSENTATION : Ataject est présenté dans des flacons en verre clair d'un volume de 10 mL.

Date de préparation : Juillet 2019

^{MC} Grey Wolf Animal Health Inc.

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street E., Suite 201
Toronto, ON M5E 1B5
1-844-400-GWAH (4924)

Grey Wolf Logo