

Vial Label

VITAMIN AD₃ Forte

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

Active ingredients (per mL): 500,000 IU vitamin A (as palmitate) (BP) and 75,000 IU Vitamin D₃

Non-medicinal ingredients (per mL):

Vitamin E (antioxidant) and soya bean oil

Indications: As an aid in the prevention and treatment of vitamin A and D deficiencies in cattle, horses, sheep and swine.

Dosage and Administration: Administer by single intramuscular injection using aseptic technique.

Adult animals: 0.5-1 mL per 100 kg of body weight

Breeding animals: 0.5 mL per 100 kg of body weight

Young animals: 1 mL per 50 kg of body weight

Repeat once a month if necessary.

Caution: In case of anaphylactic reaction, administer epinephrine immediately. If deficiency symptoms persist, consult your veterinarian.

Warnings: Keep out of reach of children. No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label.

Storage: Store at temperature of 15-25°C. Refrigerate (2-8°C) partially used vial. Protect from light. Do not freeze.

DIN 02248547

Imported and distributed by/Importé et distribué par :
Rafter 8 Products
87 Skyline Crescent N.E., Calgary, Alberta T2K 5X2

50 mL (or 100 mL or 250 mL)

Vitamin A and D₃ injection

Vitamines A et D₃ injectables

Sterile

Stérile

Ingrédients actifs (par mL) : 500 000 UI de vitamine A (sous forme de palmitate) (BP) et 75 000 UI de vitamine D₃

Ingrédients non-médicinaux (par mL) :

vitamine E (comme antioxydant) et huile de fève de soya

Indications : Comme aide à la prévention et au traitement des carences en vitamines A et D chez les bovins, les chevaux, les moutons et les porcs.

Posologie et mode d'administration : Administrer par injection intramusculaire unique en suivant une technique d'asepsie.

Animaux adultes : 0,5 à 1 mL par 100 kg de poids corporel

Animaux reproducteurs : 0,5 mL par 100 kg de poids corporel

Jeunes adultes : 1 mL par 50 kg de poids corporel

Répéter une fois par mois au besoin.

Précautions : En case de réaction anaphylactique, administrer immédiatement de l'épinéphrine. Si les symptômes de carence persistent, consulter un vétérinaire.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requise quand utilisé selon les directives de l'étiquette.

Entreposage : Garder à une température de 15-25°C. Réfrigérer (2-8°C) les flacons partiellement utilisés. Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

Alfasan International B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, The Netherlands