

1 **Experior™10**
2 **10 kg Bag Label**

3 **Front Panel**

4 Elanco™

AFXXXX

5 **Experior™10**
6 **Lubabegron Premix (as Lubabegron Fumarate)**

7 Net Weight: 10 kg
8 DIN 02482061

9 FOR VETERINARY USE ONLY
10 FOR USE IN FEEDS FOR CATTLE FED IN CONFINEMENT FOR SLAUGHTER ONLY

11
12 **ACTIVE INGREDIENT:**

13 Lubabegron (as Lubabegron Fumarate).....10 g per kg
14

15 **INDICATIONS:**

16 For reduction of ammonia gas emissions per kilogram of live weight and hot carcass
17 weight in beef steers and heifers fed in confinement for slaughter during the last 14 to
18 91 days on feed.

19 Effectiveness has not been demonstrated when fed for less than 14 days.

20
21 Ammonia gas emissions were measured for individual animals or small groups of
22 animals held in environmentally controlled facilities. Based on existing information,
23 reliable predictions of the reduction of ammonia gas emissions cannot be made on a
24 herd, farm, or larger scale.

25
26 Increased rate of weight gain, improved feed efficiency, and increased carcass
27 leanness have not been demonstrated with this product.

28
29
30 **Note:**

31 Lubabegron may contribute to decreased marbling scores when fed for the maximum
32 duration of 91 days.

33
34 **DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

35 Administer at a dietary concentration of 1.5 to 5.5 grams of lubabegron per tonne of
36 feed (1.5 to 5.5 ppm), on a 100% dry matter basis.

37
38 **IMPORTANT:**

- 39 1. For use in manufactured feeds only.
40 2. Must be thoroughly mixed in feeds before use.
41 3. Do not feed undiluted.
42 4. Do not feed as top dressing.

43
44 **MIXING DIRECTIONS:**

45 Thoroughly mix 150 g to 550 g of Experior 10 premix per tonne (1,000 kg) of complete
46 feed (100% dry matter basis) to obtain a concentration of 1.5 to 5.5 g/tonne (1.5 to 5.5

47 ppm) of lubabegron in the feed. To ensure adequate mixing, an intermediate blending
48 step should be performed prior to manufacturing a complete feed.
49

50 **FEEDING DIRECTIONS:**

51 Feed continuously to beef steers and heifers fed in confinement for slaughter as the
52 sole ration during the last 14 to 91 days prior to slaughter.
53

54 **WARNINGS:**

- 55 1. No withdrawal period is required in beef cattle when treated according to the label.
- 56 2. Do not use in calves to be processed for veal.
- 57 3. Do not use in lactating dairy cattle.
- 58 4. The active ingredient in Experior 10, lubabegron, is a selective beta-adrenergic
59 modulator (agonist and antagonist). Individuals with cardiovascular disease should
60 exercise special caution to avoid exposure.
- 61 5. Experior 10 poses a low dust potential under usual conditions of handling and
62 mixing. When mixing and handling Experior 10, avoid inhalation, oral exposure and
63 direct contact with eyes or skin. Use protective clothing, impervious gloves and an
64 approved dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after
65 handling.
- 66 6. If accidental eye or skin contact occurs, immediately rinse thoroughly with water; if
67 wearing contact lenses, rinse eyes first, then remove contact lenses and continue to
68 rinse for 5-20 minutes. If irritation persists, seek medical attention.
- 69 7. Not for use in humans.
- 70 8. Keep out of reach of children.

71
72 **CAUTIONS:**

- 73 1. Do not use in animals intended for breeding because safety and effectiveness have
74 not been evaluated in these animals.
- 75 2. Do not use concurrently with beta-adrenergic agonists such as ractopamine and
76 zilpaterol.
- 77 3. Do not allow horses or other equines access to feed containing Experior 10.
- 78 4. A decrease in dry matter intake may be noticed in some animals.

79
80 **ADVERSE REACTIONS:**

81 To report suspected adverse drug events or for technical assistance, contact Elanco at
82 1-800-265-5475.
83

84 **STORAGE:**

85 Store at or below 25°C. Excursions permitted to 30°C.
86

87 Experior, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.
88

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2

<TAKE TIME OBSERVE LABEL
DIRECTIONS SYMBOL>

89 LOT:

90 EXP:

91 **Back Panel**

92 Elanco™

AFXXXX

93 **Experior™10**

94 **Prémélange de lubabégron (sous forme de fumarate de lubabégron)**

95 Poids net : 10 kg

96 DIN 02482061

97 POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

98 POUR USAGE SEULEMENT DANS LES ALIMENTS DES BOVINS DE BOUCHERIE

99 ÉLEVÉS EN PARC D'ENGRAISSEMENT ET DESTINÉS À L'ABATTAGE

100

101 **INGRÉDIENT ACTIF**

102 Lubabégron (sous forme de fumarate de lubabégron).....10 g par kg

103

104 **INDICATIONS :**

105 Pour réduire les émissions de gaz d'ammoniac par livre de poids vif et de poids de

106 carcasse chaude chez les génisses et les bouillons de boucherie élevés en parc

107 d'engraissement durant les 14 à 91 derniers jours avant l'abattage.

108

109 L'efficacité du produit administré pendant moins de 14 jours n'a pas été démontrée.

110

111 Les émissions de gaz d'ammoniac ont été mesurées chez certains animaux ou petits

112 groupes d'animaux dans des établissements à environnement contrôlé. D'après les

113 données actuelles, il n'est pas possible de prédire de manière fiable la réduction des

114 émissions de gaz d'ammoniac à l'échelle du troupeau ou de la ferme ou à plus grande

115 échelle.

116

117 Il n'a pas été démontré que ce produit augmente le gain de poids, la conversion

118 alimentaire et la teneur en viande maigre de la carcasse.

119

120 **Remarque :**

121 Le lubabégron peut contribuer à une diminution du taux de persillage lorsqu'il est

122 administré pendant la durée maximale de 91 jours.

123

124 **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :**

125 Administrer de manière à obtenir une concentration dans la ration de 1,5 à 5,5 g de

126 lubabégron par tonne d'aliments (de 1,5 à 5,5 ppm), sur une base de 100 % de matière

127 sèche.

128

129 **IMPORTANT :**

130 1. Pour ajout aux rations commerciales seulement.

131 2. Doit être mélangé soigneusement à la ration.

132 3. Ne pas administrer tel quel, non mélangé aux aliments.

133 4. Ne pas saupoudrer sur les aliments.

134

135 **PRÉPARATION :**

136 Mélanger soigneusement de 150 à 550 g de prémélange Experior 10 par tonne

137 (1000 kg) d'aliments complets (base de 100 % de matière sèche) pour obtenir une

138 concentration de 1,5 à 5,5 g de lubabégron par tonne d'aliments (de 1,5 à 5,5 ppm).
139 Pour assurer un mélange adéquat, une étape intermédiaire de mélange doit être
140 effectuée avant la préparation des aliments complets.

141

142 **ADMINISTRATION :**

143 Donner sans interruption la ration contenant le produit comme seul aliment aux
144 génisses et aux bouvillons de boucherie élevés en parc d'engraissement durant les 14
145 à 91 derniers jours précédant l'abattage.

146

147 **MISES EN GARDE :**

- 148 1. Aucune période de retrait n'est nécessaire chez les bovins de boucherie traités
149 conformément aux directives de l'étiquette.
- 150 2. Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau.
- 151 3. Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation.
- 152 4. L'ingrédient actif d'Experior 10, le lubabégron, est un modulateur sélectif
153 bêta-adrénergique (agoniste/antagoniste). Les personnes ayant une maladie
154 cardiovasculaire doivent prendre des précautions particulières pour éviter d'être
155 exposées au produit.
- 156 5. Experior 10 risque peu de produire de la poussière dans les conditions usuelles de
157 manipulation et de mélange. Lors de la manipulation et du mélange d'Experior 10,
158 éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec les yeux ou la peau.
159 Porter des vêtements protecteurs, des gants imperméables et un masque
160 antipoussière approuvé. Il convient de bien se laver les mains avec de l'eau et du
161 savon après avoir manipulé le produit.
- 162 6. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à
163 grande eau. En cas de port de lentilles cornéennes, rincer d'abord les yeux, enlever
164 ensuite les lentilles cornéennes, et continuer de rincer les yeux pendant de 5 à
165 20 minutes additionnelles. Si une irritation persiste, consulter un médecin.
- 166 7. Ne pas utiliser chez l'humain. Garder hors de la portée des enfants.

167

168 **PRÉCAUTIONS :**

- 169 1. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction, car l'innocuité et
170 l'efficacité du produit n'ont pas été évaluées chez ces animaux.
- 171 2. Ne pas utiliser en concomitance avec des agonistes bêta-adrénergiques tels que la
172 ractopamine et le zilpatérol.
- 173 3. Ne pas laisser les chevaux ou les autres équidés avoir accès à des aliments
174 contenant Experior 10.
- 175 4. Une diminution de la consommation volontaire de matière sèche peut être observée
176 chez certains animaux.

177

178 **RÉACTIONS INDÉSIRABLES :**

179 Pour signaler tout effet indésirable soupçonné du produit ou pour obtenir un soutien
180 technique, appeler Elanco au 1-800-265-5475.

181

182 **ENTREPOSAGE :**

183 Entreposer à une température de 25 °C ou moins. Des écarts jusqu'à 30 °C sont

184 permis.

185

186 Experior, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou de
187 ses sociétés affiliées.

188

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2

< PRENEZ LE TEMPS
LISEZ L'ÉTIQUETTE >

189