

Package Insert

DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX



EVICTO®

selamectin topical solution

Veterinary Use Only

Topical Parasiticide for Dogs and Cats

Active ingredient: Selamectin is a semi-synthetic compound of the avermectin class.

Product Description: Evicto topical solution is available as a colourless to yellow, ready to use solution in single dose tubes for topical (dermal) treatment of dogs and cats not less than six weeks of age. The content of each tube is formulated to provide a minimum of 6 mg/kg of body weight of selamectin.

Indications: DOGS: For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. **Evicto** topical solution is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations. **CATS:** For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) and ear mite (*Otodectes cynotis*) infestations, intestinal hookworm (*Ancylostoma tubaeforme*) and roundworm (*Toxocara cati*) infections, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*.

Dosage: **Evicto** topical solution is applied topically to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg selamectin per kg of body weight, once a month.

Administer **Evicto** topical solution in accordance with the following tables:

Cats (kg)	mg per tube	Potency (mg/mL)	Administered volume (nominal tube sizes- mL)
≤2.5	15 mg	60	0.25
2.6-7.5	45 mg	60	0.75
7.6-10.0	60 mg	60	1.0
>10.0	Appropriate combination of tubes	60	Appropriate combination of tubes

Dogs (kg)	mg per tube	Potency (mg/mL)	Administered volume (nominal tube sizes- mL)
≤2.5	15 mg	60	0.25
2.6-5.0	30 mg	120	0.25
5.1-10.0	60 mg	120	0.5
10.1-20.0	120 mg	120	1.0
20.1-40.0	240 mg	120	2.0
40.1-60.0	360 mg	120	3.0
>60	Appropriate combination of tubes	120	Appropriate combination of tubes

Administration:

Depress the cap to puncture the seal on the **Evicto** topical solution tube; then remove the cap to administer product.

Administer the product directly to the skin without massaging into the site. Part the hair on the back of the animal in front of the shoulder blades until the skin is visible. Place the tip of the tube on the skin and squeeze the tube to empty its entire contents directly onto the skin in one spot.

Avoid contact between the product and fingers. Do not apply when the hair coat is wet. Bathing or shampooing the animal 2 or more hours after treatment will not reduce the efficacy of **Evicto** topical solution. Discard the used tubes in the household trash.

Contraindications:

Do not use in sick, debilitated or underweight animals.

Cautions:

Evicto topical solution may be safely administered to heartworm infected dogs and cats,

however, it is recommended, in accordance with good veterinary practice, that all dogs ≥ 6 months of age be tested for existing heartworm infections before beginning medication with

Evicto topical solution. Cats ≥ 6 months of age in heartworm endemic areas may also be tested to determine the presence of existing heartworm infections before beginning medication with **Evicto** topical solution.

Evicto topical solution is not effective against adult *D. immitis*; however it may decrease the number of circulating microfilariae.

Evicto topical solution should be used in animals of six or more weeks of age.

Warnings: Keep out of the reach of children.

31OCT2019 – Virbac AH

May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, then flush eyes copiously with water. In case of ingestion by a human, contact a physician immediately.

Adverse Reactions:

The following adverse events are based on voluntary post-approval global adverse drug experience reporting (excluding European countries). Not all adverse events are reported. It is not always possible to reliably estimate the adverse event frequency or establish a causal relationship to product exposure using this data.

The following adverse events are listed in decreasing order of reporting frequency:

- **CATS:** application site hair change, lack of expected efficacy, lethargy, anorexia, emesis, application site pruritus or lesion or erythema, diarrhea, ataxia and death. Product causality could not be confirmed in the majority of cases with fatal outcome.
- **DOGS:** lack of expected efficacy, emesis, lethargy, diarrhea, anorexia, pruritus, convulsion, application site hair change, ataxia and muscle tremor. As with other macrocyclic lactones, the reversible neurological signs listed have been very rarely observed after the use of selamectin.

In the majority of lack of expected efficacy reports the product causality could not be confirmed. Owner's compliance and strict adherence to the product's dosage, treatment schedule and duration as well as consideration of specific parasite biology are of utmost importance in insuring success in parasite treatment and/or prevention.

Collies and other herding breeds are known to be more sensitive to the macrocyclic lactone class of medications. Signs of toxicity that can be seen with overdose include: depression, hypersalivation, tremor and ataxia.

Although adverse reactions may occur with use of any pharmaceutical product, it is recommended that any sign of new illness observed during the treatment with Evicto is thoroughly investigated.

Efficacy

Flea Control in Dogs and Cats

If the dog or cat is already infested with fleas when the first dose of **Evicto** topical solution is administered, then adult fleas on the animal are killed and no viable flea eggs are produced after the first administration. This stops flea reproduction. An environmental infestation of fleas may persist for a short time after beginning treatment with **Evicto** topical solution because of the emergence of adult fleas from pupae. However, large reductions in flea infestations are observable after just one monthly treatment as flea larvae in the animal surroundings are killed or prevented from developing to adults by treatment with **Evicto** topical solution.

For the lasting control of flea infestations, **Evicto** topical solution should be administered at monthly intervals throughout the flea season, starting one month before fleas become active. This ensures that fleas infesting the animal are killed and that no viable flea eggs are produced by these fleas. This breaks the flea life cycle and controls flea infestations. Results of clinical field efficacy studies using **selamectin** topical solution monthly demonstrated control of flea infestations and improved the clinical manifestation of flea infestations, including flea allergy dermatitis.

Heartworm Prevention in Dogs and Cats

For the prevention of heartworm disease, **Evicto** topical solution must be administered on a monthly basis. **Evicto** topical solution may be administered year-round or at least within one month after the animal's first exposure to mosquitoes and monthly thereafter until the end of the mosquito season. The final dose must be given within one month after the last exposure to mosquitoes. If a dose is missed and a monthly interval between dosing is exceeded then immediate administration of **Evicto** topical solution and resumption of monthly dosing will minimize the opportunity for the development of adult heartworms. When replacing another heartworm preventive product in a heartworm disease prevention program, the first dose of **Evicto** topical solution must be given within a month of the last dose of the former medication.

Ear Mite Treatment in Dogs and Cats

For the elimination of ear mites (*O. cynotis*) in dogs and cats, **Evicto** topical solution should be administered once as a single dose. A second monthly dose of **Evicto** topical solution may be required to eliminate mites in some dogs. Monthly use of **Evicto** topical solution will treat any subsequent ear mite infestations. Many animals treated for otocariasis have concurrent *otitis externa* involving secondary yeast or bacterial infections. *O. cynotis* causes primary inflammation and pruritus of the external ear canal and predisposes to these secondary infections. Therefore, cats and dogs with otocariasis complicated by secondary yeast and/or bacterial infections may require supportive therapy in addition to treatment with **Evicto** topical solution. Cleansing of the infested ears is recommended to remove the debris.

Nematode Treatment in Dogs and Cats

For the treatment and control of intestinal hookworm (*A. tubaeforme*) and roundworm (*T. cati*) infections in cats, **Evicto** topical solution should be applied once as a single treatment, and monthly thereafter to control infections.

As an aid in the treatment of intestinal roundworm (*T. canis*) infections in dogs, administer two monthly treatments, and monthly thereafter to control infections.

Sarcoptic Mange Treatment in Dogs

A single dose of **Evicto** topical solution is safe and highly efficacious against natural infestations of *S. scabiei* in dogs, however, for complete eradication two doses may be required. Monthly use of **Evicto** topical solution will treat any subsequent *Sarcoptes* mite infestations.

Tick Treatment in Dogs

For tick (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*) infestations, **Evicto** Topical Solution should be administered on a monthly basis. In heavy tick infestations, adequate efficacy may not be achieved after the first dose. In these cases, one additional dose may be administered two weeks after the previous dose, with monthly dosing continued thereafter.

Animal Safety:

DOGS: **Selamectin** topical solution has been tested with no adverse reactions in dogs of over 100 different pure and mixed breeds including Collies, and in pregnant and lactating females, breeding males and females, and puppies six weeks of age and older. **Selamectin** topical solution was administered at 10 times the recommended dose, and no adverse effects were observed.

Selamectin topical solution was also administered at 3 times the recommended dose to heartworm infected dogs, and no adverse effects were observed.

CATS: **Selamectin** topical solution has been tested with no serious adverse effects in cats of over 15 different pure and mixed breeds and in pregnant and lactating females, breeding males and

females and kittens six weeks of age and older. Less than 1% of cats treated in the field studies had a transient alopecia at or near the site of application, possibly due to self grooming. In safety studies, **selamectin** topical solution was applied at 10 times the recommended dose, and no adverse effects were noted. **Selamectin** topical solution was also applied at 4 times the recommended dose to heartworm infected cats, and no adverse effects were observed. Accidental oral administration of **Evicto** topical solution to cats may induce salivation or vomiting. In well-controlled clinical studies, selamectin topical solution was used safely in animals receiving other frequently used veterinary products such as vaccines, antiparasitics, antibiotics, steroids, pesticides and shampoos.

Storage Conditions: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable - Keep away from heat, sparks, open flames or other sources of ignition.

Presentation: Available in the following strengths of 15, 45 and 60 mg for cats and 15, 30, 60, 120, 240 and 360 mg for dogs, in pack size of 6 tubes. Not all pack sizes may be marketed.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX
DIN XXXXXXXXX, DIN XXXXXXXXX



EVICTO®

Solution topique de selamectin

Usage vétérinaire seulement

Parasiticide topique pour chiens et chats

Principe actif : Selamectin est un composé semi-synthétique appartenant à la famille des avermectins.

Description du produit : La solution topique **Evicto** est une solution prête à utiliser, incolore à jaune, présentée dans des tubes unidoses et destinée au traitement topique (dermique) des chiens et des chats âgés d'au moins six semaines. Le contenu de chaque tube est préparé de façon à fournir au minimum 6 mg de selamectin/kg de poids corporel.

Indications : CHIENS : Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. La solution topique **Evicto** est aussi indiquée pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

CHATS : Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, des infections d'ankylostomes intestinaux (*Ancylostoma tubaeforme*) et d'ascarides (*Toxocara cati*), et pour la prévention de la dirofilariose causée par *Dirofilaria immitis*.

Posologie : La solution topique **Evicto** est appliquée par voie topique directement sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectin par kg de poids corporel, une fois par mois. Administrer la solution topique **Evicto** conformément aux tableaux suivants :

Chats (kg)	mg par tube	Activité (mg/mL)	Volume administré (contenu nominal du tube - mL)
≤2,5	15 mg	60	0,25
2,6-7,5	45 mg	60	0,75
7,6-10,0	60 mg	60	1,00
>10,0	Combinaison de tubes correspondante	60	Combinaison de tubes correspondante

Chiens (kg)	mg par tube	Activité (mg/mL)	Volume administré (contenu nominal du tube - mL)
≤2,5	15 mg	60	0,25
2,6-5,0	30 mg	120	0,25
5,1-10,0	60 mg	120	0,5
10,1-20,0	120 mg	120	1,0
20,1-40,0	240 mg	120	2,0
40,1-60,0	360 mg	120	3,0
>60	Combinaison de tubes correspondante	120	Combinaison de tubes correspondante

Administration :

Appuyer sur le capuchon pour percer le sceau sur le tube de solution topique **Evicto**; retirer ensuite le capuchon pour administrer le produit.

Administrer le produit directement sur la peau, sans masser pour faire pénétrer. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement, directement sur la peau, à un seul endroit. Éviter tout contact de ce produit avec les doigts. Ne pas appliquer lorsque le pelage est mouillé. Donner un bain ou un shampooing à l'animal deux heures ou plus après le traitement ne réduira pas l'efficacité de la solution topique **Evicto**. Jeter les tubes vides dans les ordures ménagères.

Contre-indications :

Ne pas utiliser chez les animaux malades, affaiblis ou amaigris.

Précautions :

La solution topique **Evicto** peut être administrée en toute sécurité aux chiens et chats infectés par le ver du cœur; il est toutefois recommandé, conformément aux bonnes pratiques vétérinaires, de procéder à une épreuve de dépistage du ver du cœur chez tous les chiens âgés de 6 mois et plus, avant de débiter le traitement avec la solution topique **Evicto**. Dans les régions où l'infection par le ver du cœur est endémique, les chats âgés de 6 mois et plus devraient également faire l'objet d'une épreuve de dépistage avant de débiter le traitement avec la solution topique **Evicto**. La solution topique **Evicto** n'est pas efficace contre les formes adultes de *D. immitis*; cependant, il peut contribuer à réduire le nombre de microfilaries en circulation.

La solution topique **Evicto** ne devrait être utilisée que chez les animaux âgés d'au moins six semaines.

Mises en garde : Garder ce produit hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion par un humain, consulter immédiatement un médecin.

Effets indésirables :

L'information qui suit concernant les effets indésirables du produit est fondée sur des déclarations volontaires recueillies à l'échelle mondiale (sauf dans les pays européens). Comme les réactions indésirables ne sont pas toutes signalées, il n'est pas toujours possible d'estimer avec certitude la fréquence de ces réactions ou d'établir un lien de cause à effet entre ces réactions et l'exposition au produit.

Voici les effets indésirables signalés, énumérés par ordre décroissant de fréquence :

- **CHATS :** changements touchant les poils à l'endroit où le produit a été appliqué, manque d'efficacité attendue, léthargie, anorexie, vomissements, prurit ou lésion ou érythème à l'endroit où le produit a été appliqué, diarrhée, ataxie et mort. Un lien de cause à effet avec le produit n'a pas pu être confirmé dans la majorité des cas de mortalité.
- **CHIENS :** manque d'efficacité attendue, vomissements, léthargie, diarrhée, anorexie, prurit, convulsions, changements touchant les poils à l'endroit où le produit a été appliqué, ataxie et tremblements musculaires. Comme c'est le cas avec les autres lactones macrocycliques, les signes neurologiques réversibles décrits ont été observés très rarement après l'emploi de selamectine.

Dans la majorité des rapports de manque d'efficacité attendue, un lien de cause à effet avec le produit n'a pas pu être confirmé. L'observance du propriétaire et le respect rigoureux de la dose prescrite, de la durée de traitement et du calendrier des applications, de même que la compréhension de la biologie des différents parasites, sont de la plus haute importance pour assurer la réussite du traitement et/ou de la prévention du parasitisme.

Les colleys et d'autres chiens de berger ont une sensibilité accrue aux lactones macrocycliques. Les signes de toxicité pouvant être observés lors d'une surdose comprennent l'abattement, l'hypersalivation, les tremblements et l'ataxie.

À l'instar de tout autre produit pharmaceutique, la solution topique **Evicto** peut avoir des effets indésirables; il est donc recommandé que tout signe de nouvelle maladie observé pendant le traitement par la solution topique **Evicto** fasse l'objet d'une évaluation approfondie.

Efficacité :

Lutte contre les puces chez les chiens et les chats

Si le chien ou le chat est déjà infesté par les puces au moment où la première dose de la solution topique **Evicto** est administrée, les puces adultes sur l'animal sont tuées, et aucun œuf de puce viable n'est produit après le premier traitement. Ceci interrompt la multiplication des puces. Les puces peuvent continuer à infester le milieu de vie de l'animal pendant une courte période de temps après le début du traitement avec la solution topique **Evicto** en raison de la métamorphose de pupes en puces adultes. Néanmoins, on observe déjà une importante réduction des infestations de puces un mois après le premier traitement, puisque la selamectine tue les larves de puces

présentes dans l'entourage de l'animal, ou les empêche d'atteindre le stade adulte. Pour maîtriser de façon durable les infestations de puces, la solution topique **Evicto** devrait être administrée à intervalle d'un mois pendant toute la saison des puces, en commençant un mois avant le début de l'activité des puces. Cette stratégie permet de s'assurer que les puces déjà présentes sur l'animal sont tuées et qu'aucun œuf de puce viable n'est produit par ces puces. Ceci rompt le cycle vital de la puce et maîtrise les infestations. Les résultats d'études cliniques sur l'efficacité sur le terrain d'une solution topique de selamectine utilisée chaque mois ont confirmé la maîtrise des infestations de puces et l'amélioration de manifestation clinique causée par une infestation de puces, dont la dermatite allergique par morsure de puces.

Prévention du ver du cœur chez les chiens et les chats

Pour prévenir la dirofilariose, la solution topique **Evicto** doit être administrée sur une base mensuelle. La solution topique **Evicto** peut être administrée toute l'année, ou à partir d'au plus un mois après la première exposition de l'animal aux moustiques, puis chaque mois par la suite jusqu'à la fin de la saison des moustiques. La dernière dose doit être administrée dans le mois qui suit la dernière exposition aux moustiques. Dans le cas où une dose est omise, ou si l'intervalle d'un mois entre deux doses est dépassé, l'administration immédiate de solution topique **Evicto** et le retour au régime mensuel réduira au minimum les risques de développement de vers du cœur adultes. Lorsque la solution topique **Evicto** remplace un autre produit de prévention du ver du cœur, dans le cadre d'un programme de prévention de la dirofilariose, la première dose de solution topique **Evicto** doit être administrée au plus un mois après la dernière dose du médicament précédent.

Traitement de l'acariose auriculaire chez les chiens et les chats

Pour l'élimination des acariens des oreilles (*O. cynotis*) chez les chiens et les chats, administrer une fois une seule dose de solution topique **Evicto**. Une seconde dose de solution topique **Evicto**, administrée un mois plus tard, peut être nécessaire pour éliminer les acariens chez certains chiens. L'utilisation mensuelle de solution topique **Evicto** traitera toute infestation subséquente par les acariens des oreilles. Plusieurs animaux traités pour l'otoacariose ont une otite externe concomitante, compliquée par des infections secondaires à levures ou bactériennes. *O. cynotis* cause une inflammation primaire et un prurit du conduit auditif externe ce qui prédispose à ces infections secondaires. Donc, un traitement d'appoint en plus du traitement avec la solution topique **Evicto**, pourrait être nécessaire chez les chats et les chiens atteints d'otoacariose compliquée par des infections secondaires à levures ou bactériennes. Il est recommandé de nettoyer les oreilles infestées pour retirer les débris.

Traitement des infections de nématodes chez les chiens et les chats

Pour le traitement et la maîtrise des infections d'ankylostomes (*A. tubaeforme*) et d'ascarides (*T. cati*) intestinaux chez les chats, administrer une fois une seule dose de solution topique **Evicto**. L'utilisation mensuelle de solution topique **Evicto** maîtrisera les infections ultérieures attribuables à ces parasites.

Pour aider au traitement des infections d'ascarides intestinaux (*T. canis*) chez les chiens, administrer deux traitements mensuels. L'utilisation mensuelle de solution topique **Evicto** maîtrisera les infections ultérieures attribuables à ces parasites.

Traitement de la gale sarcoptique chez les chiens

L'administration d'une seule dose de solution topique **Evicto** est sécuritaire et très efficace contre les infestations naturelles de *S. scabiei* chez les chiens; toutefois, pour une éradication

complète, deux doses peuvent être nécessaires. L'utilisation mensuelle de solution topique **Evicto** traitera toute infestation subséquente par les acariens du genre *Sarcoptes*.

Traitement des infestations de tiques chez les chiens

Pour les infestations de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*), la solution topique **Evicto** devrait être administrée sur une base mensuelle. Dans le cas d'une grave infestation de tiques, il est possible que la première dose ne puisse à elle seule donner des résultats satisfaisants. Dans une telle situation, une seconde dose peut être administrée deux semaines plus tard, puis chaque mois par la suite.

Innocuité pour les animaux :

CHIENS : Au cours d'études cliniques, une solution topique de selamectine n'a causé aucun effet indésirable chez plus de 100 races, pures et croisées, de chiens, incluant des colleys, de même que chez des femelles gestantes et en lactation, des mâles et des femelles de reproduction et des chiots âgés de six semaines et plus. Aucun effet indésirable n'a été observé lorsqu'une solution topique de selamectine a été administrée à 10 fois la dose recommandée.

Une solution topique de selamectine a également été administrée à trois fois la dose recommandée à des chiens atteints de dirofilariose; aucun effet indésirable n'a été observé.

CHATS : Au cours d'études cliniques, une solution topique de selamectine n'a causé aucun effet indésirable sérieux chez plus de 15 races, pures et croisées, de chats, de même que chez des femelles gestantes et en lactation, des mâles et des femelles de reproduction et des chatons âgés de six semaines et plus. Moins de un pour cent des chats traités dans le cadre des études sur le terrain ont présenté une alopecie transitoire au site d'application, ou près de celui-ci, probablement due au léchage. Dans le cadre d'études d'innocuité, une solution topique de selamectine a été appliquée à 10 fois la dose recommandée, et aucun effet indésirable n'a été observé. Une solution topique de selamectine a également été administrée à quatre fois la dose recommandée à des chats infectés par le ver du cœur; aucun effet indésirable n'a été observé. L'administration orale accidentelle d'une solution topique de selamectine à des chats peut provoquer une salivation et des vomissements. Au cours d'études cliniques contrôlées, une solution topique de selamectine a été administrée en toute sécurité à des animaux recevant déjà d'autres produits vétérinaires d'usage courant, tels que vaccins, antiparasitaires, antibiotiques, stéroïdes, pesticides et shampooings.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation.

Inflammable – Tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Présentation : La solution topique **Evicto** est disponible en concentrations de 15, 45 et 60 mg pour les chats et de 15, 30, 60, 120, 240 et 360 mg pour les chiens, dans les conditionnements de 6 tubes. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:

31OCT2019 – Virbac AH

Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street
Ottawa (Ontario) K1R 0A5

Outer Labels 15mg Puppies&Kittens

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for puppies and kittens ≤ 2.5 kg in weight

Parasiticide topique pour chiots et chatons ≤ 2.5 kg de poids corporel

Net (3&15) x 0.25 mL

single dose tubes each containing 15 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 15 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

(3&15) x 0.25 mL single-dose tubes each containing 15 mg of selamectin, for puppies and kittens

≤ 2.5 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

(3&15) x tubes unidoses de 0.25 mL chacun contenant 15 mg de selamectine pour chiots et chatons ≤ 2.5 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for puppies and kittens

Indications: (15 mg) Puppies: For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by

Dirofilaria immitis. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Kittens: For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*) infestations, intestinal hookworm (*Ancylostoma tubaeforme*) and roundworm (*Toxocara cati*) infections, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*.

Dosage and Administration: Evicto (15 mg) is recommended for use in puppies/kittens 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:

Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiots et chatons

Indications: (15 mg) **Chiots:** Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

Chatons: Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), de l'ascariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, des infections d'ankylostomes intestinaux (*Ancylostoma tubaeforme*) et d'ascarides (*Toxocara cati*), et pour la prévention de la dirofilariose causée par *Dirofilaria immitis*.

Posologie et administration: Evicto (15 mg) est recommandé pour usage chez les chiots et chatons âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street
Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT
EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon
2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'aplicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels **15mg Puppies&Kittens**

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX

Pf

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

15mg

0.25 mL (60 mg/mL)

≤ 2.5 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

15 mg

« Dog and cat picture »

≤ 2.5 kg

Selamectin

60 mg / ml

0.25 ml

{number}
{month/year}

Français:

EVICTO

15 mg

« Image chien et chat »

≤ 2.5 kg

Selamectin

60 mg / ml

0.25 ml

{numéro de lot}

{mois/année}

Outer Labels 30 mg Dogs

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for dogs 2.6 – 5.0 kg in weight

Parasiticide topique pour chiens 2,6 – 5,0 kg de poids corporel

Net 6 x 0.25 mL

single dose tubes each containing 30 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 30 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 0.25 mL single-dose tubes each containing 30 mg of selamectin, for dogs 2.6 – 5.0 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 0.25 mL chacun contenant 30 mg de selamectine pour chiens 2,6 – 5,0 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for dogs

Indications: (30 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Dosage and Administration: Evicto (30 mg) is recommended for use in dogs 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiens

Indications: (30 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

Posologie et administration: Evicto (30 mg) est recommandé pour usage chez les chiens âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street

Virbac AH 30Oct2019

Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT
EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon
2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

30mg Dogs

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

30mg

0.25 mL (120 mg/mL)

2.6 – 5.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

30 mg

« Dog picture »

2.6 – 5.0 kg

Selamectin

120 mg / ml

0.25 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

30 mg

« Image chien »

2.6 – 5.0 kg

Virbac AH 30Oct2019

Selamectine
120 mg / ml
0.25 ml

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels

45mg Cats

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for cats 2.6 – 7.5 kg in weight

Parasiticide topique pour chats 2,6 – 7,5 kg de poids corporel

Net 6 x 0.75 mL

single dose tubes each containing 45 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 45 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 0.75 mL single-dose tubes each containing 45 mg of selamectin, for cats 2.6 – 7.5 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 0.75 mL chacun contenant 45 mg de selamectine pour chats 2,6 – 7,5 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for cats

Indications: (45 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*) infestations, intestinal hookworm (*Ancylostoma tubaeforme*) and roundworm (*Toxocara cati*) infections, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*, in cats.

Dosage and Administration: Evicto (45 mg) is recommended for use in cats 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chats

Indications: (45 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C felis*), de l'ascariose auriculaire cause par *Otodectes cynotis*, des infections d'ankylostomes intestinaux (*Ancylostoma tubaeforme*) et d'ascarides (*Toxocara cati*), et pour la prevention de la dirofilariose cause par *Dirofilaria immitis*, chez les chats.

Posologie et administration: Evicto (45 mg) est recommandé pour usage chez les chats agés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau a la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un medecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street
Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT
EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon
2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.

3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

45mg Cats

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

45mg

0.75 mL (60 mg/mL)

2.6 – 7.5 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

45 mg

« Cat picture »

2.6 – 7.5 kg

Selamectin

60 mg / ml

0.75 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

45 mg

« Image chat »

2.6 – 7.5 kg

Selamectine

60 mg / ml

0.75 ml

Virbac AH 30Oct2019

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels 60mg Cats

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for cats 7.6 – 10 kg in weight

Parasiticide topique pour chats 7,6 – 10 kg de poids corporel

Net 6 x 1.0 mL

single dose tubes each containing 60 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 60 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 1.0 mL single-dose tubes each containing 60 mg of selamectin, for cats 7.6 – 10 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 1,0 mL chacun contenant 60 mg de selamectine pour chats 7,6 – 10 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for cats

Indications: (60 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*) infestations, intestinal hookworm (*Ancylostoma tubaeforme*) and roundworm (*Toxocara cati*) infections, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*, in cats.

Dosage and Administration: Evicto (60 mg) is recommended for use in cats 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chats

Indications: (60 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C felis*), de l'ascariose auriculaire cause par *Otodectes cynotis*, des infections d'ankylostomes intestinaux (*Ancylostoma tubaeforme*) et d'ascarides (*Toxocara cati*), et pour la prevention de la dirofilariose cause par *Dirofilaria immitis*, chez les chats.

Posologie et administration: Evicto (60 mg) est recommandé pour usage chez les chats agés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau a la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un medecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street
Ottawa (Ontario) K1R 0A5

**LOT
EXP**

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon
2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.

3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

60mg Cats

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX

Pr

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

60mg

1 mL (60 mg/mL)

7.6 – 10.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

60 mg

« Cat picture »

7.6 – 10.0 kg

Selamectin

60 mg / ml

1.0 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

60 mg

« Image chat »

7.6 – 10.0 kg

Selamectine

60 mg / ml

1.0 ml

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels 60 mg Dogs

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for dogs 5.1 – 10 kg in weight

Parasiticide topique pour chiens 5,1 – 10 kg de poids corporel

Net 6 x 0.5 mL

single dose tubes each containing 60 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 60 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 0.5 mL single-dose tubes each containing 60 mg of selamectin, for dogs 5.1 – 10 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 0.5 mL chacun contenant 60 mg de selamectine pour chiens 5,1 – 10 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for dogs

Indications: (60 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Dosage and Administration: Evicto (60 mg) is recommended for use in dogs 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiens

Indications: (60 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Demacantor variabilis*).

Posologie et administration: Evicto (60 mg) est recommandé pour usage chez les chiens âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street

Virbac AH 30Oct2019

Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT
EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon

Virbac AH 30Oct2019

2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écartier les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

60mg Dogs

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

60mg

0.5 mL (120 mg/mL)

5.1 – 10.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

60 mg

« Dog picture »

5.1 – 10.0 kg

Selamectin

120 mg / ml

0.5 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

60 mg

« Image chien »

5.1 – 10.0 kg

Selamectine
120 mg / ml
0.5 ml

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels

120 mg Dogs

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for dogs 10.1 – 20 kg in weight

Parasiticide topique pour chiens 10,1 – 20 kg de poids corporel

Net 6 x 1.0 mL

single dose tubes each containing 120 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 120 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 1.0 mL single-dose tubes each containing 120 mg of selamectin, for dogs 10.1 – 20 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 1.0 mL chacun contenant 120 mg de selamectine pour chiens 10,1 – 20 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for dogs

Indications: (120 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Dosage and Administration: Evicto (120 mg) is recommended for use in dogs 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiens

Indications: (120 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

Posologie et administration: Evicto (120 mg) est recommandé pour usage chez les chiens âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street

Virbac AH 30Oct2019

Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT

EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon

Virbac AH 30Oct2019

2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écartez les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquez la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Pressez le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Évitez tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

120mg Dogs

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

120mg

1 mL (120 mg/mL)

10.1 – 20.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

120 mg

« Dog picture »

10.1 – 20.0 kg

Selamectin

120 mg / ml

1.0 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

120 mg

« Image chien »

10.1 – 20.0 kg

Selamectin

Virbac AH 30Oct2019

120 mg / ml
1.0 ml

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels

240 mg Dogs

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for dogs 20.1 – 40 kg in weight

Parasiticide topique pour chiens 20,1 – 40 kg de poids corporel

Net 6 x 2.0 mL

single dose tubes each containing 240 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 240 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 2.0 mL single-dose tubes each containing 240 mg of selamectin, for dogs 20.1 – 40 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 2.0 mL chacun contenant 240 mg de selamectine pour chiens 20,1 – 40 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for dogs

Indications: (240 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Dosage and Administration: Evicto (240 mg) is recommended for use in dogs 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiens

Indications: (240 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

Posologie et administration: Evicto (240 mg) est recommandé pour usage chez les chiens âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street

Virbac AH 30Oct2019

Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT

EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon

Virbac AH 30Oct2019

2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'aplicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

240mg Dogs

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

240mg

2 mL (120 mg/mL)

20.1 – 40.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

240 mg

« Dog picture »

20.1 – 40.0 kg

Selamectin

120 mg / ml

2.0 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

240 mg

« Image chien »

20.1 – 40.0 kg

Selamectin

Virbac AH 30Oct2019

120 mg / ml
2.0 ml

{numéro de lot}
{mois/année}

Outer Labels

360 mg Dogs

Front panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

DIN XXXXXXXXX



Topical parasiticide for dogs 40.1 – 60 kg in weight

Parasiticide topique pour chiens 40,1 – 60 kg de poids corporel

Net 6 x 3.0 mL

single dose tubes each containing 360 mg of selamectin

tubes unidoses, chacun contenant 360 mg de selamectine

Veterinary use only

Usage vétérinaire seulement

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes.

Mises en garde: Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux.

Virbac

Side panel 1:

EVICTO

Selamectin topical solution

6 x 3.0 mL single-dose tubes each containing 360 mg of selamectin, for dogs 40.1 – 60 kg in weight and at least 6 weeks of age.

Side panel 2:

EVICTO

Solution topique de selamectine

6 x tubes unidoses de 3.0 mL chacun contenant 360 mg de selamectine pour chiens 40,1 – 60 kg de poids corporel et âgés d'au moins 6 semaines.

Back panel:

EVICTO

Selamectin topical solution

Topical parasiticide for dogs

Indications: (360 mg) For the treatment and control of flea (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), ear mite (*Otodectes cynotis*), sarcoptic mange mite (*Sarcoptes scabiei*) and tick (*Rhipicephalus sanguineus*) infestations, and for the prevention of heartworm disease caused by *Dirofilaria immitis*. Evicto is also indicated as an aid in the treatment and control of roundworm (*Toxocara canis*) infections and tick (*Dermacentor variabilis*) infestations.

Dosage and Administration: Evicto (360 mg) is recommended for use in dogs 6 weeks of age and older. Apply to the skin at the recommended minimum dose of 6 mg of selamectin per kg of body weight once a month.

Warnings: Keep out of reach of children. May be irritating to skin and eyes. Wash hands after use and wash off any product in contact with the skin immediately with soap and water. If contact with eyes occurs, flush eyes copiously with water. In case of ingestion, contact a physician immediately.

Storage: Store between 15°C and 30°C. Protect from light. Keep in the original carton until ready for use. Flammable, keep away from heat, sparks, open flames, and other sources of ignition.

See package insert for complete directions for use.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137

Imported and distributed by:
Virbac Canada Inc.
1400-340 Albert Street
Ottawa, ON, K1R 0A5

Solution topique de selamectine

Parasiticide topique pour chiens

Indications: (360 mg) Pour le traitement et la maîtrise des infestations de puces (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) et de tiques (*Rhipicephalus sanguineus*), de l'acariose auriculaire causée par *Otodectes cynotis*, de la gale sarcoptique causée par *Sarcoptes scabiei* et pour la prévention de la dirofilariose cardiovasculaire causée par *Dirofilaria immitis*. Evicto est aussi indiqué pour aider au traitement et à la maîtrise des infections dues aux ascarides (*Toxocara canis*) et des infestations de tiques (*Dermacentor variabilis*).

Posologie et administration: Evicto (360 mg) est recommandé pour usage chez les chiens âgés de 6 semaines ou plus. Appliquer sur la peau à la dose minimum recommandée de 6 mg de selamectine par kg de poids corporel, une fois par mois.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Peut irriter la peau et les yeux. Se laver les mains après usage. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Entreposage : Entreposer entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder le tube dans le carton original jusqu'au moment de l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur et d'étincelles, de toute flamme nue ou autres sources d'inflammation.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Virbac AH, Inc., 3200 Meacham Boulevard
Fort Worth, TX 76137 USA/États-Unis

Importé et distribué par:
Virbac Canada Inc.
1400-340 rue Albert Street

Virbac AH 30Oct2019

Ottawa (Ontario) K1R 0A5

LOT
EXP

Application steps

Evicto


selamectin topical solution

To facilitate application of Evicto, follow these basic steps. Evicto should be applied when the pet's haircoat is dry. However, bathing or immersing your pet in water 2 hours after application will not reduce the effectiveness of this treatment.

Remove the Evicto tube from its protective package

1. Holding the tube upright, remove the cap.
2. Invert the cap and place other end back onto applicator tip. Push the cap down to break the applicator seal. Remove the cap prior to treatment application
3. Part the hair on the back of the animal at the base of the neck, in front of the shoulder blades, until the skin is visible. Apply the tip of the Evicto tube directly to the skin without massaging. Squeeze the tube firmly to empty the contents in one spot. Avoid contact between Evicto and your fingers.

Discard empty tubes in your ordinary household refuse.



Evicto

solution topique de selamectin

Pour faciliter l'application de Evicto, veuillez suivre les étapes de base suivantes. Evicto devrait être appliqué quand le poil de l'animal est sec. Cependant, vous pouvez baigner ou immerger votre animal dans l'eau 2 heures après l'application sans réduire l'efficacité de ce traitement.

Retirer le tube de Evicto de son emballage protecteur

1. En tenant la tube verticalement, enlever le capuchon
2. Retourner le capuchon et placer l'autre extrémité sur l'embout de l'applicateur. Pousser le capuchon vers le bas pour perforer son opercule de protection. Retirer le capuchon avant l'application du traitement.
3. Écarter les poils sur le dos de l'animal, à la base du cou, à l'avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Appliquer la pointe du tube de Revolution directement sur la peau sans masser. Presser le tube fermement de façon à le vider à un seul endroit. Éviter tout contact de Revolution avec vos doigts.

Jeter les tubes vides dans vos ordures ménagères ordinaires.

Inner Labels

360mg Dogs

Sachet:

Virbac

DIN XXXXXXXXX



EVICTO

Selamectin topical solution

Solution topique de selamectine

360mg

3 mL (120 mg/mL)

40.1 – 60.0 kg

Lot

EXP

Tube:

EVICTO

360 mg

« Dog picture »

40.1 – 60.0 kg

Selamectin

120 mg / ml

3.0 ml

{number}

{month/year}

Français:

EVICTO

360 mg

« Image chien »

40.1 – 60.0 kg

Virbac AH 30Oct2019

Selamectin
120 / ml
3.0 ml

{numéro de lot}
{mois/année}