

MONOGRAPHIE

ZANTAC®

Comprimés à 75 mg USP (sous forme de chlorhydrate de ranitidine)

ZANTAC® Dose maximum sans ordonnance

Comprimés à 150 mg USP (sous forme de chlorhydrate de ranitidine)

Antagoniste des récepteurs H₂ de l'histamine

Sanofi santé grand public
2905 Place Louis-R. Renaud
Laval, QC, Canada H7V 0A3

Date de révision :
5 décembre 2019

N° de contrôle de la présentation : 231962

Version s-a 3.0 datée du 5 décembre 2019

Table des matières

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ	3
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT	3
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE.....	3
CONTRE-INDICATIONS	3
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS	4
EFFETS INDÉSIRABLES	5
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES	7
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.....	10
SURDOSAGE.....	11
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE	12
CONSERVATION ET STABILITÉ	18
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	18
PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES.....	20
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES	20
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE	20
TOXICOLOGIE	24
RÉFÉRENCES	29
PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS	33

ZANTAC[®] et ZANTAC[®] Dose maximum sans ordonnance

Ranitidine

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie d'administration	Forme posologique et concentration	Ingrédients non médicinaux d'importance clinique
Orale	Comprimé à 75 mg	Aucun <i>Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter la section Formes posologiques, composition et conditionnement.</i>
Orale	Comprimé à 150 mg	Aucun <i>Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter la section Formes posologiques, composition et conditionnement.</i>

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE

Les comprimés ZANTAC[®] sont indiqués pour :

- le soulagement rapide et efficace, le traitement et la prévention, aussi bien le jour que la nuit, des sensations de brûlure, de douleur et de malaise associées à l'indigestion acide (dyspepsie), aux brûlures d'estomac, à l'hyperacidité, ainsi qu'aux aigreurs et aux dérangements d'estomac associés à une production excessive d'acide gastrique.

Ces symptômes peuvent être déclenchés par la consommation d'aliments ou de boissons.

CONTRE-INDICATIONS

ZANTAC (chlorhydrate de ranitidine) est contre-indiqué chez les patients qui présentent une hypersensibilité connue à l'un des composants du produit. ZANTAC ne doit pas être administré aux patients ayant des antécédents d'hypersensibilité aux antagonistes des récepteurs H₂. Pour la liste complète des contre-indications, voir les sections Formes posologiques, composition et conditionnement et Mises en garde et précautions.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Appareil digestif

Le traitement à l'aide d'un antagoniste des récepteurs H₂ de l'histamine peut masquer les symptômes du carcinome de l'estomac et retarder ainsi le diagnostic de cette maladie. Par conséquent, on doit aviser les patients de consulter un médecin s'ils étouffent ou éprouvent de la difficulté à avaler, de la douleur en avalant ou un malaise abdominal persistant, si les symptômes s'aggravent ou persistent pendant plus de 2 semaines, ou si de nouveaux symptômes apparaissent.

L'administration d'antagonistes des récepteurs H₂ favorise la croissance bactérienne intragastrique en réduisant l'acidité de l'estomac.

Une surveillance médicale périodique est recommandée chez les patients qui reçoivent des AINS en concomitance avec la ranitidine, surtout s'ils ont des antécédents d'ulcère gastroduodéal.

Système hématopoïétique

De rares rapports cliniques permettent de croire que la ranitidine peut précipiter les crises de porphyrie aiguë. Par conséquent, il faut éviter de prescrire ce médicament aux patients ayant des antécédents de cette maladie.

Fonction hépatique/biliaire/pancréatique

En présence d'une insuffisance hépatocellulaire grave, surtout si elle s'accompagne d'une insuffisance rénale, il est préférable de réduire la dose.

Fonction immunitaire

Chez les patients tels que les personnes âgées, les personnes atteintes de pneumopathie chronique ou de diabète, et les personnes immunodéprimées, le risque de contracter une pneumonie extra-hospitalière peut être plus élevé.

Fonction rénale

La ranitidine est éliminée par les reins; en présence d'insuffisance rénale grave, les taux plasmatiques de ranitidine augmentent et l'élimination s'en trouve prolongée. En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de réduire la dose en fonction de la clairance de la créatinine ou des taux de créatinine. Chez les patients âgés atteints d'insuffisance rénale, il faut interrompre le traitement si un état de confusion mentale se déclare. Par conséquent, on recommande aux patients, en pareils cas, d'utiliser ZANTAC sous la surveillance d'un médecin.

Populations particulières

Femmes enceintes :

L'innocuité de ZANTAC dans le traitement des cas où une réduction contrôlée de la sécrétion gastrique est nécessaire pendant la grossesse n'a pas été établie. Les études de reproduction effectuées chez le rat et le lapin à des doses plus élevées n'ont fourni aucune preuve laissant

croire que la ranitidine portait atteinte à la fertilité ou était dangereuse pour le fœtus. En l'absence de tout effet tératogène chez l'animal, on ne s'attend pas qu'il y ait des malformations chez l'être humain. L'utilisation en contexte clinique de la ranitidine au cours d'un nombre limité de grossesses n'a apparemment révélé aucune malformation ni effet fœtotoxique particulier jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, si l'administration de ranitidine est considérée nécessaire, il faudra évaluer si l'utilité thérapeutique l'emporte sur les risques éventuels pour la patiente et pour le fœtus.

Femmes qui allaitent : Le passage des antagonistes H₂ dans le lait maternel est documenté, et le rapport entre les concentrations de lait et de plasma est élevé; néanmoins, les doses ingérées par le nourrisson demeurent peu élevées (environ 1 % de la dose maternelle).

Cela dit, on ne dispose que de données cinétiques. La tolérance *a fortiori* chez le nourrisson en cas de traitement maternel prolongé ou à dose élevée est inconnue.

Par mesure de précaution, il est donc préférable pour la femme qui allaite d'éviter de prendre ce médicament.

Enfants (< 16 ans) :

L'innocuité de la ranitidine a été évaluée chez des enfants âgés de 0 à 16 ans atteints de troubles de la sécrétion d'acide gastrique. La ranitidine a présenté un profil d'effets indésirables semblable à celui qu'on observe chez les adultes. On dispose de données limitées sur l'innocuité à long terme, particulièrement en ce qui a trait à la croissance et au développement. Les enfants de moins de 16 ans doivent demeurer sous la surveillance d'un médecin.

Personnes âgées (> 65 ans) :

Avant d'instaurer un traitement à l'aide de ZANTAC chez les personnes âgées, il faut tenir compte du fait que les cas de malignité sont plus courants dans cette population. Les personnes âgées qui reçoivent des anti-inflammatoires non stéroïdiens conjointement avec ZANTAC doivent faire l'objet d'une étroite surveillance. Comme pour tout médicament administré chez les personnes âgées, il faut tenir compte des autres médicaments administrés en concomitance.

Conduite d'un véhicule ou réalisation d'autres tâches dangereuses

Les patients chez qui le traitement entraîne des étourdissements, de la somnolence ou des vertiges doivent éviter de conduire un véhicule ou d'effectuer des tâches qui exigent de la vigilance.

EFFETS INDÉSIRABLES

Aperçu des effets indésirables du médicament

ZANTAC (chlorhydrate de ranitidine) a été généralement très bien toléré. Lors d'essais cliniques avec ZANTAC à 75 mg ou à 150 mg, l'incidence d'effets indésirables a été comparable à celle des effets indésirables les plus souvent signalés, soit: céphalées, nausées, vomissements et diarrhée: courants [fréquents] > 1 % et < 10 %. Dans l'ensemble, l'incidence d'effets indésirables chez les patients recevant la ranitidine a été comparable à celle observée chez ceux qui recevaient un placebo (aucune différence sur le plan statistique), et ce, quelles que soient les

caractéristiques démographiques.

Les effets indésirables suivants ont été signalés lors d'études cliniques, lors du programme de pharmacovigilance ou lors du traitement habituel de patients à l'aide des doses sur ordonnance de ZANTAC. La majorité de ces effets indésirables ont été observés suivant l'administration par voie orale de doses plus élevées de ranitidine, prescrites sur ordonnance, et une relation de cause à effet avec ZANTAC n'a pas toujours été établie.

Troubles du système sanguin et lymphatique: Il s'est produit des altérations de la numération globulaire (anémie, leucopénie, granulocytopénie et thrombopénie) chez un petit nombre de patients. Celles-ci sont généralement réversibles. De rares cas d'agranulocytose, de pancytopénie ou de neutropénie, parfois avec hypoplasie de la moelle ou aplasie de la moelle et d'anémie aplasique, et des cas d'anémie hémolytique à médiation immunitaire acquise ont été signalés.

Troubles cardiaques : Comme pour tout autre antagoniste des récepteurs H₂, de rares cas d'arythmie telle que tachycardie, extrasystoles ventriculaires, bradycardie sinusale, asystole, extrasystole, bloc AV avec pauses sinusales, extrasystoles ventriculaires et état de choc, et de très rares cas de hausse de la tension artérielle et de palpitations ont été observés.

Troubles du système nerveux central : Céphalées (parfois graves);, malaises;, étourdissements;, somnolence;, insomnie;, vertiges;, dystonie, nervosité et méningite. De rares cas de troubles moteurs involontaires réversibles ont été signalés (tremblements, myoclonie ou mouvements oculaires involontaires).

Troubles endocriniens : Il n'y a pas eu d'interférence cliniquement significative de la fonction endocrinienne ou gonadique. Quelques cas de symptômes mammaires et d'hyperprolactinémie chez l'homme prenant de la ranitidine ont été signalés.

Troubles oculaires : Vision floue réversible évoquant une altération de l'accommodation. De rares cas de variation de la pression intraoculaire ont été signalés.

Troubles gastro-intestinaux: Constipation, diarrhée, nausées et vomissements, indisposition et douleurs abdominales, dysgueusie, pancréatite aiguë et sécheresse de la bouche. Des cas d'hypersécrétion de rebond ont été signalés après l'arrêt du traitement par la ranitidine.

Troubles généraux et anomalies au site d'administration : De très rares cas d'asthénie ont été signalés.

Troubles hépatobiliaires: Des modifications transitoires et réversibles des valeurs des épreuves fonctionnelles hépatiques peuvent survenir (augmentation des taux d'AST et d'ALT). Avec l'administration orale, il y a eu des rapports occasionnels d'hépatite, hépatocellulaire ou hépatocanaliculaire, ou les deux, avec ou sans ictère, et d'ictère cholestatique. Dans ces circonstances, on doit cesser immédiatement d'administrer la ranitidine. Ces troubles sont généralement réversibles, mais en de très rares cas, des décès se sont produits. Des cas d'insuffisance hépatique ont également été signalés.

Troubles du système immunitaire : De rares cas de réactions d'hypersensibilité (y compris angine, douleur thoracique, hypotension, bronchospasme, fièvre, éruptions cutanées, éosinophilie, anaphylaxie [choc anaphylactique], urticaire, œdème angioneurotique [œdème de Quincke], dermatose bulleuse, eczéma et dyspnée) ont été signalés. Ces événements se sont produits après l'administration d'une dose unique de ranitidine.

Troubles de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif : De rares cas d'arthralgie et de myalgie ont été signalés.

Troubles psychiatriques : On a signalé des cas isolés de confusion mentale réversible, de dépression, d'hallucinations et d'agitation, surtout chez les personnes gravement malades et les personnes âgées, ou chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Dans ces cas, il faut mettre fin au traitement.

Troubles rénaux et urinaires : Une néphrite interstitielle aiguë et une légère augmentation des taux de créatinine sérique se sont produites occasionnellement, après l'administration d'une dose unique. De rares cas de néphrotoxicité ont été signalés.

Troubles de l'appareil reproducteur et des seins : Impuissance réversible, perte de libido, symptômes et troubles mammaires tels que la gynécomastie et la galactorrhée.

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : Prurit, éruptions cutanées, y compris des cas évoquant un érythème polymorphe bénin. Alopecie, dermatite de contact, photosensibilité.

Troubles vasculaires : Vascularite.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aperçu

Bien qu'on ait signalé que la ranitidine se lie faiblement au cytochrome P₄₅₀ in vitro, les doses recommandées n'inhibent pas l'action des enzymes oxygénases liées au cytochrome P₄₅₀ hépatique. L'analyse de publications choisies se rapportant aux études cliniques contrôlées sur les interactions médicamenteuses et portant sur l'élimination hépatique du médicament, a révélé qu'il est peu probable que la ranitidine provoque une potentialisation cliniquement significative de l'action des médicaments qui sont inactivés par le système enzymatique lié au cytochrome P₄₅₀ hépatique; ces médicaments peuvent comprendre le diazépam, la lidocaïne, la phénytoïne, le propranolol, la théophylline et la warfarine. On a signalé des cas sporadiques (environ 1 cas sur 4 millions de traitements de patients) d'interactions médicamenteuses avec les hypoglycémiantes et la théophylline chez des personnes âgées. La signification de ces rapports ne peut être déterminée à l'heure actuelle, car les essais cliniques contrôlés qui ont été effectués n'ont pas révélé d'interactions. Ces rapports se fondent sur l'usage du médicament selon les indications et les doses prescrites sur ordonnance. Les patients sous AINS peuvent souffrir de dyspepsie suite à

la prise de ces médicaments et doivent consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre ZANTAC.

Interactions médicament-médicament

Antiacides : L'administration concomitante d'antiacide de puissance moyenne ou élevée (75 mEq) et de ranitidine n'est pas recommandée. L'absorption de la ranitidine peut être réduite. On doit aviser les patients de ne pas prendre d'antiacides moins de 0,5 à 1 heure avant ou après la prise de ranitidine.

Cyanocobalamine : Il existe un risque de carence en cyanocobalamine après un traitement de longue durée (plusieurs années), car l'effet de diminution de l'acidité gastrique de ces médicaments peut entraîner une réduction de l'absorption de la vitamine B₁₂ dans le tube digestif.

Erlotinib : Il existe un risque de réduction des concentrations plasmatiques d'erlotinib.

Éthanol : Il est peu probable que la consommation de quantités modérées d'alcool résulte en une altération importante, sur le plan clinique, des concentrations sanguines ou du métabolisme de l'alcool. L'administration concomitante d'une dose orale unique de 75 mg de ranitidine et d'éthanol à raison de 0,15 g/kg ne produit aucun effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de l'éthanol, comme l'a démontré une étude croisée et contrôlée contre placebo, réalisée à double insu auprès de 25 sujets en bonne santé.

Procaïnamide : On pense que la ranitidine entre en compétition avec la procaïnamide pour la sécrétion tubulaire rénale active et/ou qu'elle inhibe l'absorption de la procaïnamide. Les données révèlent que l'ajustement de la dose de procaïnamide est indiqué chez les personnes âgées, les patients atteints d'insuffisance rénale et les patients recevant des doses élevées de ranitidine. Ces rapports se fondent sur l'usage du médicament selon les indications et les doses prescrites sur ordonnance. La ranitidine, un substrat du système de transport des cations organiques du rein, peut influencer sur la clairance d'autres médicaments éliminés par cette voie. Il a été démontré que des doses élevées de ranitidine (p. ex., celles qu'on utilise dans le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison) peuvent réduire l'excrétion rénale de la procaïnamide et du N-acétyl-procaïnamide, ce qui a pour effet d'augmenter les concentrations plasmatiques de ces médicaments. Bien qu'il est peu probable que cette interaction soit d'importance clinique aux doses habituelles de ranitidine, il peut être prudent de rester à l'affût d'une toxicité due à la procaïnamide lorsque celle-ci est administrée en concomitance avec de la ranitidine par voie orale à une dose supérieure à 300 mg par jour.

Agents gastro-intestinaux topiques, hydroxyde de magnésium, aluminium et charbon : Ces agents réduisent l'absorption des antagonistes des récepteurs H₂ de l'histamine. Cet effet ne se produit pas si ces substances sont administrées après un intervalle de 2 heures.

Des interactions avec les médicaments suivants ont été signalées suite à la prise de ranitidine en dose sur ordonnance:

- **alendronate** : L'interaction entre la ranitidine et l'alendronate n'est pas cliniquement notable.
- **amoxicilline et acide clavulanique** : L'administration concomitante de ranitidine n'a pas eu d'effet apparent sur la biodisponibilité de l'amoxicilline ou de l'association amoxicilline-acide clavulanique.
- **énoxacine** : La portée clinique de l'interaction entre la ranitidine et l'énoxacine n'est pas établie.
- **diltiazem** : La portée clinique de l'interaction entre la ranitidine et le diltiazem est inconnue.
- **triamtérène** : L'interaction entre la ranitidine et le triamtérène n'est pas cliniquement notable.
- **fluvastatine** : L'interaction entre la ranitidine et la fluvastatine n'est pas cliniquement notable.
- **fosphénytoïne** : Aucune interaction entre la fosphénytoïne et la ranitidine n'a été documentée.
- **glyburide** : La portée clinique de l'interaction pharmacodynamique entre la ranitidine et le glyburide n'est pas bien établie.
- **metformine** : On considère la ranitidine comme étant un faible inhibiteur de MATE1. L'interaction entre la ranitidine et la metformine ne semble pas avoir de portée clinique.
- **pancréatine** : Aucune interaction entre la pancréatine et la ranitidine n'a été documentée.
- **pancuronium** : Aucune interaction entre le pancuronium et la ranitidine n'a été documentée.
- **pentoxifylline** : Aucune interaction entre la pentoxifylline et la ranitidine n'a été documentée.
- **tubocurarine** : Aucune interaction entre la tubocurarine et la ranitidine n'a été documentée.

Sucralfate : L'administration de fortes doses de sucralfate (deux grammes) conjointement avec ZANTAC, peut réduire l'absorption de ce dernier. Toutefois, cet effet ne se produit pas si le sucralfate est pris au moins 2 heures après l'administration de ZANTAC. Ces données se fondent sur l'usage du médicament selon les indications et les doses prescrites sur ordonnance.

Triazolam : Lors d'une étude portant sur les interactions médicamenteuses entre la ranitidine et le triazolam, les concentrations plasmatiques de triazolam ont été plus élevées lorsque la ranitidine était administrée 2 f.p.j. que lorsque le triazolam était administré seul. L'aire sous la courbe (ASC) moyenne concentration-temps du triazolam chez les sujets âgés de 18 à 60 ans a été de 10 à 28 % plus élevée suite à l'administration de comprimés de ranitidine à 75 mg et à 150 mg, respectivement, qu'après l'administration du triazolam seul. Chez les sujets de plus de 60 ans, les valeurs ASC ont été environ 30 % plus élevées suite à l'administration de comprimés de ranitidine à 75 mg et à 150 mg. Il ne semble pas y avoir eu de changements sur le plan de la pharmacocinétique du triazolam ou de l'(alpha)-hydroxytriazolam, un métabolite principal, ni sur le plan de leur élimination. Il se peut que la réduction de l'acide gastrique par la ranitidine ait

augmenté la disponibilité du triazolam. La signification clinique de l'interaction pharmacocinétique entre le triazolam et la ranitidine demeure inconnue.

L'emploi de la ranitidine peut produire des interactions d'importance clinique lorsque cet agent est administré en concomitance avec d'autres médicaments. L'emploi concomitant de la ranitidine et des médicaments suivants doit se faire uniquement sous surveillance médicale :

Atazanavir :

La ranitidine diminue significativement l'absorption de l'atazanavir.

Géfitinib :

La biodisponibilité du géfitinib peut être modifiée. Cela peut entraîner une diminution de l'absorption.

Antifongiques (Itraconazole, Kétoconazole, Posaconazole):

L'absorption dans le tube digestif des antifongiques azolés est réduite en raison de l'élévation du pH intragastrique causée par l'inhibition de la sécrétion acide.

Midazolam :

La biodisponibilité du midazolam peut être modifiée. Cela peut entraîner une augmentation de l'absorption.

Warfarine :

Des rapports ont fait état d'une altération du temps de prothrombine associée à l'administration d'anticoagulants coumariniques (p. ex., la warfarine). Compte tenu de l'indice thérapeutique étroit de la warfarine, il est recommandé de surveiller attentivement les augmentations et les diminutions du temps de prothrombine lorsque cet agent est administré en concomitance avec la ranitidine.

Interactions médicament-épreuves de laboratoire : Des résultats faussement positifs au dépistage de protéines dans l'urine au moyen de bandelettes réactives peuvent survenir durant le traitement par la ranitidine. L'épreuve faisant appel à l'acide sulfosalicylique est donc recommandée.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Considérations posologiques

- Les patients atteints d'insuffisance rénale grave doivent utiliser ce produit uniquement sous la surveillance d'un médecin.
- On doit aviser les patients de ne pas prendre d'antiacides moins de 0,5 à 1 heure avant ou après la prise de ranitidine.
- Les patients sous AINS peuvent souffrir de dyspepsie et doivent consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre ZANTAC.
- Les patients sont avisés de cesser l'emploi du médicament et consulter leur médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent, ou si de nouveaux symptômes apparaissent après

14 jours de traitement.

Posologie recommandée et ajustement posologique

Adultes et enfants de 16 ans et plus : Prendre un comprimé au moment de l'apparition des symptômes, que ce soit le jour ou la nuit. Si les symptômes persistent pendant plus de 1 heure ou réapparaissent après 1 heure, on peut prendre un deuxième comprimé.

Pour la prévention des symptômes déclenchés par la consommation d'aliments ou de boissons, prendre 1 comprimé de 30 à 60 minutes avant de prendre un repas susceptible de provoquer ces symptômes.

Les comprimés doivent être avalés entiers, avec de l'eau. La dose maximale est de 2 comprimés (150 mg de ranitidine pour les comprimés à 75 mg, et 300 mg de ranitidine pour les comprimés à 150 mg) par période de 24 heures. Les patients sont avisés de cesser l'emploi du médicament et consulter leur médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent, ou si de nouveaux symptômes apparaissent après 14 jours de traitement.

Enfants de moins de 16 ans : Les enfants de moins de 16 ans doivent demeurer sous la surveillance d'un médecin.

Patients âgés : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients âgés. Avant d'instaurer un traitement à l'aide de ZANTAC chez les personnes âgées, il faut tenir compte du fait que les cas de malignité sont plus courants dans cette population. Les personnes âgées qui reçoivent des anti-inflammatoires non stéroïdiens conjointement avec ZANTAC doivent faire l'objet d'une étroite surveillance. Comme pour tout médicament administré chez les personnes âgées, il faut tenir compte des autres médicaments administrés en concomitance.

SURDOSAGE

Signes et symptômes

Jusqu'ici, on ne connaît aucun cas de surdosage délibéré.

Pour le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison, des doses orales allant jusqu'à 6 g de ranitidine par jour, ont été administrées sans qu'il y ait eu d'effets indésirables.

Prise en charge

On devra employer les mesures habituelles pour éliminer des voies digestives le médicament non absorbé (y compris le charbon activé ou le sirop d'ipéca) et assurer une surveillance clinique ainsi qu'un maintien des fonctions vitales. Au besoin, le médicament peut être éliminé du plasma par hémodialyse.

Pour la prise en charge d'un surdosage soupçonné, veuillez communiquer avec le centre

antipoison de votre région.

MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Mode d'action

La ranitidine est un antagoniste de l'histamine qui exerce son effet sur les récepteurs H₂ de l'estomac. Par conséquent, la ranitidine inhibe à la fois la sécrétion d'acide gastrique basale et la sécrétion d'acide gastrique provoquée par l'histamine, la pentagastrine et d'autres sécrétagogues. L'inhibition de la sécrétion d'acide gastrique a été observée après administration de la ranitidine par voie intraveineuse, intraduodénale et orale. Cette réaction est fonction de la dose, la réaction optimale étant obtenue avec une dose orale de 300 mg/jour.

La sécrétion de pepsine est également inhibée, mais la production de mucus gastrique n'est pas affectée. La ranitidine n'altère pas la sécrétion pancréatique de bicarbonate ou d'enzymes en réaction à la sécrétine et à la pancréozymine.

Pharmacodynamie

La ranitidine est rapidement absorbée après administration par voie orale; les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes dans les 2 à 3 heures. Ces concentrations plasmatiques ne sont pas influencées de façon significative par la présence d'aliments dans l'estomac au moment de l'administration par voie orale ni par des doses normales d'antiacides.

La biodisponibilité de la ranitidine administrée par voie orale est d'environ 50 %. Chez l'homme, la ranitidine se lie aux protéines sériques dans une proportion se situant entre 10 et 19 %. Sa demi-vie d'élimination est d'environ 3 heures. La principale voie d'élimination est l'urine (40 % de récupération du médicament libre et métabolisé en 24 heures).

Il existe une corrélation linéaire significative entre la dose administrée et l'effet inhibiteur sur la sécrétion d'acide gastrique pour des doses orales uniques allant jusqu'à 300 mg. Chez des sujets sains, une dose unique de 75 mg de ranitidine a réduit de façon significative l'acidité intragastrique stimulée par les aliments (ASC d'[H⁺]), comparativement au placebo. Les effets de la ranitidine sur l'acidité et le pH intragastriques sont également fonction de la dose.

L'activité pharmacologique importante de la ranitidine est son inhibition de l'acide gastrique et de la sécrétion de fluides à l'état basal et stimulé, accroissant ainsi le pH et diminuant le volume des sécrétions. Une dose unique de 75 mg a un court délai d'action, par comparaison au placebo, augmente significativement le pH gastrique en moins de 1 heure et possède une durée d'action qui s'étend jusqu'à 13 heures après la prise du médicament. Si l'on effectue une correction pour tenir compte du délai d'action (moins de 1 heure), une dose de 75 mg de ranitidine inhibe la sécrétion d'acide gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures (c.-à-d. toute la journée ou toute la nuit). La même étude multicentrique croisée à répartition aléatoire a permis d'observer que la rapidité d'action d'une dose de 75 mg de ranitidine est supérieure sur le plan statistique à celle d'une dose de 10 mg de famotidine quant à la suppression de la sécrétion gastrique, 1 ou 2 heures seulement après la prise du médicament. La durée et le degré de

suppression de la sécrétion d'acide obtenus avec une dose de 75 mg de ranitidine (63,1 %, n = 75) ont été supérieurs à ceux obtenus avec une dose de 200 mg de cimétidine (37,8 %, n = 52) durant toute la période d'évaluation (10 heures, pendant le jour).

Tableau 1. Sommaire de l'activité moyenne pondérée de l'ion hydrogène (ASC d'H⁺ en mmol/L·h)				
Durée	Placebo n = 75 sujets	Ranitidine à 75 mg n = 75 sujets	Cimétidine à 200 mg n = 52 sujets	Famotidine à 10 mg n = 22 sujets
Total (20 h)	30,89	18,21*†	25,08*	19,32*
Jour (11 h à 22 h 30)	32,76	18,19*†	22,06*	13,23*
Nuit (22 h 30 à 8 h 30)	28,83	23,23*†	28,09	25,41*
* p < 0,05 comparativement au groupe placebo correspondant. † p < 0,05 comparativement au groupe cimétidine correspondant.				

Lors d'un vaste essai multicentrique contrôlé contre placebo et portant sur un éventail de doses, réalisé chez des sujets souffrant de brûlures d'estomac intermittentes, une dose unique de 75 mg a permis de soulager les symptômes en moins de 30 minutes, et ce soulagement s'est maintenu pendant les 4 heures qu'a duré la période d'évaluation.

Des volontaires traités par une dose orale de ranitidine n'ont pas signalé d'effets secondaires significatifs sur l'appareil digestif ni sur le SNC; de plus, le pouls, la tension artérielle, l'ÉCG et l'ÉEG n'ont pas été modifiés de façon significative chez l'homme après administration de ranitidine. Chez des volontaires en bonne santé et chez les patients, la ranitidine administrée par voie orale n'a pas influencé les taux plasmatiques des hormones suivantes: cortisol, testostérone, œstrogènes, hormone de croissance, folliculostimuline, lutéinostimuline, thyroestimuline, aldostérone ou gastrine; bien que, comme la cimétidine, la ranitidine réduise la sécrétion de vasopressine. Le traitement, d'une durée maximale de 6 semaines, à l'aide de 150 mg de ranitidine administrée 2 fois/jour par voie orale, n'a pas modifié les axes hypothalamo-hypophyso-testiculaire-ovarien ou surrénalien humains.

L'innocuité et l'efficacité de 75 mg de ranitidine pour le traitement des brûlures d'estomac intermittentes ont été établies dans le cadre de 2 vastes études de phase III réalisées en parallèle auprès de 2985 patients. Ces 2 études de base ont permis de démontrer qu'un comprimé de ranitidine à 75 mg était statistiquement et cliniquement supérieur à un placebo pour soulager les brûlures d'estomac intermittentes après 30 minutes.

Tableau 2. Changements sur le plan de l'acidité et du pH intragastriques					
	Pourcentage médian de diminution de l'acidité			pH intragastrique médian	
	Total	Jour^a	Nuit^a	Jour^a	Nuit^a
Ranitidine à 75 mg (n = 75)	44,1 % †	63,1 % †	21,2 % †	2,10*	1,80*
Famotidine à 10 mg (n = 22)	38,9 %	58,9 %	20,1 %	2,06*	1,90
Cimétidine à 200 mg (n = 52)	23,0 %	37,8 %	1,8 %	1,69*	1,77
Placebo (n = 75)				1,48	1,70

* p < 0,05 comparativement au groupe placebo correspondant.
† p < 0,05 comparativement au groupe cimétidine correspondant.
^a Jour = de 12 h 30 à 22 h 30; nuit = de 22 h 30 à 8 h 30.

Lors de deux essais subséquents du traitement des brûlures d'estomac visant à évaluer le soulagement total de la douleur, il a été démontré que les doses de 75 mg et de 150 mg de ranitidine étaient significativement supérieures au placebo sur le plan statistique, tel que l'indique le tableau ci-dessous.

Le Tableau 3 présente les données totalisées pour la variable principale d'efficacité sur le plan du soulagement total de la douleur (score TOTPAR) lors du premier épisode traité, ainsi que les valeurs *p* associées.

Tableau 3. Variable principale pour les données totales de traitement (sujets retenus pour l'essai clinique)

Variable d'efficacité	Ranitidine à 150 mg (n = 637)	Ranitidine à 75 mg (n = 637)	Placebo (n = 635)	Ranitidine à 75 mg vs placebo (valeur <i>p</i>)	Ranitidine à 150 mg vs placebo (valeur <i>p</i>)	Ranitidine à 150 mg vs ranitidine à 75 mg (valeur <i>p</i>)
TOTPAR pour le 1 ^{er} épisode traité par médicament (moyenne)	20,8	20,4	18,3	< 0,001	0,004	0,673

L'innocuité et l'efficacité de la ranitidine à 150 mg pour prévenir ou réduire la sévérité des brûlures d'estomac provoquées par les repas, lorsqu'elle est prise immédiatement avant la consommation d'aliments ou de boissons susceptibles de déclencher de tels symptômes, a été

étudiée au cours d'études de réplication randomisées de phase III (2 études de base et une étude d'appui) multicentriques, à double insu, contre placebo et bien contrôlées, portant sur 2484 patients. Les résultats des 2 études de base et de l'étude d'appui sont résumés dans les tableaux suivants.

Tableau 4. Données totales sur la prévention pour les variables clés d'efficacité (sujets retenus pour l'essai clinique) – Études de base

Variable d'efficacité	Ranitidine à 150 mg (n = 518)	Ranitidine à 75 mg (n = 524)	Placebo (n = 521)
ASC – Repas avec traitement (mm·hr)	87,0 ± 3,96*†	91,1 ± 3,84* ^a	107,5 ± 4,17
Réduction de l'ASC – Repas avec traitement (%)	49,1 ± 2,44*	44,0 ± 2,29* ^b	32,7 ± 2,93
Sévérité maximale des brûlures d'estomac – Repas avec traitement (mm)	40,2 ± 1,29*	41,6 ± 1,23* ^c	47,0 ± 1,28
Réduction maximale des brûlures d'estomac (%)	42,6 ± 1,78*	38,7 ± 1,73* ^d	31,2 ± 1,79
Périodes consécutives les plus longues sans brûlures d'estomac	5,3 ± 0,24*	4,7 ± 0,23	4,2 ± 0,22

*p < 0,05 vs placebo; †p < 0,05 vs ranitidine à 75 mg; ^an = 520; ^bn = 518; ^cn = 521; ^dn = 519.

Tableau 5. Données totales sur la prévention pour les variables clés d'efficacité (sujets retenus pour l'essai clinique) – Étude d'appui

Variable d'efficacité	Ranitidine à 150 mg (n = 306)	Ranitidine à 75 mg (n = 309)	Placebo (n = 306)
ASC – Repas avec traitement (mm·hr)	94,6 ± 5,91	88,6 ± 4,97	98,8 ± 4,83
Réduction de l'ASC – Repas avec traitement (%)	45,4 ± 3,08	43,4 ± 3,20	39,2 ± 3,05
Sévérité maximale des brûlures d'estomac – Repas avec traitement (mm)	42,4 ± 1,80	43,4 ± 1,60	46,8 ± 1,61
Réduction maximale des brûlures d'estomac (%)	39,7 ± 2,47	37,4 ± 2,30	32,8 ± 2,29
Périodes consécutives les plus longues sans brûlures d'estomac	5,5 ± 0,32*	5,2 ± 0,30	4,4 ± 0,29

*p ≤ 0,05 vs placebo

Tel que l'indiquent les données totales des 2 études présentées au Tableau 4, la ranitidine à 150 mg s'est avérée efficace pour traiter les brûlures d'estomac provoquées par un repas. La ranitidine à 75 mg s'est révélée statistiquement supérieure au placebo pour ce qui est des paramètres principaux pendant l'une des deux études de base et pour l'analyse des données totales, mais son efficacité n'a pas été aussi uniforme que celle de la ranitidine à 150 mg lors des études de base portant sur la prévention.

Pharmacocinétique

Absorption : On estime que les concentrations sériques nécessaires pour inhiber 50 % de la sécrétion d'acide gastrique stimulée sont comprises entre 36 et 94 ng/ml. Après l'administration d'une dose orale unique de 150 mg, les concentrations sériques de ranitidine se situent dans cet intervalle pendant une période pouvant atteindre 12 heures. Il existe une relation entre les concentrations plasmatiques de ranitidine et l'inhibition de la production d'acide gastrique, mais ce phénomène accuse une forte variabilité interindividuelle.

La ranitidine est absorbée en proportion de 50 % après une administration orale comparativement à une administration intraveineuse; des concentrations maximales de 440 à 545 ng/ml s'observent de deux à trois heures après une dose de 150 mg. La demi-vie d'élimination de la ranitidine est comprise entre 1,5 et 3 heures.

Des doses de ranitidine inférieures aux doses prescrites réduisent significativement l'acidité intragastrique stimulée par la prise de nourriture chez l'humain. Cet effet est relié à la dose et l'acidité diminue de façon linéaire avec l'augmentation des doses de ranitidine.

La ranitidine est très rapidement absorbée après une injection intramusculaire. Des concentrations maximales de 576 ng/ml s'observent dans un intervalle de 15 minutes ou moins après une dose de 50 mg administrée par voie intramusculaire. L'absorption à partir des sites d'injection intramusculaire est pratiquement totale, avec une biodisponibilité de 90 à 100 % comparativement à l'administration intraveineuse.

Distribution : Le volume de distribution est de 1,4 L/kg Le taux de fixation aux protéines sériques est de 15 % en moyenne.

Métabolisme : L'effet antisécrétoire des métabolites de la ranitidine a été étudié. Chez l'humain, autant le dérivé N-oxyde, principal métabolite urinaire (4 % de la dose) que le dérivé S-oxyde (1 %) possèdent une faible activité de blocage des récepteurs H₂, mais la desméthylranitidine (1 %) est seulement 4 fois moins puissante que la ranitidine chez le rat et deux fois moins puissante que la ranitidine chez le chien.

Excrétion : La principale voie d'élimination est la voie urinaire. Approximativement 30 % de la dose administrée par voie orale se retrouve dans l'urine dans un délai de 24 heures sous forme inchangée. La clairance rénale est d'environ 530 ml/min, ce qui indique une excrétion tubulaire active, avec une clairance totale de 760 ml/min.

Populations particulières et états pathologiques

Insuffisance hépatique : Des études indiquent qu'il se produit des modifications mineures, bien que cliniquement insignifiantes, de la demi-vie, de la distribution, de la clairance et de la biodisponibilité de la ranitidine chez les sujets atteints de dysfonction hépatique (cirrhose compensée).

Insuffisance rénale : La ranitidine est éliminée par les reins; en présence d'insuffisance rénale grave, les taux plasmatiques de ranitidine augmentent et l'élimination s'en trouve prolongée. Par conséquent, on recommande aux patients, en pareils cas, d'utiliser ZANTAC sous la surveillance d'un médecin.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Conserver entre 15 et 30 °C, à l'abri de l'humidité excessive. Les comprimés à saveur de menthe fraîche doivent aussi être protégés de la chaleur.

FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

	Ingrédient médicamenteux	Ingrédients non médicamenteux
Comprimés ZANTAC (75 mg)	84 mg de chlorhydrate de ranitidine (75 mg de ranitidine anhydre sous forme de base libre).	Comprimé : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium. Enrobage : dioxyde de titane, hypromellose, oxyde de fer et triacétine.
Comprimés ZANTAC Dose maximum sans ordonnance (150 mg)	168 de chlorhydrate de ranitidine (150 mg de ranitidine anhydre sous forme de base libre).	Comprimé : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium. Enrobage : – <u>comprimés non aromatisés</u> : dioxyde de titane, hypromellose, oxyde de fer et triacétine. – <u>comprimés Menthe fraîche</u> : AD&C bleu no 1/bleu brilliant FCF sur substrat d'aluminium, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hypromellose, saveur de menthe, saveur de menthe poivrée, stéarate de magnésium, sucralose, triacétine, triméthyl isopropyl butanamide

Les comprimés ZANTAC et ZANTAC Dose maximum sans ordonnance ne contiennent ni saccharose, ni gluten, ni sodium.

Comprimés ZANTAC

Comprimés roses à 5 côtés, biconvexes, pelliculés, portant sur une face l'empreinte « Z » et sur l'autre « 75 », offerts en plaquettes alvéolées de 10 et 30 unités et en flacons de 60 unités.

Comprimés ZANTAC Dose maximum sans ordonnance :

Comprimés non aromatisés : Comprimés rose foncé à 5 côtés, biconvexes, pelliculés, portant sur une face l'empreinte « Z » et sur l'autre « 150 », offerts en plaquettes alvéolées de 3, 8, 24 et 30 (24 + 6) unités et en flacons de 50, 65, 84 et 130 (2 x 65) unités.

Comprimés Menthe fraîche : Comprimés bleus à 5 côtés, biconvexes, pelliculés et à saveur de menthe, portant sur une face l'empreinte « Z » et sur l'autre « 150 », offerts en plaquettes alvéolées de 24, 48 et 80 unités.


PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance pharmaceutique

Dénomination commune :	chlorhydrate de ranitidine	
Nom chimique :	chlorhydrate de (n-{2-[(5-[(diméthylamino)-méthyl]-2-furanyl)-méthyl]thio}éthyl)-n-méthyl-2-nitro-1,1-éthénédiamine.	
Formule moléculaire et masse moléculaire :	$C_{13}H_{22}N_4O_3SHCl$	350,87 (sous forme de sel de chlorhydrate)

Formule développée :



Propriétés physicochimiques : Le chlorhydrate de ranitidine est une substance granuleuse blanche ou jaune pâle pratiquement inodore. À la température ambiante, le chlorhydrate de ranitidine est soluble dans l'eau, le méthanol, l'éthanol et le chloroforme.

PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

Pharmacologie animale

La ranitidine est un puissant antagoniste compétitif, réversible et sélectif de l'histamine au niveau des récepteurs H_2 in vitro et in vivo. Ainsi, elle exerce un effet antagoniste sur les actions de l'histamine sur les récepteurs H_2 dans l'utérus isolé de rate et l'oreillette isolée de cobaye. La ranitidine n'est pas une substance anticholinergique. Sur une base molaire, son activité est 4 à 5 fois plus élevée que celle de la cimétidine, avec une valeur pA_2 de 7,2. À des concentrations 1000 fois supérieures que celles requises pour bloquer les récepteurs H_2 , elle n'a bloqué ni les récepteurs H_1 ni les récepteurs muscariniques dans l'iléon isolé de cobaye. En outre, la ranitidine

n'a pas modifié l'activité des récepteurs bêta-adrénergiques de l'utérus de rate et de l'oreillette de cobaye en réponse à l'isoprénaline.

Le blocage des récepteurs histaminiques H₂ in vivo dans l'estomac est l'effet pharmacologique de la ranitidine qui possède plus grande pertinence immédiate sur le plan clinique. Chez le rat et le chien, la ranitidine inhibe la sécrétion gastrique induite par divers sécrétagogues.

Chez le chien conscient porteur d'une poche Heidenhain, la ranitidine administrée par voie orale ou intraveineuse a exercé un effet antagoniste sur la sécrétion d'acide gastrique déclenchée par l'histamine, la pentagastrine et le bétanéchol. L'activité de la ranitidine était 5 à 10 fois plus élevée que celle de la cimétidine. Toutefois, les deux substances avaient les mêmes courbes d'activité en fonction du temps. La ranitidine a par ailleurs inhibé la sécrétion gastrique déclenchée par la prise de nourriture chez le chien conscient porteur d'une fistule.

La ranitidine a inhibé la sécrétion d'acide dans l'estomac perfusé chez le rat anesthésié, ainsi que la formation de lésions gastriques induite par l'acide acétylsalicylique chez le rat conscient, aussi bien en présence qu'en l'absence d'un excès d'acide chlorhydrique. La mesure du rapport entre le débit sanguin dans la muqueuse et la sécrétion d'acide montre que l'effet inhibiteur de la ranitidine sur la sécrétion d'acide gastrique ne peut être attribué à une modification du débit sanguin.

On n'a observé aucun effet comportemental chez la souris et le rat après l'administration orale de 800 mg/kg de ranitidine. Les chiens et les chats ayant reçu de la ranitidine à raison de 80 mg/kg par voie orale n'ont manifesté aucun effet comportemental compatible avec un effet sur le système nerveux central, bien qu'à cette plage de doses on ait constaté, chez le chien, des signes de vasodilatation périphérique et d'irritation cutanée dues à une libération d'histamine. La coadministration de ranitidine avec des préparations modulatrices du SNC (codéine, hexobarbital, alcool éthylique, chlordiazépoxyde, chlorpromazine, imipramine, méthyldopa, réserpine, apomorphine ou pentylènetétrazol) n'a donné lieu à aucune modification des effets pharmacologiques de l'une ou de l'autre substance.

Administrée par perfusion intraveineuse à une dose correspondant à 45 fois la dose efficace moyenne (DE₅₀) pour obtenir un effet antisécrétoire, la ranitidine n'a pas eu d'effet sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle ni l'électrocardiogramme chez le chien anesthésié. Elle n'a pas perturbé la fonction respiratoire lorsqu'elle a été administrée par voie orale chez la souris, le rat, le lapin, le chat et le chien, ainsi que par voie intraveineuse chez le chien.

Chez le chien conscient, la ranitidine n'a eu aucun effet notable sur la tension artérielle ni la fréquence cardiaque lorsqu'elle a été administrée par voie orale à des doses de 10 mg/kg. On a observé des chutes de courte durée de la tension diastolique après une dose intraveineuse de 10 mg/kg, soit 370 fois la dose antisécrétoire. On n'a toutefois noté aucun signe d'arythmie ni anomalie électrocardiographique.

Les études sur la toxicité à long terme montrent que la ranitidine est dépourvue d'activité anti-androgène et qu'elle ne déloge pas la dihydrotestostérone liée aux sites de liaison des androgènes. L'administration de métoprolol, d'atropine ou d'acide acétylsalicylique n'a entraîné aucune modification de l'activité antisécrétoire de la ranitidine chez le rat.

L'effet de la ranitidine sur les médicaments anti-inflammatoires est variable. Elle n'a eu aucun effet sur l'effet anti-inflammatoire de la prednisolone, mais a augmenté l'effet anti-inflammatoire de l'indométhacine. L'administration de ranitidine a réduit la fréquence des érosions gastriques induites par l'acide acétylsalicylique et l'indométhacine. L'effet antinociceptif de l'acide acétylsalicylique a été réduit après l'administration de ranitidine.

Contrairement à la cimétidine, la ranitidine n'inhibe pas le système oxygénase mixte hépatique. Les études d'interaction spectrale ont montré que, alors que la cimétidine se lie fortement au cytochrome P₄₅₀, la ranitidine n'a qu'une faible activité pour cette enzyme. La cimétidine est connue pour perturber le métabolisme du pentobarbital et de la warfarine. À des doses ayant atteint 166 mg/kg chez le rat, la ranitidine n'a pas eu d'effet sur la durée du sommeil induit par le pentobarbital ni sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de la warfarine.

Métabolisme, distribution et élimination

Le métabolisme du chlorhydrate de ranitidine a été étudié chez quatre espèces d'animaux de laboratoire (la souris, le rat, le lapin et le chien) par marquage radioactif. Le médicament a été rapidement absorbé après l'administration orale. Chez la souris, le rat et le lapin, une proportion de 30 à 60 % de la radioactivité administrée a été excrétée dans l'urine, le reste ayant été récupéré dans les selles.

Chez la souris, 47 % de la radioactivité s'est retrouvée dans l'urine au bout de 24 heures. Chez le rat, la ranitidine était essentiellement métabolisée par N-déméthylation. Trente pour cent de la dose administrée était excrétée dans l'urine sous forme inchangée, jusqu'à 14 % sous forme de desméthylranitidine, de 3 à 6 % sous forme de dérivé N-oxyde et 4 % sous forme de dérivé S-oxyde. Dans la bile du rat, les principales substances radioactives étaient la ranitidine ainsi qu'un métabolite non identifié baptisé « métabolite d'excrétion rapide » (MER), qui était probablement un complexe de transfert de charge constitué de ranitidine et de pigments biliaires.

Chez le lapin, la ranitidine était essentiellement métabolisée par sulfoxydation; 18 % de la dose administrée a été excrétée dans l'urine sous forme de ranitidine non métabolisée, 8 % sous forme de dérivé S-oxyde, de 2 à 4 % sous forme de dérivé N-oxyde et de 2 à 4 % sous forme de desméthylranitidine.

Chez le chien, jusqu'à 70 % de la dose administrée a été excrétée au cours des 24 premières heures. Environ 40 % du médicament a été excrété dans l'urine sous forme de ranitidine inchangée, et jusqu'à 30 % sous forme de dérivé N-oxyde, la N-oxydation étant la principale voie métabolique de la ranitidine chez le chien. La forme N-oxyde était par ailleurs la principale substance radioactive retrouvée dans la bile, avec de petites quantités de ranitidine sous forme inchangée et de MER.

Chez le rat, le lapin et le chien, moins de 10,1 % de la ranitidine plasmatique est liée aux protéines. Plus de 99 % de la radioactivité avait disparu de l'organisme dans un délai de un à sept jours après l'administration du médicament radiomarqué chez le rat et le chien. Comme c'est le cas pour de nombreux autres médicaments, la radioactivité a persisté dans le tractus uvéal chez ces deux espèces, la demi-vie de la radioactivité dans le tractus uvéal chez le chien étant de l'ordre de 6 mois. La ranitidine et le dérivé S-oxyde possèdent une plus grande affinité pour la mélanine que le métabolite desméthyle; le dérivé N-oxyde ne s'y lie que dans une faible mesure.

Le transfert placentaire de la ranitidine radioactive et de ses métabolites a été étudié chez la femelle gravide du rat et du lapin. L'autoradiographie du corps entier chez le fœtus de rat et de lapin a montré que de faibles niveaux de radioactivité étaient présents dans le tractus uvéal de l'œil fœtal chez les deux espèces, dans la vésicule biliaire et l'intestin chez le fœtus du lapin et dans la vessie chez le fœtus du rat. De la radioactivité a également été détectée chez le rat dans les glandes salivaires et mammaires de la mère et dans le lait maternel, bien qu'en de très faibles concentrations.

Pharmacocinétique humaine

On estime que les concentrations sériques nécessaires pour inhiber 50 % de la sécrétion d'acide gastrique stimulée sont comprises entre 36 et 94 ng/ml. Après l'administration d'une dose orale unique de 150 mg, les concentrations sériques de ranitidine se situent dans cet intervalle pendant une période pouvant atteindre 12 heures. Il existe une relation entre les concentrations plasmatiques de ranitidine et l'inhibition de la production d'acide gastrique, mais ce phénomène accuse une forte variabilité interindividuelle.

Des doses de ranitidine inférieures aux doses prescrites réduisent significativement l'acidité intragastrique stimulée par la prise de nourriture chez l'humain. Cet effet est relié à la dose et l'acidité diminue de façon linéaire avec l'augmentation des doses de ranitidine.

La ranitidine est absorbée en proportion de 50 % après une administration orale comparativement à une administration intraveineuse; des concentrations maximales de 440 à 545 ng/ml s'observent de deux à trois heures après une dose de 150 mg. La demi-vie d'élimination de la ranitidine est comprise entre 1,5 et 3 heures.

La pharmacocinétique de la ranitidine a également été étudiée à des doses plus faibles. Les concentrations plasmatiques maximales et l'aire sous la courbe concentration-temps (ASC) ont montré qu'il existe une association linéaire sur l'intervalle de doses variant de 20 à 80 mg; la T_{max} , le $t_{1/2}$ et la clairance étaient indépendantes de la dose.

La ranitidine est très rapidement absorbée après une injection intramusculaire. Des concentrations maximales de 576 ng/ml s'observent dans un intervalle de 15 minutes ou moins après une dose de 50 mg administrée par voie intramusculaire. L'absorption à partir des sites d'injection intramusculaire est pratiquement totale, avec une biodisponibilité de 90 à 100 % comparativement à l'administration intraveineuse.

La principale voie d'élimination est la voie urinaire. Approximativement 30 % de la dose administrée par voie orale se retrouve dans l'urine dans un délai de 24 heures sous forme inchangée. La clairance rénale est d'environ 530 ml/min, ce qui indique une excrétion tubulaire active, avec une clairance totale de 760 ml/min. Le volume de distribution est de 1,4 L/kg. Le taux de fixation aux protéines sériques est de 15 % en moyenne.

Des études indiquent qu'il se produit des modifications mineures, bien que cliniquement insignifiantes, de la demi-vie, de la distribution, de la clairance et de la biodisponibilité de la ranitidine chez les sujets atteints de dysfonction hépatique (cirrhose compensée).

L'effet antisécrétoire des métabolites de la ranitidine a été étudié. Chez l'humain, autant le dérivé N-oxyde, principal métabolite urinaire (4 % de la dose) que le dérivé S-oxyde (1 %) possèdent une faible activité de blocage des récepteurs H₂, mais la desméthylranitidine (1 %) est seulement 4 fois moins puissante que la ranitidine chez le rat et deux fois moins puissante que la ranitidine chez le chien.

TOXICOLOGIE

Animaux

Toxicologie, altération de la fertilité, carcinogénèse et mutagénèse

Le chlorhydrate de ranitidine a été soumis à des études de toxicologie poussées, qui ont démontré qu'elle n'a pas d'organe cible spécifique et ne comporte aucun risque particulier du point de vue de l'emploi clinique.

Études de toxicité aiguë

Chez la souris et le rat, la dose létale moyenne (DL₅₀) associée à la voie intraveineuse est de l'ordre de 75 mg/kg, alors que pour la voie orale, même des doses de 1000 mg/kg ne sont pas létales. Chez le chien, la dose létale minimum par voie orale est de 450 mg/kg/jour. Des doses élevées uniques de ranitidine (jusqu'à 80 mg/kg par voie orale) ne sont associées qu'à des signes de toxicité minimales et réversibles, dont certains sont dus à la libération transitoire d'histamine.

Études de toxicité à long terme

Dans les études de carcinogénicité et de toxicité à long terme, de très fortes doses de ranitidine (jusqu'à 2000 mg/kg/jour) ont été administrées quotidiennement à des souris pendant toute la durée de vie des animaux, et à des chiens (jusqu'à 450 mg/kg/jour) pendant des périodes ayant atteint un an.

Ces doses ont donné lieu à des concentrations plasmatiques massives de ranitidine excédant de loin celles mesurées chez des patients ayant reçu le médicament à la dose thérapeutique recommandée. Par exemple, chez le chien, les concentrations plasmatiques maximales étaient supérieures à 115 µg/ml, tandis que chez la souris, les concentrations plasmatiques basales étaient de l'ordre de 4 à 9 µg/ml. Chez l'humain, après l'administration orale de 150 mg de ranitidine, la concentration plasmatique maximale moyenne (C_{max}) se situait entre 360 et 650 ng/ml. Chez le rat, des doses aussi élevées que 2 000 mg/kg/jour ont été bien tolérées, les

seules modifications morphologiques observées ayant été une incidence accrue d'accumulations de cellules spumeuses (macrophages) dans les alvéoles pulmonaires. Ces accumulations de cellules constituent un phénomène naturel chez les rats âgés, et ont en outre été observées avec l'administration prolongée de diverses autres substances médicamenteuses. Par conséquent, il est peu probable que les concentrations pharmacologiques de ranitidine administrées à ces rats ont contribué à ce processus naturel.

Au cours des études menées chez le chien avec des doses (100 mg/kg/jour) administrées par voie orale pendant six semaines ou six mois, on a observé des selles molles à l'occasion, alors que dans l'étude de six mois, les selles molles se sont accompagnées dans huit cas de matières muqueuses et parfois de sang, surtout chez un chien. Des selles molles, de la salivation et des vomissements ont été observés dans une étude de 54 semaines chez le chien.

Dans des cas isolés, on a observé des selles rouges chez le chien, dans lesquelles on a détecté du sang occulte à l'occasion. Lorsque la dose a été portée de 100 mg/kg/jour à 225-450 mg/kg/jour, aucun cas de selles rouges n'a été relevé, ce qui semble indiquer qu'une relation avec la ranitidine est peu probable. L'autopsie des chiens n'a mis en évidence aucune modification du tractus gastro-intestinal associée avec la ranitidine.

Un chien a présenté une élévation des taux plasmatiques d'alanine-aminotransférase et de phosphatase alcaline au cours de l'étude de six semaines. On a par ailleurs trouvé quelques foyers de nécrose hépatique chez le même chien. De petites lésions de fibrose et de nécrose focale ont également été observées dans un spécimen hépatique prélevé chez un chien femelle ayant reçu de la ranitidine à raison de 100 mg/kg pendant six mois. Aucune autre modification n'a été relevée lors de l'examen au microscope photonique et électronique dans les foies traités et témoins. Étant donné que les foyers lésionnels n'ont été observés que chez un seul chien et dans un seul spécimen hépatique prélevé chez ce chien, on peut supposer qu'ils n'ont pas été causés par la ranitidine.

Des tremblements musculaires, une incapacité de se tenir sur pattes et une accélération de la fréquence respiratoire ont été observées à l'occasion chez des chiens ayant reçu 225 mg/kg/jour de ranitidine au cours de l'étude de 54 semaines. La prévalence de ces observations a augmenté lorsque la dose a été portée au niveau toxique de 450 mg/kg/jour. Un chien est mort, mais on n'a pu relever aucune modification pathologique ni identifier la cause du décès.

Des modifications de la couleur ou de la granularité du tapis choroïdien de l'œil ont été observées chez trois chiens ayant reçu la dose la plus élevée de ranitidine (450 mg/kg/jour) au cours de l'étude de 54 semaines. Chez un de ces chiens, la modification a été considérée comme étant associée au traitement. Il s'agissait d'une pâleur réversible du tapis choroïdien. Aucune modification n'a été observée lors de l'examen des yeux au microscope photonique ou électronique. Les modifications du tapis choroïdien sont dépourvues de signification clinique chez l'humain étant donné que 1) il n'existe pas de tapis choroïdien chez l'humain et 2) ces modifications ne sont apparues qu'à des concentrations pharmacologiques toxiques de ranitidine.

Les concentrations sériques moyennes de transaminase glutamique pyruvique chez les chiens ayant reçu la dose de 450 mg/kg/jour étaient significativement plus élevées, bien que

marginalement, que les valeurs témoins. Ces élévations des concentrations enzymatiques n'ont été associées à aucune modification histologique.

On a effectué des études dans lesquelles la ranitidine a été administrée par voie parentérale. Aucun signe d'irritation locale spécifique attribuable à la ranitidine n'a été observé. Chez le rat, aucune modification biochimique ou histopathologique n'a été observée à des doses intraveineuses ayant atteint 20 mg/kg. Plus particulièrement, on n'a relevé aucune modification des veines ou des structures sous-épidermiques. De légères lésions dans quelques échantillons musculaires ont été observées : dans l'ensemble, les cellules étaient basophiles et plus petites que normalement et les noyaux étaient dilatés, plus nombreux, et avaient parfois migré au centre des cellules. Chez le lapin, une légère infiltration du pannicule adipeux par des cellules mononucléées a été notée. Cette réaction sous-cutanée mineure était peu fréquente et n'a pas été associée à une distribution de groupe. Il n'y avait aucune différence apparente sur le plan de l'irritation entre l'injection de ranitidine et celle de placebo. Chez le rat, la ranitidine administrée par voie intraveineuse à des doses de 5,0 et de 10,0 mg/kg/jour pendant 15 jours et 28 jours respectivement n'a produit aucune modification d'importance biologique reliée au traitement sur le système hématopoïétique.

Chez le chien Beagle, l'injection intraveineuse de ranitidine à des doses ayant atteint 10 mg/kg/jour pendant 28 et 42 jours n'a donné lieu à aucune modification des érythrocytes ou des leucocytes circulants reliée au médicament, et n'a eu aucun effet indésirable sur le système hématopoïétique. Aucune modification reliée au médicament n'est apparue sur les électrocardiogrammes des chiens Beagle qui ont reçu jusqu'à 10 mg/kg de ranitidine par injection intraveineuse. À des doses ayant atteint 30 mg/kg administrées par voie intraveineuse deux fois par jour à des chiens Beagle pendant 14 ou 15 jours, la ranitidine n'a produit aucune modification biologiquement significative sur le plan de l'hématologie, de la chimie clinique ou de l'analyse des urines.

Aucune modification n'a été observée dans les yeux des chiens (plus particulièrement dans le tapis choroïdien) à qui on avait administré de la ranitidine à des doses ayant atteint 30 mg/kg, deux fois par jour, pendant 15 jours. À des doses supérieures à 1,25 mg/kg, la ranitidine injectée par voie intraveineuse chez le chien Beagle a produit des réactions immédiates et transitoires. Les réactions suivantes ont été typiquement observées à la suite de l'administration de 1,25 mg/kg de ranitidine : yeux injectés de sang, yeux larmoyants et fermés, défécation, diarrhée, érythème, flatuosités, léchage des lèvres, rhinorrhée, salivation, comportement soumis, déglutition, tachycardie et tremblements. La gamme et la gravité des effets étaient aggravées lors de l'augmentation de la dose.

Études sur la reproduction (altération de la fertilité)

Des études ont été effectuées sur la reproduction chez le rat et le lapin. Les rats ont été exposés à la ranitidine avant et après l'accouplement, pendant toute la grossesse, la lactation et pendant la période de sevrage. Aucun effet sur la reproduction ni aucun signe d'effet anti-androgénique n'a été observé.

Des études effectuées sur un effectif total de 2297 fœtus de rats n'ont mis en évidence aucun signe de tératogénicité chez cette espèce. Des fentes palatines ont été observées chez des fœtus dans les groupes traités et témoin, mais elles étaient significativement plus nombreuses dans le groupe témoin. Au total, 944 fœtus de lapins traités par la ranitidine ont été examinés; aucun effet indésirable relié au médicament ni anomalie fœtale n'a été recensé.

Des lapins à qui on avait administré de la ranitidine injectée en bolus intraveineux (10 mg/kg) une fois par jour aux jours 7 à 16 de la gestation ont subi une baisse du gain de poids corporel. Le poids des fœtus était significativement plus faible que chez les témoins non traités. En outre, 12,4 % des fœtus exposés à la ranitidine avaient une fente palatine. Lors d'une nouvelle analyse effectuée sur cette étude ainsi qu'une étude connexe visant à évaluer les effets du médicament sur la reproduction, on a conclu que ces résultats n'étaient pas reproductibles. Par conséquent, les effets observés dans cette première étude sont aberrants et ne peuvent permettre de conclure à une toxicité maternelle ou fœtale du médicament.

Dans la deuxième étude, aucun signe de toxicité maternelle ou fœtale n'a été observé chez les lapins ayant reçu 100 mg/kg de ranitidine par voie orale au cours des jours 2 à 29 de la grossesse. Les concentrations plasmatiques maximales de ranitidine après une dose orale de 100 mg/kg sont similaires à celles obtenues une minute après l'administration intraveineuse d'une dose de 10 mg/kg (20 à 25 µg/ml). Ainsi, aucun effet tératogène de la ranitidine n'a pu être mis en évidence aux doses de 10 mg/kg (voie intraveineuse) et de 100 mg/kg (comprimés) chez le lapin.

Études sur la carcinogénicité

Rien n'indique que la ranitidine aurait un pouvoir carcinogène. Dans les études de toxicité et de carcinogénicité à long terme, la ranitidine a été administrée à 600 souris et à 636 rats à des doses ayant atteint 2000 mg/kg pendant deux ans et 129 semaines, respectivement; elle a également été administrée à 42 chiens à des doses ayant atteint 450 mg/kg/jour durant des périodes ayant atteint un an. Ces doses sont de loin supérieures aux doses thérapeutiques chez l'humain. Aucun cas de métaplasie intestinale n'a été constaté chez ces animaux. On n'a relevé aucun signe d'effet tumorigène de la ranitidine sur quelque tissu que ce soit.

Mutagenèse

La ranitidine n'est pas mutagène à des doses aussi élevées que 30 mg par boîte de Petri dans le test de Ames sur *Salmonella typhimurium* (TA 1538, TA 98, TA 100 et TA 1537) ou à des doses de 9 mg par boîte de Petri chez *Escherichia coli* (WP2 et WP2 uvrA), avec ou sans activation.

La ranitidine a exercé un léger effet mutagène direct chez *S. typhimurium* TA 1535 à des concentrations de 20 à 30 mg par boîte de Petri, et chez *E. coli* WP67 à une concentration de 9 mg par boîte de Petri. ZANTAC n'était pas mutagène à la concentration de 2 mg/ml chez *E. coli* ni chez *S. typhimurium* dans le test de la fluctuation du microtitre en solution orale, plus sensible. Ce léger effet mutagène direct est toutefois dépourvu de pertinence sur le plan clinique : les magnitudes de concentration de ranitidine utilisées dans ces tests sont plusieurs milliers de fois supérieures aux concentrations thérapeutiques dans le plasma humain.

Les principaux métabolites de la ranitidine chez l'humain n'étaient pas significativement mutagènes. Cette conclusion repose sur l'expérience suivante. Une solution test obtenue en faisant interagir la ranitidine (10 mM) avec du nitrite de sodium (40 mM) était mutagène chez *S. typhimurium* TA 1535, mais pas chez *S. typhimurium* TA 1537 ni chez *E. coli* (WP67 ou WP2 uvrA). Ce résultat positif a été attribué à la présence du dérivé acide nitrosonitrolique AH 23729, qui est mutagène. Lorsque la concentration de nitrite de sodium a été réduite à 15 mM ou moins, la solution n'était pas mutagène, quel que soit le test ou le micro-organisme employé. La formation de AH 23729 nécessite des concentrations d'acide nitreux de loin supérieures à celles que l'on pourrait rencontrer en conditions physiologiques. Les autres produits de nitrosation n'étaient mutagènes dans aucun des micro-organismes étudiés. Il n'y a donc aucune raison de supposer que la ranitidine est susceptible d'avoir un pouvoir mutagène chez l'animal ou chez l'humain à la suite d'une nitrosation dans l'estomac.

Les études de toxicologie, de carcinogénicité et de mutagénicité à long terme effectuées chez l'animal n'ont livré aucune donnée montrant que la ranitidine, administrée aux doses thérapeutiques, aurait un quelconque effet délétère chez l'humain.

RÉFÉRENCES

1. Andersen M, Schou JS. Adverse reactions to H₂-receptor antagonists in Denmark before and after transfer of cimetidine and ranitidine to over-the-counter status. *Pharmacol Toxicol* 1991; 69:253-8.
2. Boehning W. Effect of cimetidine and ranitidine on plasma theophylline in patients with chronic obstructive airways disease treated with theophylline and corticosteroids. *Eur J Clin Pharmacol* 1990; 38:43-5.
3. Bye A, Lacey LF, Lettis S, Dixon JS, Felgate LA. Effect of ranitidine (150mg bd) on the pharmacokinetics of increasing doses of alcohol (0.15, 0.3, 0.6g/kg). *Am J Gastroenterol* 1993; 88: 1590 A437.
4. Callaghan JT, Nyhart EH. Drug interactions between H₂-blockers and theophylline or warfarin. *Pharmacologist* 1988; 30:A14.
5. Das AF, Freston JW, Jacobs J, Fox NA, Morton RE. An evaluation of safety in 37,252 patients treated with cimetidine or ranitidine. *Internal Medicine* 1990; 11:127-49
6. Dent J, Dodds WJ, Friedman RH et al,. Mechanism of gastroesophageal reflux in recumbent asymptomatic human subjects. *J Clin Invest* 1980; 65: 256-67.
7. Desmond PV, Mashford ML, Harman PJ et al. Decreased oral warfarin clearance after ranitidine and cimetidine. *Clin Pharmacol Ther* 1984; 35:338-41.
8. Eandi M, De Carli GF, Recchia G, Colonna CV. Ranitidine : Eight years of post-marketing drug surveillance. *Post Marketing Surveillance* 1990; 4:1-8.
9. Furman D, Mensh R, Winan G *et al*: A double-blind trial comparing high dose liquid antacid to placebo and cimetidine in improving symptoms and objective parameters in gastroesophageal reflux. *Gastroenterol* 1982; 82; 1062.
10. Garcia - Rodriguez LA, Jick H. Risk of gynaecomastia associated with cimetidine, omeprazole, and other anti-ulcer drugs. *Brit Med J* 1994; 308: 503-6.
11. Graham DY, Patterson DJ: Double-blind comparison of liquid antacid and placebo in the treatment of symptomatic reflux oesophagitis. *Dig Dis Sci* 1983; 28: 559-63.
12. Graham DY, Smith JL, Patterson DJ. "Why do apparently healthy people use antacid tablets?". *Am J Gastroenterol* 1983; 78: 257-60.
13. Hansten PD. 1994 Drug Interaction of H₂-receptor antagonists.

14. Inman WAW. Drug Surveillance Research Unit. University of Southampton PEM. Prescription Event Monitoring News 1983; 1:9-13.
15. Grove O, Bekker C, Jeppe-Hansen MG *et al.* Ranitidine and high-dose antacid in reflux oesophagitis. *Scand J Gastroenterol* 1985; 20: 457-61.
16. Johnsen R, Bernersen B, Straume B, Førde OH, Bostad L, Burhol PG. Prevalences of endoscopic and histological findings in subjects with and without dyspepsia. *Brit Med J* 1991; 302: 749-52.
17. Johnson CD, Milward-Sadler GH, Jones R. Endoscopic findings in patients with heartburn who have not sought medical advice. *Hellenic J Gastroenterol* 1992; 5(Suppl): 141(A563).
18. Jones RH, Lydeard SE, Hobbs FDR *et al.* Dyspepsia in England and Scotland. *Gut* 1990; 31: 401-5.
19. Jones R, Lydeard S. Prevalence of symptoms of dyspepsia in the community. *Brit Med J* 1989; 298: 30-2.
20. Kelly HW, Powell JR, Donohue JF. Ranitidine at very large doses does not inhibit theophylline elimination. *Clin Pharmacol Ther* 1986; 39:577-81.
21. Klauser AG, Schindlbeck NE, Müller-Lissner SA. Symptoms in gastro-oesophageal reflux disease. *Lancet* 1990; 335: 205-8.
22. Koss MA, Hogan DL, Lane J, Steinbach JH, Isenberg JI. Anti-secretory effects and pharmacokinetics of low dose ranitidine. *Aliment Pharmacol Ther* 1993; 7:417-22.
23. Levitt MD. Lack of clinical significance of the interaction between H₂-receptor antagonists and ethanol. *Aliment Pharmacol Ther* 1993; 7:131-8.
24. Mills JG, Clancy A, Bond B *et al.* A comparison of the effects of cimetidine, ranitidine, oxmetidine and placebo on the metabolism and clearance of racemic warfarin. *Br J Clin Pharmacol* 1986; 21:566P-567P.
25. Mitchard M, Harris A, Mullinger BM. Ranitidine drug interactions: a literature review. *Pharmacol Ther* 1987; 32: 293-325.
26. Müller-Lissner SA, Koch EMW, Geerke H. Uncomplicated gastro-oesophageal reflux disease. Symptomatic treatment with ranitidine. *Münch Med Wschr* 1992; 134: 212-5.
27. Murdoch RH, Pappa KA, Giefer EE, Payne JE, Sanders M, Sirgo M. Endoscopic findings in a target population for over-the-counter treatment of heartburn. *Gastroenterology* 1994; 106(4, pt2):A146.

28. Nebel OT, Fornes MF, Castell DO. Symptomatic gastroesophageal reflux : incidence and precipitating factors. *Dig Dis* 1976; 21: 953-6.
29. O'Reilly RA. Comparative interaction of cimetidine and ranitidine with racemic warfarin in man. *Arch Intern Med* 1984; 144:989-91.
30. Perrin VL. Safety evaluation of ranitidine in *The Clinical Use of Ranitidine - Proceedings of an International Symposium* Ed Wesdorp ICE Theracom 1982; pp48-54.
31. Ruth M, Månsson I, Sandberg N. The prevalence of symptoms suggestive of oesophageal disorders. *Scand J Gastroenterol* 1991; 26: 73-81.
32. Serlin MJ, Sibeon RG, Breckenridge AM. Lack of effect of ranitidine on warfarin action. *Br J Clin Pharmacol* 1981; 12:791-4.
33. Smith SR, Kendall MJ. Ranitidine versus cimetidine. A comparison of their potential to cause clinically important drug interactions. *Clin Pharmacokinet* 1988; 15: 44-56.
34. Sontag S, Robinson M, McCallum RW et al. Ranitidine therapy for gastro-oesophageal reflux disease. Results of a large double-blind trial. *Arch Int Med* 1987; 147: 1485-92.
35. Toon S, Hopkins KJ, Garstang FM, Rowland M. Comparative effects of ranitidine and cimetidine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in man. *Eur J Clin Pharmacol* 1987; 32:165-72.
36. Watts RW, Hetzel DJ, Bochner F et al. Lack of interaction between ranitidine and phenytoin. *Brit J Clin Pharmacol* 1983; 15:499-500.
37. Weberg R, Berstad A, Osnes M. Comparison of low-dose antacids, cimetidine and placebo on 24-hour intragastric acidity in healthy volunteers. *Dig Dis Sci* 1992; 37: 1810-14.
38. Weberg R, Berstad A: Symptomatic effect of a low-dose antacid regimen in reflux esophagitis. *Scand J Gastroenterol* 1989; 24: 401-6.
39. Wienbeck M, Berges W. Oesophageal disorders in the aetiology and pathophysiology of dyspepsia. *Scand J Gastroenterol* 1985; 20(suppl 109): 133-43.
40. Gertz B, Holland S, Kline W, Matuszewski B, Freeman A, Quan H, Lasseter K, Mucklow J, Porras A. Studies of the oral bioavailability of alendronate. *Clin Pharmacol Ther.* 1995;58:288-98.
41. Deppermann K-M, Lode H, Hoffken G, Tschink G, Kalz C, Koeppel P. Influence of ranitidine, pirenzepine, and aluminum magnesium hydroxide on the bioavailability of various antibiotics, including amoxicillin, cephalexin, doxycycline, and amoxicillin-clavulanic acid. *Anti Microb Chem.* 1989;33(11):1901-1907.

42. Grasele T, Schentag J, Sedman A, Wilton J, Thomas D Schultz R, Lebsack M, Kinkel A. Inhibition of enoxacin absorption by antacids or ranitidine. *Antimicrob Agents Chemother.* 1989;33(5):615-617.
43. Lebsack M, Nix D, Ryerson B, Toothaker R, Welage L, Norman A, Schentag J, Sedman A. Effect of gastric acidity on enoxacin absorption. *Clin Pharmacol Ther.* 1992;52:252-56.
44. Winship L, McKenney J, Wright J, Wood J, Goodman R. The effect of ranitidine and cimetidine on single-dose diltiazem pharmacokinetics. *Pharmacotherapy.* 1985;5:16-19.
45. Muirhead M, Bochner F, Somogyi A. Pharmacokinetic drug interactions between triamterene and ranitidine in humans: alterations in renal and hepatic clearances and gastrointestinal absorption. *J Pharmacol Exp Ther.* 1987 ;244(2):734-739.
46. Williams D, Feely J. Pharmacokinetic-pharmacodynamic drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors. *Clin Pharmacokinet.* 2002;41(5):343-370.
47. Chatzizisis Y, Koskinas K, Misirli G, Vaklavas C, Hatzitolios A, Giannoglou. Risk factors and drug interactions predisposing to statin-induced myopathy: implications for risk assessment, prevention and treatment. *Drug Saf.* 2010;33(3):171-187.

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS

ZANTAC®

Comprimés à 75 mg USP (sous forme de chlorhydrate de ranitidine)

Ce feuillet destiné aux consommateurs est la III^e et dernière partie d'une monographie publiée lorsque la vente de ZANTAC a été approuvée au Canada. Ce feuillet ne contient qu'un résumé et ne vous offre pas de l'information complète sur ZANTAC. Pour toute question au sujet de ce médicament, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Pourquoi utilise-t-on ce médicament?

ZANTAC est un acidoréducteur d'usage courant prescrit par les médecins partout dans le monde.

Les comprimés ZANTAC soulagent rapidement et efficacement, traitent et préviennent les symptômes suivants dus à une acidité gastrique excessive, aussi bien le jour que la nuit :

- Brûlures d'estomac
- Indigestion acide
- Dérangements et aigreurs d'estomac
- Hyperacidité

Comment agit-il?

Les comprimés ZANTAC réduisent et maîtrisent l'acidité gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures, aussi bien le jour que la nuit. Voilà ce qui fait la différence entre ZANTAC et les antiacides qui ne font que neutraliser l'acide de l'estomac. Les antiacides ne réduisent pas la production excessive d'acide gastrique.

ZANTAC commence à soulager les symptômes associés aux brûlures d'estomac, à l'indigestion acide, à l'hyperacidité ainsi qu'aux aigreurs et aux dérangements d'estomac à 30 minutes.

Les comprimés ZANTAC peuvent également prévenir efficacement la douleur, le malaise et les symptômes associés aux brûlures d'estomac et à l'indigestion acide, aux aigreurs et aux dérangements d'estomac ainsi qu'à l'hyperacidité lorsqu'on les prend de 30 à 60 minutes avant de consommer des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer des brûlures d'estomac.

Quand devrait-on éviter de le prendre?

Ne prenez pas les comprimés ZANTAC si vous êtes allergique à l'un des composants de ce produit ou si vous avez déjà fait une réaction allergique à un autre produit contenant un acidoréducteur.

Quand devriez-vous contacter votre médecin?

Contactez votre médecin si les symptômes suivants surviennent pendant ou après la prise de ZANTAC, car ces symptômes peuvent être ceux d'une réaction/affection grave:

- si vous souffrez de brûlures d'estomac accompagnées

d'étourdissements, de transpiration, de vertige ou de respiration sifflante fréquente;

- si vous souffrez de douleur à la poitrine ou aux épaules accompagnée d'essoufflement, de transpiration et de propagation de la douleur dans le cou, les bras ou les épaules.

Ingrédient médicamenteux :

Chaque comprimé ZANTAC contient 75 mg de ranitidine, sous forme de chlorhydrate de ranitidine.

Ingrédients non médicinaux importants :

Comprimés non aromatisés : cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hypromellose, oxyde de fer rouge, stéarate de magnésium, triacétine.

ZANTAC ne contient ni sodium, ni gluten, ni sucre.

Sous quelles formes se présente-t-il?

Comprimés non aromatisés: 75 mg

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Les femmes qui allaitent doivent éviter de prendre Zantac.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre ZANTAC :

- si vous souffrez d'ulcère gastrique ou duodénal;
- si vous prenez un médicament d'ordonnance pour traiter un ulcère gastrique ou tout autre médicament d'ordonnance;
- si vous avez des problèmes de cœur;
- si vous avez des problèmes de foie;
- si vous souffrez de diabète;
- si vous souffrez d'une maladie pulmonaire;
- si votre système immunitaire est affaibli;
- si vous présentez une maladie du rein;
- si vous souffrez de douleurs thoraciques;
- si vous avez de la difficulté à avaler, que cela vous fait mal, que vous vous étouffez ou que vous éprouvez un malaise ou un inconfort abdominal persistant;
- si vous avez la nausée, si vous vomissez du sang, ou si vous avez des selles sanguinolentes ou noires;
- si vos brûlures d'estomac sont fréquentes (> 3 fois par semaine) et/ou particulièrement sévères;
- si vous souffrez de brûlures d'estomac depuis plus de 3 mois;
- si vous souffrez de porphyrie (trouble sanguin rare);
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez;
- si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), car ces médicaments peuvent être à l'origine de

- vos symptômes, ou si vous prenez d'autres médicaments;
- si vous perdez du poids de façon non intentionnelle;
- si vous avez plus de 40 ans et que vous éprouvez de nouveaux symptômes de brûlures d'estomac ou d'indigestion acide ou que vous avez observé une modification récente de vos symptômes;
- si vous souffrez de tout autre trouble ou prenez des médicaments d'ordonnance et voyez un médecin régulièrement;
- si vous avez moins de 16 ans.

Si pendant le traitement vous ressentez des étourdissements, de la somnolence ou des vertiges, vous devez éviter de conduire un véhicule ou d'effectuer des tâches qui exigent de la vigilance.

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

AVANT de prendre ZANTAC, consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des antiacides, des composés d'aluminium, l'amoxicilline, l'atazanavir, l'acide clavulanique, de la cyanocobalamine, du diltiazem, de l'énoxacine, de l'erlotinib, de la fosphénytoïne, du géfitinib, du glyburide, de l'itraconazole, du kétoconazole, de l'hydroxyde de magnésium, de la metformine, du midazolam, de la pancréatine, du pancuronium, de la pentoxifylline, du posaconazole, de la procaïnamide, du sucralfate, du triazolam, de la tubocurarine et de la warfarine.

Ne prenez pas d'antiacides moins de 30 minutes à 1 heure avant ou après la prise de ZANTAC.

MODE D'EMPLOI DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

Adultes et enfants de 16 ans et plus: Prenez 1 comprimé dès l'apparition des symptômes, que ce soit le jour ou la nuit. Si les symptômes persistent pendant plus de 1 heure ou réapparaissent après 1 heure, vous pouvez prendre un deuxième comprimé.

Pour la prévention des symptômes déclenchés par la consommation d'aliments ou de boissons, prenez 1 comprimé de 30 à 60 minutes avant tout repas susceptible de provoquer ces symptômes.

Ne prenez pas plus de 2 comprimés au cours d'une période de 24 heures. Cessez l'emploi et consultez votre médecin si les symptômes empirent ou que de nouveaux symptômes se manifestent ou persistent après 14 jours de traitement.

ZANTAC et les antiacides doivent être pris à au moins 30 minutes à 1 heure d'intervalle.

Que faire pour contribuer à éviter les symptômes?

- évitez de vous allonger ou de vous pencher peu de temps après avoir mangé;
- si vous avez un surplus de poids, tentez de perdre du poids;
- si vous fumez, arrêtez complètement ou diminuez le nombre de cigarettes que vous fumez;
- interrompez ou réduisez votre consommation d'aliments tels que: boissons contenant de la caféine (café, thé et cola), chocolat, aliments frits, gras ou épicés, et alcool;
- essayez de réduire le stress dans votre vie;
- évitez de prendre de gros repas, de manger tard le soir ou juste avant de vous coucher;
- soulevez la tête de votre lit,
- optez pour des vêtements amples autour de l'abdomen (estomac).

Surdosage :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison le plus proche, même en l'absence de symptômes.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés avec ZANTAC sont les maux de tête, les nausées, les vomissements et la diarrhée.

D'autres rares effets secondaires sont observés avec l'utilisation de la ranitidine :

- Différents types d'anémie et une baisse du nombre de tous types de cellules sanguines;
- Difficulté à dormir ou avoir sommeil;
- Vision trouble, mouvements oculaires involontaires, variation de la pression à l'intérieur de l'œil;
- Constipation, douleur à l'estomac, sécheresse de la bouche, diminution de la sensibilité aux différentes saveurs et enflure du pancréas;
- Douleur musculaire ou aux articulations, tremblements et mouvement incontrôlé;
- Faiblesse;
- Nervosité, sentiment de confusion, de déprime ou d'excitation, voir des choses ou entendre des voix qui ne sont pas là (hallucinations);
- Inflammation de l'espace entre les tubules rénaux (dans le rein);
- Incapacité à avoir ou maintenir une érection (impuissance),

sécrétion inhabituelle de lait maternel et augmentation des seins chez l'homme;

- Réaction allergique, démangeaison de la peau, dermatite et perte de cheveux;
- Gonflement des vaisseaux sanguins.

Si vous avez des inquiétudes au sujet des effets secondaires du traitement qui vous a été prescrit, consultez votre médecin ou pharmacien.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes / effets	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez la prise du médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
<u>Système cardiovasculaire</u> Battements de cœur lents, rapides ou irréguliers			✓
<u>Système nerveux central</u> Vertiges, méningite, la dystonie.(troubles du mouvement)			✓

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes / effets	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez la prise du médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
Rare <u>Réaction d'hypersensibilité</u> Éruption cutanée surélevée et qui démange (urticaire), enflure, parfois au niveau du visage ou de la bouche (angio-œdème), douleur à la poitrine, essoufflement, fièvre inexplicée, respiration sifflante ou difficulté à respirer, sensation de faiblesse, surtout en position debout, collapsus			✓
Très rare <u>Réaction cutanée grave</u> Éruption cutanée pouvant former des cloques et ressemblant à une petite cible (taches foncées au centre entourées d'une zone pâle, elle-même bordée d'un cercle foncé)			✓
<u>Hépatite</u> <u>Défaillances du foie :</u> Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urine foncée ou d'une couleur semblable à celle du thé, selles de couleur pâle, nausées/vomissements, perte d'appétit, douleur, endolorissement ou sensibilité du côté droit,			✓

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En présence d'effets secondaires inattendus pendant l'emploi de ZANTAC, contactez un médecin ou un pharmacien.

ENTREPOSAGE

Conservez ce médicament dans un endroit sûr, hors de la portée et de la vue des enfants, entre 15 et 30 °C, à l'abri de l'humidité excessive.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé :

- en visitant le site Web de déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ce document et la monographie intégrale du produit, préparée à l'intention des professionnels de la santé, peuvent être obtenus en contactant le commanditaire, Sanofi santé grand public, au **1 800-636-3664**.

Ce document a été préparé par Sanofi santé grand public.

Dernière révision : 5 décembre 2019

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS

ZANTAC® Dose maximum sans ordonnance

Comprimés à 150 mg USP (sous forme de chlorhydrate de ranitidine)

Ce feuillet destiné aux consommateurs est la III^e et dernière partie d'une monographie publiée lorsque la vente de ZANTAC Dose maximum sans ordonnance a été approuvée au Canada. Ce feuillet ne contient qu'un résumé et ne vous offre pas de l'information complète sur ZANTAC Dose maximum sans ordonnance. Pour toute question au sujet de ce médicament, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Pourquoi utilise-t-on ce médicament?

ZANTAC est un acidoréducteur d'usage courant prescrit par les médecins partout dans le monde. ZANTAC Dose maximum sans ordonnance est un produit ZANTAC qui contient la dose maximum de ranitidine (150 mg) sans ordonnance.

Les comprimés ZANTAC Dose maximum sans ordonnance soulagent rapidement et efficacement, traitent et préviennent les symptômes suivants dus à une acidité gastrique excessive, aussi bien le jour que la nuit :

- Brûlures d'estomac
- Indigestion acide
- Dérangements et aigreurs d'estomac
- Hyperacidité

Comment agit-il?

Les comprimés ZANTAC Dose maximum sans ordonnance réduisent et maîtrisent l'acidité gastrique pendant une période allant jusqu'à 12 heures, aussi bien le jour que la nuit. Voilà ce qui fait la différence entre ZANTAC Dose maximum sans ordonnance et les antiacides qui ne font que neutraliser l'acide de l'estomac. Les antiacides ne réduisent pas la production excessive d'acide gastrique.

ZANTAC Dose maximum sans ordonnance commence à soulager les symptômes associés aux brûlures d'estomac, à l'indigestion acide, à l'hyperacidité ainsi qu'aux aigreurs et aux dérangements d'estomac à 30 minutes.

Les comprimés ZANTAC Dose maximum sans ordonnance peuvent également prévenir efficacement la douleur, le malaise et les symptômes associés aux brûlures d'estomac et à l'indigestion acide, aux aigreurs et aux dérangements d'estomac ainsi qu'à l'hyperacidité lorsqu'on les prend de 30 à 60 minutes avant de consommer des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer des brûlures d'estomac.

Quand devrait-on éviter de le prendre?

Ne prenez pas les comprimés ZANTAC Dose maximum sans

ordonnance si vous êtes allergique à l'un des composants de ce produit ou si vous avez déjà fait une réaction allergique à un autre produit contenant un acidoréducteur.

Quand devriez-vous contacter votre médecin?

Contactez votre médecin si les symptômes suivants surviennent pendant ou après la prise de ZANTAC Dose maximum sans ordonnance, car ces symptômes peuvent être ceux d'une réaction/affection grave:

- si vous souffrez de brûlures d'estomac accompagnées d'étourdissements, de transpiration, de vertige ou de respiration sifflante fréquente;
- si vous souffrez de douleur à la poitrine ou aux épaules accompagnée d'essoufflement, de transpiration et de propagation de la douleur dans le cou, les bras ou les épaules.

Ingrédient médicinal :

Chaque comprimé ZANTAC Dose maximum sans ordonnance contient 150 mg de ranitidine, sous forme de chlorhydrate de ranitidine.

Ingrédients non médicinaux importants :

Comprimés non aromatisés : cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hypromellose, oxyde de fer rouge, stéarate de magnésium, triacétine.

Comprimés à saveur de menthe fraîche : AD&C bleu no 1/bleu brillant FCF sur substrat d'aluminium, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, hypromellose, saveur de menthe, saveur de menthe poivrée, stéarate de magnésium, sucralose, triacétine, triméthyl isopropyl butanamide

ZANTAC Dose maximum sans ordonnance ne contient ni sodium, ni gluten, ni sucre.

Sous quelles formes se présente-t-il?

Comprimés non aromatisés: 150 mg

Comprimés à saveur de menthe fraîche: 150 mg

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Les femmes qui allaitent doivent éviter de prendre Zantac Dose maximum sans ordonnance.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre ZANTAC Dose maximum sans ordonnance:

- si vous souffrez d'ulcère gastrique ou duodénal;
- si vous prenez un médicament d'ordonnance pour traiter un ulcère gastrique ou tout autre médicament d'ordonnance;
- si vous avez des problèmes de cœur;
- si vous avez des problèmes de foie;

- si vous souffrez de diabète;
- si vous souffrez d'une maladie pulmonaire;
- si votre système immunitaire est affaibli;
- si vous présentez une maladie du rein;
- si vous souffrez de douleurs thoraciques;
- si vous avez de la difficulté à avaler, que cela vous fait mal, que vous vous étouffez ou que vous éprouvez un malaise ou un inconfort abdominal persistant;
- si vous avez la nausée, si vous vomissez du sang, ou si vous avez des selles sanguinolentes ou noires;
- si vos brûlures d'estomac sont fréquentes (> 3 fois par semaine) et/ou particulièrement sévères;
- si vous souffrez de brûlures d'estomac depuis plus de 3 mois;
- si vous souffrez de porphyrie (trouble sanguin rare);
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez;
- si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), car ces médicaments peuvent être à l'origine de vos symptômes, ou si vous prenez d'autres médicaments;
- si vous perdez du poids de façon non intentionnelle;
- si vous avez plus de 40 ans et que vous éprouvez de nouveaux symptômes de brûlures d'estomac ou d'indigestion acide ou que vous avez observé une modification récente de vos symptômes;
- si vous souffrez de tout autre trouble ou prenez des médicaments d'ordonnance et voyez un médecin régulièrement;
- si vous avez moins de 16 ans.

Adultes et enfants de 16 ans et plus: Prenez 1 comprimé dès l'apparition des symptômes, que ce soit le jour ou la nuit. Si les symptômes persistent pendant plus de 1 heure ou réapparaissent après 1 heure, vous pouvez prendre un deuxième comprimé.

Pour la prévention des symptômes déclenchés par la consommation d'aliments ou de boissons, prenez 1 comprimé de 30 à 60 minutes avant tout repas susceptible de provoquer ces symptômes.

Ne prenez pas plus de 2 comprimés au cours d'une période de 24 heures. Cessez l'emploi et consultez votre médecin si les symptômes empiront ou que de nouveaux symptômes se manifestent ou persistent après 14 jours de traitement.

Si pendant le traitement vous ressentez des étourdissements, de la somnolence ou des vertiges, vous devez éviter de conduire un véhicule ou d'effectuer des tâches qui exigent de la vigilance.

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

AVANT de prendre ZANTAC Dose maximum sans ordonnance, consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des antiacides, des composés d'aluminium, de l'amoxicilline, de l'atazanavir, de l'acide clavulanique, de la cyanocobalamine, du diltiazem, de l'énoxacine, de l'erlotinib, de la fosphénytoïne, du géfitinib, du glyburide, de l'itraconazole, du kétoconazole, de l'hydroxyde de magnésium, de la metformine, du midazolam, de la pancréatine, du pancuronium, de la pentoxifylline, du posaconazole, de la procainamide, du sucralfate, du triazolam, de la tubocurarine ou de la warfarine.

Ne prenez pas d'antiacides moins de 30 minutes à 1 heure avant ou après la prise de ZANTAC Dose maximum sans ordonnance.

MODE D'EMPLOI DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

ZANTAC Dose maximum sans ordonnance et les antiacides doivent être pris à au moins 30 minutes à 1 heure d'intervalle.

Que faire pour contribuer à éviter les symptômes?

- évitez de vous allonger ou de vous pencher peu de temps après avoir mangé;
- si vous avez un surplus de poids, tentez de perdre du poids;
- si vous fumez, arrêtez complètement ou diminuez le nombre de cigarettes que vous fumez;
- interrompez ou réduisez votre consommation d'aliments tels que: boissons contenant de la caféine (café, thé et cola), chocolat, aliments frits, gras ou épicés, et alcool;
- essayez de réduire le stress dans votre vie;
- évitez de prendre de gros repas, de manger tard le soir ou juste avant de vous coucher;
- soulevez la tête de votre lit,
- optez pour des vêtements amples autour de l'abdomen (estomac).

Surdosage :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison le plus proche, même en l'absence de symptômes.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés avec ZANTAC Dose maximum sans ordonnance sont les maux de tête, les nausées, les vomissements et la diarrhée.

D'autres rares effets secondaires sont observés avec l'utilisation de la ranitidine :

- Différents types d'anémie et une baisse du nombre de tous types de cellules sanguines;
- Difficulté à dormir ou avoir sommeil;
- Vision trouble, mouvements oculaires involontaires, variation de la pression à l'intérieur de l'œil;
- Constipation, douleur à l'estomac, sécheresse de la bouche, diminution de la sensibilité aux différents saveurs et enflure du pancréas;
- Douleur musculaire ou aux articulations, tremblements et mouvement incontrôlé;
- Faiblesse;
- Nervosité, sentiment de confusion, de déprime ou d'excitation, voir des choses ou entendre des voix qui ne sont pas là (hallucinations);
- Inflammation de l'espace entre les tubules rénaux (dans le rein);

- Incapacité à avoir ou maintenir une érection (impuissance), sécrétion inhabituelle de lait maternel et augmentation des seins chez l'homme;
- Réaction allergique, démangeaison de la peau, dermatite et perte de cheveux;
- Gonflement des vaisseaux sanguins.

Si vous avez des inquiétudes au sujet des effets secondaires du traitement qui vous a été prescrit, consultez votre médecin ou pharmacien.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE				
Symptômes / effets	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez la prise du médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement	
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas		
Rare	<u>Réaction d'hypersensibilité</u> Éruption cutanée surélevée et qui démange (urticaire), enflure, parfois au niveau du visage ou de la bouche (angio-œdème), douleur à la poitrine, essoufflement, fièvre inexplicable, respiration sifflante ou difficulté à respirer, sensation de faiblesse, surtout en position debout, collapsus		✓	
Très rare	<u>Réaction cutanée grave</u> Éruption cutanée pouvant former des cloques et ressemblant à une petite cible (taches foncées au centre entourées d'une zone pâle, elle-même bordée d'un cercle foncé)		✓	
	<u>Hépatite</u> <u>Défaillances du foie :</u> Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urine foncée ou d'une couleur semblable à celle du thé, selles de couleur pâle, nausées/vomissements, perte d'appétit, douleur, endolorissement ou sensibilité du côté droit, sous les côtes		✓	

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptômes / effets	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez la prise du médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
<u>Système cardiovasculaire</u> Battements de cœur lents, rapides ou irréguliers			✓
<u>Système nerveux central</u> Vertiges, méningite, la dystonie.(troubles du mouvement)			✓

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En présence d'effets secondaires inattendus pendant l'emploi de ZANTAC Dose maximum sans ordonnance, contactez un médecin ou un pharmacien.

ENTREPOSAGE

Conservez ce médicament dans un endroit sûr, hors de la portée et de la vue des enfants, entre 15 et 30 °C, à l'abri de l'humidité excessive. Les comprimés à saveur de menthe fraîche doivent aussi être conservés à l'abri de la chaleur.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé :

- en visitant le site Web de déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ce document et la monographie intégrale du produit, préparée à l'intention des professionnels de la santé, peuvent être obtenus en contactant le commanditaire, Sanofi santé grand public, au **1 800-636-3664**.

Ce document a été préparé par Sanofi santé grand public.

Dernière révision : 5 décembre 2019