

## **MONOGRAPHIE DE PRODUIT**

**PrBISOPROLOL**

**Fumarate de bisoprolol en comprimés USP  
5 mg et 10 mg**

**Inhibiteur des récepteurs bêta-adrénergiques**

**Sanis Health Inc.  
1 President's Choice Circle  
Brampton, Ontario  
L6Y 5S5**

**Date de révision :  
27 mai 2020**

**Numéro de contrôle : 239104**

## **MONOGRAPHIE DE PRODUIT**

**PrBISOPROLOL**

**Fumarate de bisoprolol en comprimés USP**

**5 mg et 10 mg**

### **CLASSE PHARMACOLOGIQUE**

**Inhibiteur des récepteurs bêta-adrénergiques**

### **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

Le fumarate de bisoprolol est un agent synthétique inhibiteur des récepteurs bêta<sub>1</sub>-adrénergiques (cardiosélectif) sans activité stabilisatrice de la membrane significative ou d'activité sympathomimétique intrinsèque dans la gamme de ses doses thérapeutiques. Par contre, cet effet préférentiel n'est pas absolu et, à raison de fortes doses, le bisoprolol peut aussi inhiber les récepteurs bêta<sub>2</sub>-adrénergiques localisés principalement dans les muscles bronchiques et vasculaires.

#### **Pharmacodynamie**

L'effet principal du bisoprolol est son effet chronotrope négatif, qui entraîne une réduction de la fréquence cardiaque au repos et à l'effort. On note une baisse du débit cardiaque au repos et à l'effort, peu de changements du débit systolique, et seulement une légère hausse de la pression auriculaire droite ou de la pression capillaire pulmonaire au repos ou à l'effort.

Le mécanisme d'action de ses effets antihypertensifs n'a pas encore été complètement élucidé.

Les facteurs entrant en jeu pourraient entre autres inclure :

- 1) L'antagonisme des récepteurs bêta-adrénergiques dans la réduction du débit cardiaque.
- 2) L'inhibition de la libération de rénine par les reins.
- 3) La diminution du débit sympathique tonique à partir des centres vasomoteurs cérébraux.

Chez des volontaires en bonne santé, le traitement par le bisoprolol a entraîné une réduction de la tachycardie à l'effort et de la tachycardie provoquée par l'isoprotérénol. L'effet maximal est apparu 1

à 4 heures après l'administration d'une dose. Les effets ont persisté pendant 24 heures, à des doses supérieures ou égales à 5 mg.

Des études électrophysiologiques menées chez l'humain ont démontré que le bisoprolol ralentissait significativement la fréquence cardiaque, augmentait le temps de récupération du nœud sinusal, prolongeait les périodes réfractaires du nœud AV et, après une stimulation auriculaire rapide, prolongeait la conduction du nœud AV.

Le fumarate de bisoprolol est bien absorbé suivant son administration par voie orale. La biodisponibilité absolue après la prise d'une dose de 10 mg est supérieure à 80 %. L'absorption n'est pas affectée par la présence d'aliments. Le métabolisme de premier passage du fumarate de bisoprolol est inférieur à 20 %.

Sa liaison aux protéines sériques est d'environ 30 %. Les pics des concentrations plasmatiques s'observent dans les 2 à 4 heures suivant l'administration de 5 à 20 mg, et les valeurs moyennes des pics varient de 16 ng/mL avec une dose de 5 mg à 70 ng/mL avec une dose de 20 mg. L'administration unique quotidienne de fumarate de bisoprolol entraîne une variabilité des pics plasmatiques de moins de deux fois entre les sujets. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 9 à 12 heures; elle est légèrement plus longue chez les sujets âgés, en partie à cause de la diminution de la fonction rénale chez cette population. L'état d'équilibre est atteint en cinq jours avec une administration unique quotidienne. Chez les populations jeunes et âgées, l'accumulation plasmatique est faible; le facteur d'accumulation varie de 1,1 à 1,3, et correspond à celui auquel on pourrait s'attendre d'une cinétique de premier ordre et d'une posologie unique quotidienne. Les concentrations plasmatiques sont proportionnelles à la dose administrée entre 5 et 20 mg. Les caractéristiques pharmacocinétiques des deux énantiomères sont semblables.

L'élimination du fumarate de bisoprolol est divisée également entre les voies rénales et non rénales; environ 50 % de la dose apparaît sous forme inchangée dans l'urine, et le reste sous forme de métabolites inactifs. Chez l'humain, les métabolites connus sont instables ou ne sont dotés d'aucune activité pharmacologique connue. Moins de 2 % de la dose est excrétée dans les selles. Le fumarate de bisoprolol n'est pas métabolisé par le cytochrome P450 IID6 (débrisoquine hydroxylase).

Chez les sujets dont la clairance de la créatinine est inférieure à 40 mL/min, la demi-vie plasmatique augmente d'environ trois fois par rapport aux sujets en bonne santé.

Chez les patients souffrant de cirrhose, la vitesse d'élimination du fumarate de bisoprolol est plus variable et significativement plus lente que chez les sujets en bonne santé, et sa demi-vie plasmatique va de 8,3 à 21,7 heures.

### **BIODISPONIBILITÉ COMPARATIVE**

Une étude de biodisponibilité comparative a été menée auprès de volontaires en bonne santé et à jeun. La vitesse et l'ampleur d'absorption du fumarate de bisoprolol ont été mesurées et comparées avec celles obtenues après la prise d'une seule dose orale de BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) ou de MONOCOR<sup>MD</sup> en comprimés. Le tableau suivant présente un sommaire des résultats obtenus à partir de données mesurées :

**Tableau sommaire des données sur la biodisponibilité comparative après la prise d'une seule dose dans le cadre d'une étude auprès de sujets à jeun portant sur le fumarate de bisoprolol (1 × 10 mg) en comprimés**

Bisoprolol (1 × 10 mg) À partir de données mesurées Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (% CV)				
Paramètre	BISOPROLOL	Monocor <sup>MD</sup> †	Rapport des moyennes géométriques (%)	Intervalle de confiance à 90 %
ASC <sub>T</sub> (ng•h/mL)	604 614 (19)	609 619 (19)	98,9	95,6-102,2
ASC <sub>I</sub> (ng•h/mL)	634 646 (20)	639 651 (20)	98,8	95,4-102,4
C <sub>max</sub> (ng/mL)	39,4 40,2 (20)	39,4 40,1 (18)	99,7	94,6-105,1
*T <sub>max</sub> (h)	3,30 (63)	2,75 (47)		
*T <sub>1/2</sub> (h)	10,7 (15)	10,8 (15)		

\*Exprimé en moyenne arithmétique (% CV) seulement.

†Monocor<sup>MD</sup>, fabriqué par Biovail Pharmaceuticals, a été acheté au Canada.

### **INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE**

BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) est indiqué pour le traitement des patients atteints d'hypertension légère à modérée. Il peut être pris seul ou en association avec d'autres

antihypertenseurs, notamment avec des diurétiques thiazidiques.

BISOPROLOL n'est pas recommandé pour le traitement d'urgence des crises hypertensives.

### **CONTRE-INDICATIONS**

BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) est contre-indiqué chez les patients présentant un choc cardiogénique, une insuffisance cardiaque manifeste, un bloc AV du deuxième ou du troisième degré, une insuffisance ventriculaire droite secondaire à une hypertension pulmonaire ou une bradycardie sinusale.

### **MISES EN GARDE**

#### Insuffisance cardiaque :

La prudence s'impose notamment lorsqu'on administre BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) à des patients qui ont des antécédents d'insuffisance cardiaque grave. L'innocuité et l'efficacité du bisoprolol administré à des doses supérieures à 10 mg par jour n'ont pas été établies chez les patients présentant une insuffisance cardiaque. La stimulation sympathique est une composante vitale qui soutient la fonction circulatoire en présence d'insuffisance cardiaque congestive, et l'inhibition par le bêta-blocage comporte toujours un risque possible de réduire davantage la contractilité myocardique et d'entraîner une défaillance cardiaque. En général, les bêtabloquants sont à éviter chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive manifeste.

En revanche, chez certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque compensée, il peut se révéler nécessaire d'utiliser ces agents. Dans ce cas, il faut les utiliser avec prudence.

BISOPROLOL agit sélectivement sans inhiber les effets de la digitaline. Par contre, l'effet inotrope positif de la digitaline peut être atténué par l'effet inotrope négatif de BISOPROLOL lorsque les deux médicaments sont utilisés en concomitance. Les effets des bêtabloquants et de la digitaline s'additionnent pour ralentir la conduction A-V.

#### Patients n'ayant pas d'antécédents d'insuffisance cardiaque :

Chez les patients qui ne présentent aucun antécédent d'insuffisance cardiaque, le maintien d'un effet dépresseur sur le myocarde au moyen d'un bêtabloquant peut, dans certains cas, entraîner une insuffisance cardiaque. Dès le premier signe ou symptôme d'insuffisance cardiaque imminente, il faut traiter les patients de façon appropriée et surveiller étroitement leur réponse. Si l'insuffisance cardiaque persiste, il faut cesser immédiatement le traitement par BISOPROLOL.

#### Arrêt subit du traitement par BISOPROLOL :

Chez certains patients atteints de coronaropathie, on a observé une exacerbation de l'angine de poitrine et, dans certains cas, un infarctus du myocarde ou une arythmie ventriculaire suivant l'arrêt subit d'un traitement par des bêtabloquants. On doit donc déconseiller aux patients de cesser ou d'interrompre leur traitement sans en avoir parlé à leur médecin. Même chez les patients qui ne sont pas atteints de coronaropathie manifeste, il est recommandé de diminuer graduellement les doses de BISOPROLOL sur une période d'environ deux semaines, et de surveiller étroitement les patients. Il faut maintenir la même fréquence d'administration. Si des symptômes liés à l'arrêt du traitement apparaissent, le traitement par BISOPROLOL doit être réinstauré, du moins temporairement.

#### Maladies vasculaires périphériques :

Les bêtabloquants peuvent précipiter ou aggraver les symptômes d'une insuffisance artérielle chez les patients qui souffrent de maladie vasculaire périphérique. La prudence est de mise chez de tels sujets.

#### Syndrome oculo-cutanéomuqueux :

Diverses éruptions cutanées ont été signalées avec les bêtabloquants, y compris le bisoprolol. Un syndrome grave (le syndrome oculo-cutanéomuqueux), dont les signes comprennent la conjonctivite sèche, les éruptions cutanées psoriasiformes, l'otite et la sérosité sclérosante, est survenu lors de l'emploi de l'un des inhibiteurs des récepteurs bêta-adrénergiques (practolol) à long terme. Ce syndrome n'a pas été observé avec le bisoprolol ni avec aucun autre agent de ce type. Néanmoins, les médecins doivent connaître la possibilité de telles réactions et cesser le traitement si elles se produisent.

#### Bradycardie sinusale :

Une bradycardie sinusale grave, consécutive à l'activité vagale non opposée à la suite d'un bêtablocage, peut survenir avec BISOPROLOL. Dans de tels cas, la posologie doit être diminuée ou le traitement par BISOPROLOL doit être interrompu.

#### Thyréotoxicose :

Chez les patients atteints de thyrotoxicose, les effets néfastes possibles de l'emploi prolongé de BISOPROLOL n'ont pas été adéquatement évalués.

Le blocage des récepteurs bêta-adrénergiques peut masquer les signes cliniques de l'hyperthyroïdie comme la tachycardie ou ses complications, et occasionner une fausse impression d'amélioration de l'état du patient. L'arrêt subit du bêtablocage peut être suivi d'une exacerbation des symptômes de l'hyperthyroïdie ou déclencher une crise thyrotoxisique.

Par conséquent, lorsque le traitement par BISOPROLOL doit être arrêté chez ces patients, l'arrêt doit être graduel, et les patients étroitement surveillés.

## **PRÉCAUTIONS**

Des analyses de laboratoire appropriées pour la surveillance des fonctions rénale, hépatique et hématopoïétique doivent être effectuées à des intervalles réguliers durant un traitement prolongé par BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol).

### **Affections bronchospastiques :**

En règle générale, les patients souffrant de maladie pulmonaire bronchospastique ne doivent pas recevoir de bêtabloquants. Cependant, étant donné qu'BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) est relativement bêta<sub>1</sub>-sélectif, il peut être utilisé avec prudence chez les patients souffrant de maladie bronchospastique qui ne répondent pas aux autres traitements antihypertenseurs ou qui ne peuvent les tolérer. Étant donné que la bêta<sub>1</sub>-sélectivité n'est pas absolue, la dose la plus faible possible doit être utilisée, le patient doit avoir accès à un bêta<sub>2</sub>-agoniste (bronchodilatateur), et il doit être surveillé de près. Chez les patients suivant déjà un traitement bronchodilatateur, la dose doit parfois être augmentée.

### **Anesthésie :**

Il n'est pas recommandé de cesser la prise de bêtabloquants avant une chirurgie chez la majorité des patients. Il faut toutefois faire preuve de circonspection lorsqu'on utilise BISOPROLOL avec des agents anesthésiques, notamment ceux qui peuvent exercer un effet déprimeur sur le myocarde. Le cas échéant, la dominance vagale peut être corrigée avec de l'atropine (1 à 2 mg par voie i.v.).

Certains patients recevant des inhibiteurs des récepteurs bêta-adrénergiques ont été sujets à une grave hypotension prolongée durant l'anesthésie. On a également signalé des cas où il a été difficile de rétablir les battements cardiaques et de les maintenir (voir aussi **SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE**).

En cas de chirurgie d'urgence, étant donné qu'BISOPROLOL est un antagoniste compétitif des récepteurs bêta-adrénergiques, ses effets peuvent être contrés, au besoin, par des doses suffisantes d'agonistes tels que l'isoprotérénol ou la noradrénaline.

#### Réaction de type allergique :

Il peut être difficile de traiter les réactions de type allergique chez les patients recevant des bêtabloquants. Chez ces patients, la réaction peut être plus grave en raison des effets pharmacologiques des bêtabloquants et des problèmes liés aux changements liquidiens. L'épinéphrine doit être administrée avec prudence puisqu'il se pourrait qu'elle n'exerce pas ses effets habituels pendant le traitement de l'anaphylaxie. D'une part, des doses plus fortes d'épinéphrine peuvent être requises pour relâcher le bronchospasme, tandis que, d'autre part, ces doses peuvent aussi être associées à une stimulation alpha-adrénergique excessive menant à une hypertension artérielle, à une bradycardie réflexe et à un bloc cardiaque, ainsi qu'à une potentialisation possible du bronchospasme. Au lieu d'utiliser de fortes doses d'épinéphrine, on peut aussi recourir à des soins d'appoint vigoureux comme l'administration de liquides, l'emploi de bêta-agonistes comme le salbutamol ou l'isoprotérénol par voie parentérale pour relâcher le bronchospasme, ou la norépinéphrine pour vaincre l'hypotension.

#### Risque de réaction anaphylactique :

Pendant qu'ils prennent des bêtabloquants, les patients qui ont des antécédents de réaction anaphylactique grave à divers allergènes peuvent réagir davantage à l'exposition répétée, qu'elle soit accidentelle, ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Ces patients risquent de ne pas répondre aux doses habituelles d'épinéphrine utilisées pour traiter des réactions allergiques.

#### Diabète et hypoglycémie :

Les bêtabloquants peuvent masquer certaines manifestations de l'hypoglycémie, notamment la tachycardie. Les bêtabloquants non sélectifs peuvent potentialiser l'hypoglycémie provoquée par l'insuline, et retarder le rétablissement des taux de glucose sérique. Par conséquent, BISOPROLOL doit être utilisé avec prudence chez les patients prédisposés à l'hypoglycémie spontanée, ou chez les patients diabétiques (notamment ceux dont le diabète est instable) qui reçoivent de l'insuline ou des hypoglycémifiants par voie orale.

#### Dysfonction rénale ou hépatique :

Des analyses de laboratoire appropriées pour la surveillance des fonctions rénale, hépatique et



hématopoïétique doivent être effectuées à des intervalles réguliers durant un traitement prolongé. La prudence s'impose lors de l'ajustement posologique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ou rénale (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

Personnes âgées :

Le bisoprolol a été utilisé chez des patients âgés atteints d'hypertension essentielle. Bien que les taux de réponse et que les baisses moyennes de la tension artérielle diastolique aient été similaires à ceux observés chez les patients plus jeunes, on a noté une tendance à administrer des doses plus fortes de bisoprolol aux patients âgés. Les ralentissements de la fréquence cardiaque observés étaient légèrement plus marqués chez les patients âgés que chez les sujets jeunes, et avaient tendance à croître avec l'augmentation de la dose.

Grossesse :

Le fumarate de bisoprolol ne s'est pas révélé tératogène chez le rat à des doses atteignant 150 mg/kg/jour, soit 375 fois la dose quotidienne maximale recommandée chez l'humain. Le fumarate de bisoprolol s'est avéré fœtotoxique (nombre accru de résorptions tardives) avec la dose de 50 mg/kg/jour, et maternotoxique (diminution de la consommation d'aliments et du gain pondéral) avec la dose de 150 mg/kg/jour. Le fumarate de bisoprolol ne s'est pas révélé tératogène chez le lapin à des doses atteignant 12,5 mg/kg/jour, soit 31 fois la dose quotidienne maximale recommandée chez l'humain, mais il s'est révélé embryocide (augmentation des résorptions précoces) à des doses de 12,5 mg/kg/jour.

Aucune étude n'a été menée chez les femmes enceintes. BISOPROLOL ne doit être utilisé pendant une grossesse que si l'avantage potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Allaitement :

De petites quantités de fumarate de bisoprolol (< 2 % de la dose) ont été décelées dans le lait de rates qui allaitent. On ignore si ce médicament est excrété dans le lait maternel humain. Si l'emploi de BISOPROLOL est jugé essentiel, la mère doit cesser d'allaiter.

Pédiatrie :

On n'a pas établi l'innocuité et l'efficacité de cet agent chez les enfants.

Interactions médicamenteuses :

Autres bêtabloquants : BISOPROLOL ne doit pas être associé à d'autres bêtabloquants.

Médicaments agissant par déplétion des catécholamines : les patients recevant des médicaments agissant par déplétion des catécholamines, comme la réserpine ou la guanéthidine, doivent être surveillés de près, car l'action bêtabloquante additionnelle de BISOPROLOL peut entraîner une réduction excessive de l'activité sympathique.

Antihypertenseurs à action centrale : les bêtabloquants peuvent exacerber une hypertension rebond qui peut survenir après l'arrêt de la clonidine. Si les deux médicaments sont administrés ensemble, le bêtabloquant doit être arrêté plusieurs jours avant l'arrêt de la clonidine. Si on veut remplacer la clonidine par un bêtabloquant, l'introduction de ce dernier doit être retardée de plusieurs jours après l'arrêt de la prise de la clonidine (voir aussi les renseignements thérapeutiques concernant la clonidine).

Antiarythmiques : BISOPROLOL doit être utilisé avec prudence lorsqu'il est pris en concomitance avec des médicaments qui exercent un effet dépresseur sur le myocarde ou des inhibiteurs de la conduction AV, notamment certains antagonistes de calcium [surtout ceux de la classe de la phénylalkylamine (vérapamil) et la benzothiazépine (diltiazem)] ou des antiarythmiques comme le disopyramide.

Inhibiteurs des canaux calciques : l'emploi concomitant de bêtabloquants et d'inhibiteurs des canaux calciques ayant un effet inotrope négatif peut prolonger la conduction SA et AV, notamment chez les patients présentant une dysfonction ventriculaire ou des anomalies de la conduction. Cette situation peut causer une hypotension grave, une bradycardie et une insuffisance cardiaque.

Fingolimod : L'utilisation concomitante de fingolimod avec des  $\beta$ -bloquants peut potentialiser les effets bradycardiques et n'est pas recommandée. Lorsqu'une telle administration concomitante est jugée nécessaire, une surveillance appropriée au début du traitement, c'est-à-dire au moins une surveillance pendant la nuit, est recommandée.

Interactions pharmacocinétiques : l'emploi concomitant de rifampine augmente la clairance métabolique du bisoprolol, ce qui raccourcit la demi-vie d'élimination de ce dernier. Par conséquent, les produits dotés d'un potentiel d'induction enzymatique doivent être administrés avec prudence chez les patients traités par le bisoprolol. Les études pharmacocinétiques ne font état d'aucune

interaction pertinente défavorable sur le plan clinique avec d'autres agents administrés en concomitance, y compris les diurétiques thiazidiques, la digoxine et la cimétidine. Le bisoprolol n'a exercé aucun effet sur le temps de prothrombine chez les patients traités par des doses stables de warfarine.

On a rapporté des réponses hypertensives exagérées après l'emploi concomitant d'antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques et d'agonistes des récepteurs alpha-adrénergiques, y compris ceux présents dans les médicaments brevetés contre le rhume et les gouttes nasales vasoconstrictrices. Les patients recevant des bêtabloquants doivent être mis au courant de ce danger possible.

### **RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER AU PATIENT**

Les patients, surtout ceux atteints d'une coronaropathie, doivent être mis en garde contre l'arrêt de la prise de BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) sans supervision médicale. Il faut aussi conseiller aux patients de consulter un médecin s'ils éprouvent la moindre difficulté respiratoire ou s'ils commencent à manifester des signes et des symptômes d'une insuffisance cardiaque congestive ou d'une bradycardie excessive.

Les patients prédisposés à l'hypoglycémie spontanée et les patients diabétiques prenant de l'insuline ou des hypoglycémifiants oraux doivent être avertis que les bêtabloquants peuvent masquer certaines manifestations de l'hypoglycémie, notamment la tachycardie, et qu'il faut utiliser le fumarate de bisoprolol avec prudence.

### **EFFETS INDÉSIRABLES**

Dans le cadre de deux essais cliniques multicentriques et contrôlés par placebo, regroupant 404 patients atteints d'hypertension légère à modérée, les effets indésirables signalés le plus souvent (> 2 %), associés ou non à la prise du médicament, incluaient : arthralgie (2,7 %), étourdissements (3,5 %), céphalée (10,9 %), insomnie (2,5 %), diarrhée (3,5 %), nausées (2,2 %), toux (2,5 %), pharyngite (2,2 %), rhinite (4,0 %), sinusite (2,2 %), infection des voies respiratoires supérieures (5,0 %), fatigue (8,2 %) et œdème périphérique (3 %).

En tout, 187 patients sur 404 (46,3 %) ont signalé au moins un effet indésirable. Dans l'ensemble, la gravité des effets signalés était de légère à modérée. Vingt-sept patients sur 404 (6,7 %) ont

abandonné le traitement à cause d'un effet indésirable ou d'une maladie intercurrente.

Le tableau suivant (Tableau 1) énumère les effets indésirables, qu'ils soient liés ou non à la prise du médicament, qui ont été signalés par > 1 % de tous les patients (n = 404) inscrits aux deux essais contrôlés par placebo portant sur le fumarate de bisoprolol administré à des doses unquotidiennes comprises entre 2,5 et 40 mg. Les effets indésirables du médicament qui semblent liés à la dose sont la bradycardie, la diarrhée, l'asthénie, la fatigue et la sinusite. Étant donné que l'incidence de la bradycardie est de 0,5 %, il s'agit du seul effet indésirable lié à la dose qui ne figure pas ci-dessous (Tableau 1).

**TABLEAU 1**

**Effet indésirable (> 1 %) :**  
**Essais contrôlés par placebo (n = 404)**

<b>Système organique/effet indésirable</b>	<b>Tous les effets indésirables n (%)</b>
Appareil locomoteur	
Arthralgies	11 (2,7)
Myalgie	7 (1,7)
Crampes musculaires	6 (1,5)
Système nerveux central	
Étourdissements	14 (3,5)
Céphalée	44 (10,9)
Paresthésies	5 (1,2)
Hypoesthésie	6 (1,5)
Système nerveux autonome Sécheresse de la bouche	5 (1,2)
Troubles auditifs et vestibulaires	
Otalgie	5 (1,2)
Santé mentale	
Impuissance	5 (1,2)
Insomnie	10 (2,5)
Somnolence	5 (1,2)
Appareil digestif	
Diarrhée	14 (3,4)
Dyspepsie	5 (1,2)
Nausées	9 (2,2)
Vomissement	6 (1,5)

<b>Système organique/effet indésirable</b>	<b>Tous les effets indésirables n (%)</b>
Appareil respiratoire	
Toux	10 (2,5)
Dyspnée	6 (1,5)
Pharyngite	9 (2,2)
Rhinite	16 (4,0)
Sinusite	9 (2,2)
Infection des voies respiratoires supérieures	20 (5,0)
Organisme entier	
Asthénie	6 (1,5)
Douleurs thoraciques	6 (1,5)
Fatigue	33 (8,2)
Œdème périphérique	12 (3,0)

Lors d'une étude de prolongation à long terme, ouverte, menée auprès de 144 patients hypertendus, les effets indésirables signalés le plus souvent (> 2 %), qu'ils soient associés ou non à la prise du médicament, étaient les suivants : arthralgie (4,2 %), myalgie (2,1 %), crampes musculaires (2,1 %), étourdissements (4,9 %), céphalée (8,3 %), otalgie (2,1 %), impuissance (2,1 %), diminution de la libido (2,1 %), douleurs abdominales (2,1 %), diarrhée (2,8 %), bronchite (2,8 %), toux (4,2 %), pharyngite (4,2 %), rhinite (8,3 %), sinusite (4,9 %), infection des voies respiratoires supérieures (6,9 %), dorsalgie (2,1 %), douleur thoracique (2,1 %), fatigue (6,9 %), fièvre (2,1 %), œdème périphérique (3,5 %), algie (2,1 %) et blessure traumatique (2,1 %).

Les effets indésirables signalés étaient en général de gravité légère à modérée. Sur 144 patients, 79 (54,9 %) ont signalé au moins un effet indésirable. Sur l'ensemble des patients inscrits, 12 (8,3 %) ont abandonné le traitement à cause d'un effet indésirable ou d'une maladie intercurrente.

Le tableau suivant (Tableau 2) énumère les effets indésirables signalés par au moins 1 % des patients (n = 144) inscrits à l'étude de prolongation à long terme, ouverte, dont les sujets ont reçu des doses de fumarate de bisoprolol allant de 5 à 20 mg par jour.

TABLEAU 2

Effets indésirables (> 1 %) : Étude de prolongation à long terme, ouverte  
(n = 144)

Système organique/effet indésirable	Tous les effets indésirables
	n (%)
Appareil locomoteur	
Arthralgies	6 (4,2)
Myalgie	3 (2,1)
Crampes musculaires	3 (2,1)
Système nerveux central	
Étourdissements	7 (4,9)
Céphalée	12 (8,3)
Névrалgie	2 (1,4)
Vision	
Anomalie oculaire	2 (1,4)
Anomalie de la vue	2 (1,4)
Troubles auditifs et vestibulaires	
Otalgie	3 (2,1)
Acouphène	2 (1,4)
Santé mentale	
Dépression	2 (1,4)
Impuissance	3 (2,1)
Diminution de la libido	3 (2,1)
Insomnie	2 (1,4)
Paranoïa	2 (1,4)
Appareil digestif	
Douleur abdominale	3 (2,1)
Diarrhée	4 (2,8)
Dyspepsie	2 (1,4)
Appareil respiratoire	
Bronchite	4 (2,8)

Système organique/effet indésirable	Tous les effets indésirables
	n (%)
Bronchospasme	2 (1,4)
Toux	6 (4,2)
Pharyngite	6 (4,2)
Rhinite	12 (8,3)
Sinusite	7 (4,9)
Infection des voies respiratoires supérieures	10 (6,9)
Organisme entier	
Allergie	2 (1,4)
Dorsalgie	3 (2,1)
Douleurs thoraciques	3 (2,1)
Fatigue	10 (6,9)
Fièvre	3 (2,1)
Bouffées de chaleur	2 (1,4)
Malaise	2 (1,4)
Œdème généralisé	2 (1,4)
Œdème périphérique	5 (3,5)
Algie	3 (2,1)
Blessure traumatique	3 (2,1)

La liste suivante énumère les effets indésirables signalés spontanément avec le bisoprolol depuis son arrivée sur le marché américain et le marché de certains pays européens. Dans ces cas, ni l'incidence ni le lien de cause à effet n'ont pu être déterminés avec précision. Les effets indésirables sont énumérés par système ou appareil, de la manière suivante :

**SYSTÈME NERVEUX CENTRAL** : étourdissements, vertiges, céphalées, paresthésie, somnolence, diminution de la concentration/mémoire, aphasie, insomnie, contractions musculaires (involontaires), parésie, troubles du sommeil, somnolence, syncope, sensation de picotements, coma, encéphalopathie, trouble de la parole, hallucinations et confusion.

**SYSTÈME NERVEUX AUTONOME** : sécheresse de la bouche.

**CARDIOVASCULAIRE** : bradycardie, palpitations et autres troubles du rythme cardiaque,

hypotension, dyspnée à l'effort, embolie, extrasystoles, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque gauche, infarctus du myocarde, pseudo-syndrome de Raynaud, hypertension, insuffisance cardiaque, insuffisance circulatoire, bloc AV, arrêt cardiaque, tachycardie, fibrillation ventriculaire et arythmie.

PEAU : éruption cutanée, prurit, alopecie, œdème de Quincke, dermatite exfoliative, hyperpigmentation, éruptions psoriasiformes, photosensibilité cutanée, érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, érythème multiforme, sclérodermie, décoloration de la peau et urticaire.

ORGANES SENSORIELS : douleur/pression oculaire, larmoiement anormal, dysgueusie, agueusie, anosmie, conjonctivite et troubles visuels.

MÉTABOLIQUE : hypoglycémie.

RESPIRATOIRE : asthme/bronchospasme, dyspnée, essoufflements, œdème pulmonaire, pneumopathie inflammatoire et insuffisance respiratoire.

HÉMATOLOGIQUE : purpura, vascularite et ischémie périphérique.

GASTRO-INTESTINAL : vomissements et diarrhée.

APPAREIL LOCOMOTEUR : crampes musculaires, contraction/tremblement musculaire, arthralgie et myalgie.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE : maladie de La Peyronie, galactorrhée, mastalgie et mortinaissance.

GÉNÉRAL : fatigue, asthénie, malaise, œdème, gain pondéral, décès, sclérodermie, effet du surdosage et asthénie.

**ANOMALIES DES CONSTANTES BIOLOGIQUES** : lors des essais cliniques, les changements signalés le plus fréquemment sur le plan des constantes biologiques étaient l'augmentation des taux sériques de triglycides, mais ce résultat n'était pas constant.

Des anomalies hépatiques sporadiques ont été signalées. Dans le cadre de deux études



américaines bien comparées par rapport à un placebo, portant sur le fumarate de bisoprolol administré pendant 4 à 12 semaines, l'incidence d'une augmentation concomitante de l'AST et de l'ALT de 1 ou 2 fois la normale a été de 3,9 % avec le fumarate de bisoprolol par rapport à 2,5 % avec le placebo. Aucun patient n'a présenté d'augmentations concomitantes supérieures à deux fois la normale.

Dans le cadre d'études à long terme, non contrôlées, portant sur le traitement par le fumarate de bisoprolol pendant 6 à 18 mois, l'incidence d'une augmentation concomitante ou plus de l'AST et de l'ALT de 1 ou 2 fois la normale a été de 6,2 %. L'incidence des occurrences multiples a été de 1,9 %. L'incidence des augmentations concomitantes de l'AST et de l'ALT équivalant à plus de deux fois la normale était de 1,5 %. L'incidence des occurrences multiples était de 0,3 %. Dans de nombreux cas, ces augmentations ont été attribuées à des maladies sous-jacentes, ou se sont normalisées avec la poursuite du traitement par le fumarate de bisoprolol.

Parmi les autres anomalies des constantes biologiques, notons de légères augmentations du taux d'acide urique, de créatinine, d'azote uréique du sang, du potassium sérique, de la glycémie et du phosphore, ainsi qu'une baisse du nombre de leucocytes et de plaquettes. Ces phénomènes n'étaient généralement pas importants sur le plan clinique et ont rarement entraîné l'arrêt du traitement par le fumarate de bisoprolol.

Comme c'est le cas des autres bêtabloquants, des conversions d'anticorps antinucléaires ont aussi été signalées avec le fumarate de bisoprolol. Environ 15 % des patients inscrits aux études à long terme ont présenté une séroconversion, mais environ le tiers de ces patients ont ensuite retrouvé un statut séronégatif malgré la poursuite du traitement.

### **SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE**

Les signes les plus courants auxquels il faut s'attendre en cas de surdosage de bêtabloquants sont la bradycardie, l'hypotension, l'insuffisance cardiaque congestive, le bronchospasme et l'hypoglycémie. À ce jour, quelques cas de surdosage ont été signalés avec BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol). Une bradycardie et/ou de l'hypotension ont été notées. Des agents sympathomimétiques ont été administrés dans certains cas et tous les patients se sont rétablis. En général, en cas de surdosage, le traitement par BISOPROLOL doit être arrêté, et on doit administrer un traitement d'appoint adéquat, selon les symptômes. Les patients doivent être surveillés de près. Selon les données limitées dont nous disposons, le fumarate de bisoprolol n'est

pas dialysable.

D'après les actions pharmacologiques prévues et les recommandations concernant les autres bêtabloquants, les mesures générales suivantes sont à envisager lorsque la situation clinique le justifie :

Bradycardie : administrer de l'atropine par voie i.v. Si la réponse est insatisfaisante, on peut administrer avec prudence de l'isoprotérénol ou un autre agent doté de propriétés chronotropes positives. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer un stimulateur cardiaque transveineux. Le glucagon par voie i.v. s'est avéré utile.

Hypotension : des liquides i.v. et des vasopresseurs comme la dopamine ou la norépinéphrine doivent être administrés. Il faut surveiller continuellement la tension artérielle. Le glucagon par voie i.v. peut s'avérer utile.

Bloc cardiaque (deuxième ou troisième degré) : il faut surveiller de près les patients et les traiter par une perfusion d'isoprotérénol ou un stimulateur cardiaque transveineux, selon le cas.

Insuffisance cardiaque congestive : instaurer le traitement standard (c.-à-d. digitaliques, diurétiques, agents inotropes, agents vasodilatateurs). On a rapporté que le glucagon était utile.

Bronchospasme : administrer un traitement bronchodilatateur comme l'isoprotérénol ou la terbutaline (bêta<sub>2</sub>-agonistes) et/ou de l'aminophylline par voie i.v.

Hypoglycémie : administrer du glucose par voie i.v.

Selon la gravité des symptômes, le traitement peut nécessiter des soins de soutien intensifs et l'équipement nécessaire au maintien des fonctions cardiaque et respiratoire.

Il faut se rappeler qu'BISOPROLOL est un antagoniste compétitif de l'isoprotérénol et, par conséquent, il faut s'attendre à employer de fortes doses d'isoprotérénol pour inverser une bonne partie des effets des doses excessives de BISOPROLOL. Cependant, il ne faut pas oublier les complications liées à un excès d'isoprotérénol.

## **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

Dans le traitement de l'hypertension légère à modérée, la posologie de BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) doit être personnalisée aux besoins de chaque patient. La posologie initiale est de 5 mg une fois par jour, en monothérapie ou associée à un diurétique. Si la réponse à la dose de 5 mg est insuffisante, la dose peut être augmentée à 10 mg puis, si nécessaire, à 20 mg par jour. L'intervalle approprié pour l'ajustement posologique est de deux semaines.

L'augmentation de la dose au-delà de 20 mg une fois par jour ne produit qu'un léger avantage additionnel.

### **Patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique :**

Chez les patients présentant des lésions hépatiques (hépatite ou cirrhose) ou une dysfonction rénale (clairance de la créatinine inférieure à 40 mL/min), comme pour les autres patients, la dose quotidienne initiale doit être de 5 mg. Compte tenu du risque d'accumulation, il faut faire preuve de prudence pendant l'ajustement posologique. Étant donné que des données limitées indiquent qu'BISOPROLOL n'est pas dialysable, il est inutile de remplacer le médicament chez les patients sous dialyse.

**Gériatrie** : chez les sujets âgés, il n'est généralement pas nécessaire d'ajuster la posologie, sauf en présence d'une dysfonction rénale ou hépatite significative (voir **PRÉCAUTIONS**).

### **Chez l'enfant :**

Aucune donnée ne porte sur l'utilisation de BISOPROLOL en pédiatrie, de sorte que son utilisation ne peut être recommandée chez les enfants.


## **INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES**

### **SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE :**

**Dénomination commune** : fumarate de bisoprolol

**Dénomination chimique** : (+/-)-1- [4- [[2- (1-Méthyléthoxy)éthoxy]méthyl]phénoxy]-3-[1-méthyléthyl)amino] -2-propanol (*E*)-2-butènedioate (2:1) (sel)

Formule développée :



Masse moléculaire : 766,97

Description : poudre cristalline blanche

<u>Solubilités</u> :	<u>Solvant</u>	<u>Solubilité (g/mL)</u>
	Méthanol	1
	Eau	0,6
	Éthanol	0,5
	Chloroforme	0,5
	Acétone	0,009
	Éthylacétate	0,0016

Valeurs du pH : pH d'une solution de 5 % : 6-7

Constantes de dissociation :

Mesurée par dosage potentiométrique, la valeur du pKa de la base libre du bisoprolol est de 9,5.

Les valeurs du pKa de l'acide fumarique sont de 3,03 et 4,44.

Coefficients partiels :

pH, COEFFICIENT DE PARTAGE DANS UN SYSTÈME OCTANOL/TAMPON :

PARTAGE APPARENT	
<u>pH TAMPON</u>	<u>COEFFICIENT</u>
2,0	0,24
3,0	0,20
4,0	0,16
5,0	0,13

6,0	0,24
7,0	1,09
8,0	7,9
9,0	56

Point de fusion : 100-103 °C par méthode capillaire.

Pouvoir rotatoire spécifique : le fumarate de bisoprolol est un mélange racémique d'énantiomères S(-) et R(+). Lors de l'épreuve sur le produit brut, le pouvoir rotatoire spécifique était de zéro en tenant compte de l'erreur de mesure.

Composition :

En plus de l'ingrédient actif, le fumarate de bisoprolol, chaque comprimé contient les ingrédients non médicinaux suivants : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, crospovidone, hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose, polyéthylène glycol et dioxyde de titane. Les comprimés de 5 mg contiennent aussi de l'oxyde de fer rouge.

**STABILITÉ ET CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES**

Les comprimés de BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) doivent être conservés à une température ambiante contrôlée (15 à 30 °C). Aucune autre condition particulière d'entreposage n'est nécessaire.

**PRÉSENTATIONS ET FORMES POSOLOGIQUES**

BISOPROLOL en comprimés de 5 mg :

Comprimés de couleur rose saumon, ronds, biconvexes et pelliculés. Rainurés et portant l'inscription « BIS | 5 » d'un côté et « APO » de l'autre. Offerts en flacons de 100 comprimés.

BISOPROLOL en comprimés de 10 mg :

Comprimés blancs, ronds, biconvexes et pelliculés. Portant l'inscription « BIS | 10 » d'un côté et « APO » de l'autre. Offerts en flacons de 100 comprimés.

## **RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT**

**Renseignements à l'intention du patient :** voici de l'information importante à connaître à propos des comprimés de BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol). BISOPROLOL doit être pris une fois par jour. Il appartient à une classe de médicaments appelés « bêtabloquants ». Votre médecin a pu vous prescrire BISOPROLOL pour mieux maîtriser l'hypertension (tension artérielle élevée). BISOPROLOL diminue la tension artérielle et réduit la charge de travail du cœur.

**Lisez ce feuillet attentivement.** Ce feuillet ne remplace pas les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. Ces derniers peuvent vous avoir donné des instructions différentes selon votre état de santé particulier. Assurez-vous de suivre leurs conseils. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Avant de prendre BISOPROLOL, vous devez aviser votre médecin :**

- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;
- si vous allaitez;
- de tous les problèmes de santé que vous présentez ainsi que vos antécédents, incluant : asthme, bronchite, emphysème ou autres maladies pulmonaires; problème au cœur, aux reins ou au foie; diabète ou glande thyroïde hyperactive;
- si vous consultez plus d'un médecin, assurez-vous qu'ils soient tous au courant de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre, en particulier les diurétiques, les remèdes contre le rhume, les décongestionnants nasaux et les autres médicaments pour le cœur et la tension artérielle;
- avant de subir une chirurgie, dites à votre médecin ou à votre dentiste que vous prenez BISOPROLOL;
- si vous êtes allergique à des ingrédients non médicinaux comme des produits alimentaires, des agents de conservation et des colorants, qui peuvent être présents dans les comprimés de BISOPROLOL (voir Ingrédients de BISOPROLOL);
- si vous avez déjà eu une réaction grave ou inhabituelle, ou allergique à un médicament contenant du bisoprolol.

**Ingrédients de BISOPROLOL :** fumarate de bisoprolol, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, crospovidone, hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose, polyéthylène glycol et dioxyde de titane.

Les comprimés de 5 mg contiennent aussi de l'oxyde de fer rouge.

**Les médicaments suivants peuvent interagir avec BISOPROLOL :**

- le fingolimod, un médicament utilisé pour traiter la sclérose en plaques
- Autres bêta-bloquants
- Médicaments réducteurs des catécholamines (réserpine ou guanéthidine).
- Antihypertenseurs à action centrale (clonidine)
- Antiarythmiques : certains inhibiteurs calciques [en particulier des classes des phénylalkylamines (vérapamil) et des benzothiazépines (diltiazem)], ou antiarythmiques (disopyramide)
- Inhibiteurs des canaux calciques

**Comment prendre BISOPROLOL :** prenez BISOPROLOL **exactement** comme vous l'a indiqué votre médecin. Ne sautez pas de doses et ne prenez pas de doses additionnelles, sauf si votre médecin vous l'a demandé. Si vous n'êtes pas sûr des directives à suivre, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

- BISOPROLOL doit être pris une fois par jour.
- BISOPROLOL peut avoir été prescrit en association avec d'autres médicaments pour vous aider à maîtriser votre maladie; il est important de prendre ces médicaments comme ils vous ont été prescrits.
- Il est important de prendre BISOPROLOL à peu près à la même heure chaque jour.
- Si vous oubliez une dose, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ce que vous devez faire.
- Il ne faut pas mâcher ou écraser les comprimés.

**Effets secondaires :** BISOPROLOL, comme tout médicament, peut causer des effets secondaires. Il est important d'informer votre médecin de tout effet secondaire, en particulier si vous présentez l'un des effets secondaires suivants pendant plusieurs jours. Les effets secondaires les plus fréquents, qu'ils soient causés ou non par BISOPROLOL, sont : céphalée, fatigue, infection des voies urinaires, rhinite ou sinusite (inflammation du nez), diarrhée, étourdissements, œdème périphérique (enflure des chevilles), douleur articulaire, toux, insomnie (difficulté à dormir), nausée (envie de vomir) et maux de gorge. Si vous présentez une réaction allergique avec des symptômes comme une irruption cutanée, des démangeaisons, une enflure, des étourdissements ou des difficultés à respirer, vous devez consulter un médecin **immédiatement**.

Les médicaments ont des effets différents selon les personnes. Ce n'est pas parce que des effets

secondaires se sont produits chez certains patients que vous les aurez aussi. Décrivez à votre médecin ou votre pharmacien comment vous vous sentez lorsque vous prenez BISOPROLOL.

**N'arrêtez pas ou ne recommencez pas le traitement par BISOPROLOL de vous-même.**

**Voici quelques précautions à prendre :**

- Tenez BISOPROLOL hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne donnez pas BISOPROLOL à d'autres personnes, car il se peut qu'il ne leur convienne pas.
- Lisez attentivement l'étiquette de votre ordonnance. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions.

**Entreposage** : ce médicament doit être conservé à une température ambiante (comprise entre 15 et 30 °C).



## **PHARMACOLOGIE**

### **PHARMACOLOGIE HUMAINE**

La bêta<sub>1</sub>-sélectivité du fumarate de bisoprolol a été démontrée dans le cadre d'essais menés chez des animaux et chez l'humain. Lorsqu'il est utilisé à des doses thérapeutiques, aucun effet n'a été noté sur la densité des récepteurs bêta<sub>2</sub>. Des essais sur la fonction respiratoire ont été effectués chez des volontaires asthmatiques et des patients atteints de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) en effectuant des épreuves fonctionnelles respiratoires. Les doses de fumarate de bisoprolol utilisées allaient de 5 à 60 mg, celles d'aténolol de 50 à 200 mg, celles de métoprolol de 100 à 200 mg et celles de propranolol de 40 à 80 mg. Dans certaines études, on a observé une légère augmentation asymptotique de la résistance des voies aériennes (RVA) et une baisse du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) lorsque des doses de 20 mg ou plus de fumarate de bisoprolol étaient administrées, ce qui est similaire à la légère augmentation de la RVA observée avec les autres bêtabloquants cardiosélectifs. Les changements causés par le bêta-blocage relatif à tous les agents ont pu être contrés par un traitement par des bronchodilatateurs.

### **TOXICOLOGIE**

Des études de toxicologie chez les animaux ont démontré que le fumarate de bisoprolol avait une large marge d'innocuité.

Lors d'essais à doses multiples chez le rat et le chien, les effets observés étaient liés aux effets pharmacologiques et/ou étaient des effets de classe aussi connus des autres bêtabloquants et n'étaient donc pas spécifiques du fumarate de bisoprolol. Chez le rat, lorsque des multiples élevés des doses thérapeutiques humaines étaient utilisés, on a observé une augmentation des taux de triglycérides sériques, des foyers de nécrose myocardique, une augmentation de la taille/masse du cœur et une phospholipidose pulmonaire. Chez le chien, le seuil de tolérance au fumarate de bisoprolol a été déterminé par ses effets pharmacologiques (c.-à-d. hypotension) qui ont entraîné une mortalité. Des augmentations des taux de triglycérides sériques et des corps d'inclusion hépatocytaires ont également été observées chez le chien.

#### **Toxicité aiguë :**

La toxicité aiguë du fumarate de bisoprolol a été étudiée chez la souris, le rat et le chien. Les tableaux 3A et 3B ci-dessous résument les résultats obtenus lors des études effectuées.

**TABLEAU 3A : TOXICITÉ AIGUË – BISOPROLOL EN MONOTHÉRAPIE**

Espèce/souche	N <sup>bre</sup> /sexe/dose	Voie	DL <sub>50</sub> (mg/kg)
Souris : EMD : NMRI (SPF)	50 M 50 F	orale	730
Souris : EMD : NMRI (SPF)	35 M 35 F	i.v.	130
Rat : EMD Wistar-AF/(SPF)	45 M 45 F	orale	1 112
Rat : EMD Wistar-AF/(SPF)	35 M 35 F	i.v.	50
Chien : BMD : Beagle	24 M 24 F	orale	90
Chien : BMD : Beagle	20 M 20 F	i.v.	24

**TABLEAU 3B : TOXICITÉ AIGUË – BISOPROLOL/HCTZ  
(COMBINAISON 1:2,5)**

Espèce/souche	N <sup>bre</sup> /sexe/dose	Voie	DL <sub>50</sub> (BIS+HCTZ) (mg/kg)
Souris : EMD: NMRI (SPF)	150 M 150 F	orale gavage	1 050 + 2 620
Rat : EMD Wistar-AF/(SPF)	15 M 15 F	orale gavage	950 + 2 370

Chez la souris et le rat, les signes cliniques étaient les suivants : baisse de l'activité spontanée, procubitus et dyspnée. Chez la souris, des convulsions et des tremblements ont aussi été notés. Les chiens étaient plus sensibles au fumarate de bisoprolol que les rongeurs. Chez le chien, les signes cliniques étaient les suivants : chancellement, salivation, vomissements, décubitus ventral ou latéral, dyspnée, convulsions et spasmes toniques. Chez les trois espèces, les signes cliniques ont été observés peu de temps après l'administration de la dose, et se sont dissipés rapidement chez les animaux qui ont survécu. Aucun effet à retardement n'a été observé.

Les DL<sub>50</sub> de l'énantiomère S(-) chez la souris et le rat étaient similaires ou plus élevées que les DL<sub>50</sub> du fumarate de bisoprolol (mélange racémique).

Chez les souris et les rats, les signes cliniques étaient les suivants : baisse de l'activité spontanée, secousses musculaires, procubitus, tremblements, dyspnée et horripilation. Chez les deux espèces, les signes cliniques ont été observés peu après l'administration du médicament. Les signes cliniques se sont dissipés rapidement chez les souris survivantes, mais ils ont été observés jusqu'au jour 6 chez les rats survivants. Aucune potentialisation de la toxicité aiguë du fumarate de bisoprolol n'a été notée lorsque celui-ci a été administré avec de l'hydrochlorothiazide à des souris ou à des rats.

#### Toxicité de doses multiples :

La toxicité du fumarate de bisoprolol a été étudiée avec des doses orales quotidiennes chez des rats pendant des périodes de 6 semaines et de 3, 6 et 12 mois, ainsi que chez des chiens pendant 1, 6 et 12 mois.

Une étude utilisant des doses i.v. quotidiennes de un mois a été effectuée chez des rats et des chiens. La toxicité du fumarate de bisoprolol en association avec l'hydrochlorothiazide a été étudiée chez chaque espèce en utilisant des doses quotidiennes orales administrées pendant six mois.

Les résultats de ces études sont présentés aux tableaux 4A et 4B ci-dessous.

#### Nécrose du myocarde :

Les tableaux 5A et 5B présentent les études réalisées sur la nécrose du myocarde. Une fibrose et/ou une nécrose focales minimes du myocarde, accompagnées d'infiltrats inflammatoires de diverses importances ont été observées dans les coupes du myocarde des mâles (mais pas des femelles) chez les animaux traités par le médicament, ainsi que chez ceux du groupe témoin lors de l'étude de six mois utilisant du fumarate de bisoprolol avec l'hydrochlorothiazide en concomitance. En général, les changements focaux myocardiques des rats du groupe témoin étaient similaires à ceux des rats traités par le médicament pour ce qui était de la morphologie, de la gravité et de leur emplacement dans le myocarde. Les taux d'incidence semblaient être plus élevés dans les groupes qui ont reçu le traitement actif que dans les groupes témoins.

Nous savons que les médicaments cardiotoniques, en tant que classe pharmacologique, causent des changements du myocarde chez le rat (Van Vleet et Ferrans, 1986) et qu'une fibrose et/ou une nécrose focales minimes du myocarde sont souvent observées chez les rats mâles non traités (Boorman, 1981; Greaves et Faccini, 1984). Les résultats des deux études de trois mois menées

chez le rat ont démontré que : 1) Des multiples élevés des doses thérapeutiques humaines de fumarate de bisoprolol, de métoprolol et d'hydrochlorothiazide, seules et en association, augmentaient l'incidence de la fibrose/nécrose focale myocardique chez les rats mâles. 2) Lorsque le fumarate de bisoprolol était administré avec de l'hydrochlorothiazide, l'incidence de la fibrose/nécrose focale myocardique du groupe paraissait légèrement plus élevée que lorsque chaque agent était administré en monothérapie. 3) Les changements décrits affectant le myocarde avaient la même morphologie et la même gravité entre les groupes témoins et les groupes sous traitement.

TABLEAU 4A : TOXICITÉ SUBAIGUË ET CHRONIQUE – BISOPROLOL EN MONOTHÉRAPIE

Espèce/souche	N <sup>bre</sup> /sexe/ dose	Voie	Doses (mg/kg/jour)	Durée (semaines)	Résultats
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	10	Orale Gavage	0, 20, 60, 180, 540	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Élévation dose-dépendante des triglycérides sériques à des doses de 60 à 540 mg/kg/jour.</li> <li>– Incidence plus élevée de phospholipidose pulmonaire à des doses <math>\geq</math> 180 mg/kg/jour. Les changements étaient réversibles suivant à l'arrêt du traitement.</li> <li>– Nodules corticosurrénaux observés chez toutes les F.</li> </ul>
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	10	Orale Alimentation	0, 100, 150, 225, 350, 500	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masse, circonférence et volume cardiaques accrus.</li> <li>– Volume et surface ventriculaire gauche accrus<sup>a</sup>.</li> <li>– Incidence plus élevée de phospholipidose à des doses <math>\geq</math> 225 mg/kg/jour.</li> <li>– Nodules corticosurrénaux observés chez toutes les F traitées.</li> </ul>
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	25	Orale Gavage	0, 15, 50, 150	26 (suivies de 4 semaines de convalescence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hausse dose-dépendante des triglycérides sériques à des doses de 50 à 150 mg/kg/jour.</li> <li>– Masse, circonférence et volume cardiaques accrus.</li> <li>– Volume et surface ventriculaire gauche accrus<sup>a</sup>.</li> <li>– Nodules corticosurrénaux observés chez toutes les F.</li> </ul>
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	20	Orale Alimentation	0, 25, 75, 225	52 (suivies de 13 semaines de convalescence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masse, circonférence et volume cardiaques accrus.</li> <li>– Volume et surface ventriculaire gauche accrus<sup>a</sup>.</li> </ul>
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	12	i.v.	0, 0,2, 1, 5	4 (suivies de 4 semaines de convalescence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aucun décès ni observation <i>ante-mortem</i> ou à l'autopsie en lien avec le médicament.</li> </ul>

TABLEAU 4A : TOXICITÉ SUBAIGUË ET CHRONIQUE – BISOPROLOL EN MONOTHÉRAPIE (SUITE)

Espèce/ souche	N <sup>bre</sup> /sexe /dose	Voie	Doses (mg/kg/jour)	Durée (semaines)	Résultats
Chien : Beagle	3	Orale Gélules	0, 3, 10, 30, 100	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tremblements, léthargie et bradycardie transitoire à 100 mg/kg/jour.</li> <li>– 1 décès à 100 mg/kg/jour<sup>b</sup>.</li> <li>– Salivation et vomissements jusqu'à 3 h post-dose à 100 mg/kg/jour.</li> </ul>
Chien : Beagle	8 6 6 8	Orale Gélules	0 10 27 73	26 (suivies de 8 semaines de convales- cence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 décès à 73 mg/kg/jour<sup>b</sup>.</li> <li>– Salivation, vomissements, tremblements, chancellement et léthargie à <math>\geq 27</math> mg/kg/jour.</li> <li>– Légère réduction de la TA systolique moyenne et de la FC dans tous les groupes testés.</li> <li>– Corps d'inclusion hépatocytaires à <math>\geq 27</math> mg/kg/jour.</li> </ul>
Chien : Beagle	6	Orale Gélules	0, 3, 10, 30	52 (suivies de 8 semaines de convales- cence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 décès à 30 mg/kg/jour<sup>b</sup>.</li> <li>– Salivation et vomissements jusqu'à 3 h post-dose à 30 mg/kg/jour.</li> <li>– Augmentation de la FC moyenne à toutes les doses.</li> <li>– Corps d'inclusion hépatocytaires dans les groupes témoins et testés.</li> </ul>
Chien : Beagle	2	i.v.	0, 1, 3, 10	4	– Aucun décès ni toxicité.
Chien : Beagle	5 ou 8	Orale Gélules	0, 3, 10, 30	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 décès à 30 mg/kg, 1 décès à 10 mg/kg.</li> <li>– Salivation, vomissements, larmoiement et selles molles à toutes les doses testées.</li> <li>– Augmentation des taux de triglycérides sériques à toutes les doses testées.</li> </ul>
Chien : Beagle	5 ou 8	Orale Gélules	20, 30	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Quatre décès à <math>\geq 20</math> mg/kg/jour.</li> <li>– Allongement de l'intervalle PR, bloc AV du premier degré et extrasystole auriculaire et ventriculaire chez tous les animaux survivants.</li> <li>– Salivation, vomissements, larmoiement et selles molles dans les deux groupes testés.</li> <li>– Augmentation des taux de triglycérides sériques.</li> </ul>

TABLEAU 4B : TOXICITÉ SUBAIGUË ET CHRONIQUE – BISOPROLOL ET HCTZ (RAPPORT DE 1:25)

Espèce/ souche	N <sup>bre</sup> /sexe /dose	Voie	Dose Groupe BIS+HC TZ (mg/kg/ jour)	Durée (semaines)	Résultats
Rat : Wistar-AF HAN/SPF	1 510	Orale Gavage	0 10,5 (3+7,5) 35 (10+25) 105 (30+75) 7,5 (HCTZ seul) 75 (HCTZ seul)	26 (suivies de 8 semaines de convales- cence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Baisse de la FC à 10:25 mg/kg/jour.</li> <li>– Fouissement et salivation à 10:25 et 30:75 mg/kg/jour.</li> <li>– Une fibrose et/ou une nécrose<sup>a</sup> focales minimales myocardiques accompagnées d'infiltrats inflammatoires de diverses importances chez les mâles des groupes témoins et testés.</li> <li>– Les taux d'incidence de changements focaux du myocarde semblent plus élevés dans les groupes qui ont reçu seulement du bisoprolol, de l'HCTZ ou l'association de ces deux agents que dans les groupes témoins.</li> </ul>
Chien : Beagle	5	Orale Gélules	0 10,5 (3+7,5) 35 (10+25) 25 (HCTZ seul)	26 (suivies de 8 semaines de convales- cence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Légère diminution de la FC et léger allongement de l'intervalle PQ à 3:7,5 et à 10:25 mg/kg/jour.</li> <li>– Changements sporadiques de la masse des organes.</li> <li>– Une augmentation de la nécrose unicellulaire des hépatocytes est observée à 10:25 mg/kg/jour et dans les groupes qui ont reçu l'HCTZ.</li> <li>– Augmentation des hépatocytes binucléés dans le groupe qui a reçu 10:25 mg/kg/jour.</li> <li>– La nécrose unicellulaire des hépatocytes a été le seul changement histopathologique observé après la convalescence.</li> </ul>

(a) concernant la nécrose du myocarde, veuillez vous référer aux tableaux 5A et 5B.

(b) collapsus cardiovasculaire dû à une formation d'influx et des troubles de la conduction

TABLEAU 5A

**Nécrose du myocarde lors d'études sur le bisoprolol  
et l'association bisoprolol/hydrochlorothiazide (1:2,5) chez des rats mâles**

Étude	Sommaire de l'incidence de la nécrose du myocarde				
	Dose (mg/kg) :	0	15	50	150
3 mois sous bisoprolol		1/5	1/5	2/5	2/5
6 mois sous bisoprolol		6/10	3/10	5/10	7/10
6 mois sous bisoprolol suivis de 2 mois de convalescence		3/10	3/10	0/10	3/10

Étude	Sommaire de l'incidence de la nécrose du myocarde						
	Dose (mg/kg) : Bisoprolol Hydrochlorothiazide	0	3 7,5	10 25	30 75	0 7,5	0 75
6 mois sous bisoprolol		1/10	5/10	6/10	7/10	2/5	2/5
6 mois sous bisoprolol avec 2 mois de convalescence		1/5	–	–	2/5	–	2/5

Étude	Sommaire de l'incidence de la nécrose du myocarde				
	Dose (mg/kg) :	0	25	75	225
12 mois sous bisoprolol		5/10	8/10	5/10	7/10
12 mois sous bisoprolol suivis de 3 mois de convalescence		5/10	4/10	4/10	5/10



TABLEAU 5B

**Nécrose du myocarde lors d'études de trois mois sur le bisoprolol,  
le métoprolol et l'hydrochlorothiazide chez des rats mâles**

<b>Sommaire de l'incidence de la nécrose du myocarde</b>				
<b>Groupe :</b>	<b>Témoin</b>	<b>Bisoprolol</b>	<b>Hydrochlorothiazide</b>	<b>Bisoprolol + hydrochlorothiazide</b>
Dose (mg/kg) :	0	30	75	30 + 75
Incidence	5/20	8/20	6/20	12/10
<b>Groupe :</b>	<b>Témoin</b>	<b>Métoprolol</b>	<b>Hydrochlorothiazide</b>	<b>Métoprolol + hydrochlorothiazide</b>
Dose (mg/kg) :	0	300	150	300 + 150
Incidence	2/20	16/20	9/20	14/20

En conclusion, le fumarate de bisoprolol et le métoprolol, seuls ou en association avec de l'hydrochlorothiazide, de même que l'hydrochlorothiazide seul, sont associés à une incidence accrue de changements myocardiques minimes chez les rats mâles qui ont reçu des doses correspondant à des multiples élevés des doses thérapeutiques chez l'humain. Ces changements du myocarde ne sont pas graves, et leur effet est propre à l'espèce et au sexe. Les changements myocardiques susmentionnés sont fort probablement un effet de classe, et sont probablement dus aux effets pharmacologiques exagérés de ces médicaments lorsqu'ils sont pris à des doses élevées. Le métoprolol est sur le marché et utilisé depuis plus de 10 ans; l'hydrochlorothiazide l'est depuis plus de 20 ans, et les associations à dose fixe de métoprolol et d'hydrochlorothiazide le sont depuis plusieurs années. Par conséquent, on ne considère pas les résultats obtenus lors de ces études sur le myocarde comme un signe quelconque de risque possible chez l'homme.

Cancérogenèse :

Des études à long terme ont été menées sur le fumarate de bisoprolol par voie orale administré à des souris par l'alimentation (20 et 24 mois) et à des rats (26 mois). Aucun signe de potentiel carcinogène n'a été observé en utilisant des doses allant jusqu'à 250 mg/kg/jour chez les souris et jusqu'à 123 mg/kg/jour chez les rats. D'après la masse corporelle, ces doses représentent 625 et 312 fois, respectivement, la dose maximale recommandée chez l'humain (DMRH) de 20 mg (ou 0,4 mg/kg/jour d'après le poids d'une personne de 50 kg); d'après la surface corporelle, ces doses représentent 59 fois (souris) et 64 fois (rats) la DMRH.

### Tératologie et reproduction :

Lors d'études de toxicité sur la reproduction menées chez le rat, le fumarate de bisoprolol n'a pas eu d'effets sur la fertilité ou sur la fonction reproductrice en général. Le fumarate de bisoprolol, comme les autres bêtabloquants, a causé des effets maternels et embryotoxiques à des doses élevées, mais il n'était pas tératogène chez les rats ni chez les lapins. Lors d'une étude périnatale et postnatale menée chez le rat, on a noté des effets toxiques maternels et des poids inférieurs à la naissance avec la dose élevée, mais aucun autre effet sur la fonction reproductrice n'a été noté.

Le fumarate de bisoprolol était fœtotoxique (augmentation du nombre de résorptions tardives) à 50 mg/kg/jour et maternotoxique (diminution de la consommation d'aliments et du gain pondéral) à 150 mg/kg/jour. Chez le rat, la fœtotoxicité est apparue avec une dose de 125 fois la DMRH basée sur le poids corporel, et à 26 fois la DMRH basée sur la surface corporelle. La maternotoxicité s'est produite à 375 fois la DMRH basée sur le poids corporel, et à 77 fois la DMRH basée sur la surface corporelle. Chez les lapins, le fumarate de bisoprolol n'a pas été tératogène à des doses pouvant atteindre 12,5 mg/kg/jour, soit 31 et 12 fois la DMRH basée sur le poids corporel et sur la surface corporelle, respectivement, mais il a été embryocide (augmentation du nombre de résorptions précoces) à 12,5 mg/kg/jour.

### Mutagenèse :

Le potentiel mutagène du fumarate de bisoprolol a été évalué par un test de mutagenèse microbienne (Ames), des tests de mutation ponctuels et des aberrations chromosomiques sur des cellules V79 de hamsters chinois, des tests de synthèse non programmés d'ADN, du test du micronoyau chez la souris et des essais cytogénétiques chez le rat. Aucun signe de potentiel mutagène n'a été détecté lors de ces essais *in vivo* et *in vitro*.

**BIBLIOGRAPHIE**

1. Buhler FR, Berglund G, Anderson OK, Brunner HR, Scherrer U, van Brummelin P, Distler A, Philipp T, Fogari R, Mimran A, Fourcade J, dal Palu C, Prichard BNC, Backhouse CI, Reid JL, Elliott H, Zanchetti A. Double-blind comparison of the cardioselective R-blockers bisoprolol and atenolol in hypertension: the Bisoprolol International Multicenter Study (BIMS). *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S122-S127.
2. Chatterjee SS. The cardioselective and hypotensive effects of bisoprolol in hypertensive asthmatics. *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S74-S77.
3. Janka HU, Ziegler AG, Disselhoff G, Mehnert H. Influence of bisoprolol on blood glucose, glucosuria, and haemoglobin A1 in noninsulin-dependent diabetics. *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S96-S99.
4. Kirch W, Rose I, Klingmann I, Pabst J, Ohnhaus EE. Interaction of bisoprolol with cimetidine and rifampicin. *Eur J Clin Pharmacol* 1986; 31:59 - 62.
5. Kirch W, Rose I, Demers HG, Leopold G, Pabst J, Ohnhaus EE. Pharmacokinetics of bisoprolol during repeated oral administration to healthy volunteers and patients with kidney or liver disease. *Clin Pharmacokin* 1987; 13:110-117.
6. Neuss H, Conrad A, Mitrovic V, Schlepper M. Electrophysiologic effects of an acute  $\beta$ -blockade induced by bisoprolol in patients with supraventricular tachycardia as assessed by His-bundle electrograms. *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S167-S170.
7. Pfannenstiel P, Rummeny E, Baew-Christow T, Bux B, Cordes M, Adam W, Panitz N, Pabst J, Disselhoff G. Pharmacokinetics of bisoprolol and influence on serum thyroid hormones in hyperthyroid patients. *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S100-S105.
8. Tattersfield AE. Assessment of  $\beta$ -adrenoceptor selectivity of a new  $\beta$ -adrenoceptor antagonist, bisoprolol, in man. *Br J Clin Pharmacol* 1984; 18:343 - 347.
9. Weiner L, Frithz G. Antihypertensive effects of bisoprolol during once daily administration in patients with essential hypertension; a dose-ranging study with parallel groups. *Eur J Clin Pharmacol* 1986; 29:517 - 521.
10. Weiner L, Frithz G. Dose-effect relationship and long-term effects of bisoprolol in mild to moderate hypertension. *J Cardiovascular Pharmacol* 1986; 8(Suppl. 11):S106-S112.
11. Zbinden, G. Pulmonary Lipidosis, in Progress in Toxicology Special Topics. New York, Springer Verlag. 1976; vol. II, pp 34 - 33.

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET  
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT  
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX PATIENTS**

** BISOPROLOL**

**Comprimés de fumarate de bisoprolol, USP**

Veuillez lire attentivement le présent dépliant avant de commencer à prendre **BISOPROLOL** et chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Parlez à votre professionnel de la santé de votre affection médicale et de votre traitement, et demandez-lui s'il existe de nouveaux renseignements au sujet de BISOPROLOL.

**Quelles sont les raisons d'utiliser BISOPROLOL ?**

BISOPROLOL (fumarate de bisoprolol) est utilisé pour le traitement de l'hypertension légère ou modérée. Il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments pour maîtriser la tension artérielle.

**Comment BISOPROLOL agit-il ?**

BISOPROLOL est un type de médicament appelé « bêtabloquant ». Il agit en diminuant la tension artérielle et en réduisant le travail du cœur.

**Quels sont les ingrédients de BISOPROLOL ?**

Ingrédient médicinal : fumarate de bisoprolol

Ingrédients non médicinaux : cellulose microcristalline, crospovidone, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, monohydrate de lactose, polyéthylèneglycol et stéarate de magnésium.

Les comprimés de 5 mg contiennent aussi de l'oxyde de fer rouge.

**BISOPROLOL est offert dans les formes posologiques suivantes :**

Comprimés : 5 mg (rose) et 10 mg (blanc).

**Vous ne devez pas utiliser BISOPROLOL si :**

- vous êtes allergique au fumarate de bisoprolol ou à l'un des ingrédients non médicinaux de BISOPROLOL;
- vous êtes enceinte, prévoyez devenir enceinte, ou si vous allaitez. Vous devez cesser d'allaiter avant de prendre BISOPROLOL;
- vous êtes atteint d'une des maladies cardiaques suivantes : insuffisance cardiaque ou tout autre trouble cardiaque.

**Parlez à votre professionnel de la santé avant de prendre BISOPROLOL, afin d'éviter la survenue de tout effet secondaire et d'assurer l'utilisation correcte du médicament. Discutez de toute affection ou de tout problème de santé dont vous êtes atteint, notamment si :**

- vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque;
- vous souffrez d'asthme, de bronchite, d'emphysème ou d'une autre maladie

- pulmonaire;
- vous avez une maladie cardiaque, rénale ou hépatique;
  - vous êtes atteint de diabète. BISOPROLOL peut masquer certains des symptômes du diabète;
  - vous présentez un accroissement des sécrétions de la glande thyroïde (hyperthyroïdie). BISOPROLOL peut masquer les symptômes de l'hyperthyroïdie;
  - vous devez recevoir un agent anesthésique avant de subir une intervention chirurgicale;
  - vous avez des antécédents de réactions de type allergique ou êtes allergique à divers allergènes;
  - vous êtes atteint d'une affection appelée maladie artérielle périphérique, ce qui signifie que le diamètre de vos artères est plus petit et que celles-ci ne transportent pas le sang vers vos jambes aussi facilement. Le traitement par BISOPROLOL peut provoquer des symptômes ou aggraver vos symptômes.

### **Autres mises en garde :**

#### Insuffisance cardiaque

Les patients qui prennent des bêtabloquants peuvent présenter une insuffisance cardiaque. Votre médecin surveillera l'apparition de signes et de symptômes d'insuffisance cardiaque pendant que vous prenez BISOPROLOL.

#### Arrêt du traitement par BISOPROLOL

Vous devez continuer de prendre BISOPROLOL jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter de le faire. Votre médecin vous dira de diminuer graduellement les doses sur une période de deux semaines si vous devez arrêter le traitement et lorsque le moment sera venu d'arrêter le traitement.

#### Éruption cutanée

Une éruption cutanée peut survenir pendant que vous prenez BISOPROLOL. Informez votre médecin en cas d'éruption cutanée grave.

#### Ralentissement de la fréquence cardiaque

Votre fréquence cardiaque peut ralentir pendant que vous prenez BISOPROLOL. Si elle ralentit trop, il se peut que votre dose soit réduite ou que votre médecin vous dise d'arrêter de prendre BISOPROLOL.

#### Réactions allergiques

Pendant que vous prenez BISOPROLOL :

- une réaction allergique grave peut être plus difficile à traiter;
- vous pouvez être plus susceptible de présenter une réaction allergique grave.

#### Analyses de sang

Votre médecin vous prescrira des analyses de sang régulières pendant que vous prenez BISOPROLOL, afin de surveiller vos cellules sanguines, vos reins et votre foie.

**Vous devez informer votre professionnel de la santé de tout produit de santé que vous prenez, y compris des médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce. Les médicaments suivants peuvent interagir avec BISOPROLOL :**

- Autres bêtabloquants
- Réserpine ou guanéthidine (médicaments pour le cœur)
- Clonidine (médicament pour traiter l'hypertension)
- Vérapamil, diltiazem, disopyramide (médicaments pour traiter l'hypertension et médicaments pour le cœur)
- Fingolimod (immunosuppresseur)
- Rifampicine (antibiotique) : peut réduire l'efficacité de BISOPROLOL, car elle entraîne une élimination plus rapide du bisoprolol dans l'organisme
- Les médicaments contre le rhume et les gouttes nasales peuvent augmenter la tension artérielle

**Comment prendre BISOPROLOL :**

- Prenez BISOPROLOL **exactement** comme votre professionnel de la santé vous l'a prescrit.
- N'omettez aucune dose et ne prenez aucune dose supplémentaire, sauf indication contraire de votre professionnel de la santé. Si vous ne comprenez pas bien le mode d'emploi, consultez votre professionnel de la santé ou votre pharmacien. Il est possible que vous preniez BISOPROLOL en association avec d'autres médicaments pour aider à maîtriser votre tension artérielle. Prenez ces médicaments comme ils vous ont été prescrits.
- Prenez BISOPROLOL une fois par jour, environ à la même heure.
- Avalez les comprimés BISOPROLOL entiers. Vous ne devez pas mâcher ou écraser les comprimés.

**Posologie habituelle :**

Votre médecin déterminera la dose. Vous prendrez probablement entre 5 mg et 20 mg de BISOPROLOL une fois par jour.

Votre professionnel de la santé surveillera régulièrement votre état. La dose peut changer selon l'efficacité de BISOPROLOL.

**Surdosage :**

Si vous pensez avoir pris trop de BISOPROLOL, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.
---

**Dose oubliée :**

- Si vous oubliez une dose de BISOPROLOL, prenez-la aussitôt que vous vous en apercevez le même jour.
- Prenez la dose suivante à l'heure habituelle le jour suivant.
- Ne prenez pas plus d'une dose de BISOPROLOL à la fois pour compenser une dose oubliée.

### Quels sont les effets secondaires possibles de BISOPROLOL?

Lorsque vous prenez BISOPROLOL, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si vous éprouvez des effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé. Les effets secondaires les plus fréquents sont les suivants :

- Maux de tête
- Fatigue
- Inflammation des muqueuses nasales (rhinite ou sinusite)
- Diarrhée
- Étourdissements
- Douleurs articulaires
- Difficulté à dormir
- Nausées (envie de vomir)
- Mal de gorge
- Douleurs abdominales, indigestion
- Douleur au dos
- Toux

Informez votre professionnel de la santé si :

- l'un de ces effets vous touche gravement;
- l'un de ces effets dure plusieurs jours.

Les médicaments n'ont pas les mêmes effets d'une personne à l'autre. Ce n'est pas parce que certains patients ont présenté des effets secondaires qu'il en sera de même pour vous. Discutez de votre état sous BISOPROLOL avec votre professionnel de la santé ou votre pharmacien. **N'interrompez pas ou ne recommencez pas votre traitement par BISOPROLOL par vous-même.**

Effets secondaires graves et procédures à suivre			
Symptôme/effet	Parlez à votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux immédiats
	Cas graves seulement	Tous les cas	
<b>FRÉQUENTS</b>			
Douleurs musculaires	√		
<b>Réaction allergique :</b> Étourdissements ou troubles respiratoires, peau chaude ou démangeaisons, éruptions cutanées, enflure			√
<b>Bronchite :</b> toux,	√		

production de mucus, fatigue, essoufflement, malaise thoracique, légère fièvre			
Douleur thoracique		√	
Dépression		√	
Diarrhée	√		
<b>Difficulté à respirer :</b> essoufflement, congestion nasale (nez bouché), respiration sifflante	√		
Étourdissements	√		
Fatigue	√		
Fièvre	√		
Enflure générale du corps		√	
Bouffées de chaleur	√		
<b>Impuissance (chez les hommes) :</b> difficulté à avoir ou à maintenir une érection		√	
Arthralgie		√	
Crampes musculaires	√		
<b>Néuralgie :</b> douleur en coup de poignard ou douleur à type de brûlure		√	
Bruits persistants dans les oreilles	√		
Enflure des mains, des chevilles et des pieds		√	
Anomalie de la vision		√	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui ne figure pas dans cette liste ou qui devient suffisamment gênant pour compromettre vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez contribuer à l'amélioration de l'utilisation sécuritaire des produits de santé pour les Canadiens en signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada. Votre déclaration peut nous permettre d'identifier de nouveaux effets



secondaires et de changer les renseignements liés à l'innocuité des produits.

**3 façons de signaler :**

- En ligne à [MedEffet](#);
- Par téléphone (numéro sans frais) : 1-866-234-2345;
- En remplissant un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur et en le faisant parvenir :
  - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou
  - par la poste au :
    - Programme Canada Vigilance
    - Santé Canada
    - Indice postal 1908C
    - Ottawa (Ontario)
    - K1A 0K9

Des étiquettes affranchies et le formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur sont disponibles sur le site Web de [MedEffet](#).

*REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

**Conservation :**

- Conserver à température ambiante, entre 15 °C et 30 °C.
- Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

**Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur BISOPROLOL :**

- Parlez à votre professionnel de la santé.
- Vous pouvez obtenir la monographie de produit complète préparée à l'intention des professionnels de la santé (qui contient le présent dépliant « Renseignements sur le médicament destinés aux patients »), en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>), le site Web de Sanis Health Inc. ([www.sanis.com](http://www.sanis.com)) ou en contactant Sanis Health Inc. au :

1-866-236-4076  
ou [quality@sanis.com](mailto:quality@sanis.com)

Ce feuillet de renseignements a été rédigé par :  
Sanis Health Inc.  
1 President's Choice Circle  
Brampton, Ontario  
L6Y 5S5

Dernière révision : 27 mai 2020