

ACTIVE INGREDIENT: Propylene glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** is indicated as an aid in the treatment of acetonemia (ketosis) in cattle and sheep.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Administer orally in the drinking water, in the grain ration or as a drench.

Cattle:

Mild cases: 120 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 240 mL morning and evening. Repeat as required.

Sheep:

Mild cases: 22.5 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 45 mL morning and evening. Repeat as required.

CAUTIONS: If no improvement is noted a few days after initiation of treatment, diagnosis should be reconsidered.

Please call a veterinarian if deterioration of the clinical state is noticed.

STORAGE: Store between 15-30°C.

LOT: EXP:



DIN 02343266

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

PROPYLENE GLYCOL

Propylene Glycol USP
Propylène glycol USP

Net 3.785 L

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PAH-035

Partnar Animal Health Inc.
14057 Ilderton Road, Ilderton, ON, Canada N0M 2A0

INGRÉDIENT ACTIF: Propylène glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** est indiqué comme aide au traitement de l'acétonémie (ketosis) chez les bovins et les moutons.

DOSAGE ET MODE D'ADMINISTRATION: Par voie orale dans l'eau de boisson, dans la ration de grain ou comme breuvage.

Bovins:

Cas bénin: 120 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 240 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Moutons:

Cas bénin: 22.5 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 45 mL matin et soir. Répéter au besoin.

PRÉCAUTIONS: Si aucune amélioration n'est notée quelques jours après le début du traitement, le diagnostic devrait être reconstruit. Appeler un vétérinaire si vous notez une détérioration de l'état de santé de l'animal.

ENTREPOSAGE: Entreposer entre 15-30°C.

Iss. 06.2013

ACTIVE INGREDIENT: Propylene glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** is indicated as an aid in the treatment of acetonemia (ketosis) in cattle and sheep.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Administer orally in the drinking water, in the grain ration or as a drench.

Cattle:

Mild cases: 120 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 240 mL morning and evening. Repeat as required.

Sheep:

Mild cases: 22.5 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 45 mL morning and evening. Repeat as required.

CAUTIONS: If no improvement is noted a few days after initiation of treatment, diagnosis should be reconsidered.

Please call a veterinarian if deterioration of the clinical state is noticed.

STORAGE: Store between 15-30°C.

LOT: EXP:



DIN 02343266

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

PROPYLENE GLYCOL

Propylene Glycol USP
Propylène glycol USP

Net 20 L

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PAH-034

Partnar Animal Health Inc.
14057 Ilderton Road, Ilderton, ON, Canada N0M 2A0

INGRÉDIENT ACTIF: Propylène glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** est indiqué comme aide au traitement de l'acétonémie (ketosis) chez les bovins et les moutons.

DOSAGE ET MODE D'ADMINISTRATION: Par voie orale dans l'eau de boisson, dans la ration de grain ou comme breuvage.

Bovins:

Cas bénin: 120 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 240 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Moutons:

Cas bénin: 22.5 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 45 mL matin et soir. Répéter au besoin.

PRÉCAUTIONS: Si aucune amélioration n'est notée quelques jours après le début du traitement, le diagnostic devrait être reconstruit. Appeler un vétérinaire si vous notez une détérioration de l'état de santé de l'animal.

ENTREPOSAGE: Entreposer entre 15-30°C.

Iss. 12.2015



Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

PROPYLENE GLYCOL

Propylene Glycol USP/Propylène glycol USP
Net 200 L

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LE PORTÉE DES ENFANTS

ACTIVE INGREDIENT: Propylene glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** is indicated as an aid in the treatment of acetonemia (ketosis) in cattle and sheep.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Administer orally in the drinking water, in the grain ration or as a drench.

Cattle: Mild cases: 120 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 240 mL morning and evening. Repeat as required.

Sheep: Mild cases: 22.5 mL morning and evening. Repeat as required.

Severe cases: 45 mL morning and evening. Repeat as required.

CAUTIONS: If no improvement is noted a few days after initiation of treatment, diagnosis should be reconsidered. Please call a veterinarian if deterioration of the clinical state is noticed.

STORAGE: Store between 15-30°C.

LOT: EXP:

INGRÉDIENT ACTIF: Propylène glycol USP 100% v/v.

INDICATIONS: Partnar **Propylene Glycol** est indiqué comme aide au traitement de l'acétonémie (ketosis) chez les bovins et les moutons.

DOSAGE ET MODE D'ADMINISTRATION: Par voie orale dans l'eau de boisson, dans la ration de grain ou comme breuvage.

Bovins:

Cas bénin: 120 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 240 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Moutons:

Cas bénin: 22.5 mL matin et soir. Répéter au besoin.

Cas sévère: 45 mL matin et soir. Répéter au besoin.

PRÉCAUTIONS: Si aucune amélioration n'est notée quelques jours après le début du traitement, le diagnostic devrait être reconstruit. Appeler un vétérinaire si vous notez une détérioration de l'état de santé de l'animal.

ENTREPOSAGE: Entreposer entre 15-30°C.