

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

# Eprinex<sup>®</sup>

(eprinomectin)

**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**

**Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard**

**ACTIVE INGREDIENT:** Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNINGS**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, no meat withdrawal time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, no milk withholding time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on dairy cattle.

**INDICATIONS**

1. **CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.
2. **DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**


1. For topical application only; do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store bottle in carton to protect from light.

LOT:

EXP:



Argentine Number

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc., 5180 South Service Road, Burlington ON L7L 5H4  
EPRINEX<sup>®</sup> is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.

2022-2510-02

**Net Contents: 1 L**



**DATE SUBMITTED: June 25, 2020 (Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.)**

**APPROVED**

By Normand Plourde at 10:50 am, Jun 23, 2020

Please provide the regulatory required implementation date for each country or country group providing approvals.



**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**  
**Solution à verser**  
 pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers  
**(eprinomectin)**  
**Eprinex**

DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Eprinex**

(eprinomectin)

**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

**Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.**



**INGRÉDIENT ACTIF :** chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Notes à l'utilisateur**

- (1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX® chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.
- (2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX® chez les bovins laitiers.



**Contenu net : 1 L**

LOT:

EXP:

**Variable Data**  
(lot/exp date)  
Print Area

**INDICATIONS**

**1. CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.

**2. DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX® Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX® Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX® Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**

1. For topical application only: do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store bottle in carton to protect from light.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.

2030-2508-02

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

**Eprinex**

(eprinomectin)

**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**

**Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard**



**ACTIVE INGREDIENT:**

Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNINGS**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, no meat withdrawal time is required following the use of EPRINEX® Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, no milk withholding time is required following the use of EPRINEX® Pour-On on dairy cattle.

**Net Contents: 1 L**



**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poulmon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeurs, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDES** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poulmon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX® doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX® est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX® aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservez à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le fumier sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conservé dans la bouteille dans son emballage de carton pour la protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Eprinex**<sup>®</sup>  
(eprinomectin)



**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

**Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.**

**INGRÉDIENT ACTIF :** chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Notes à l'utilisateur**

(1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.

(2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins laitiers.

**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poumon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeur, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDES** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poumon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservée à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le foin sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conserver la bouteille dans son emballage de carton pour la protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.  
5180 South Service Road, Burlington ON L7L 5H4  
EPRINEX<sup>®</sup> est une marque déposée de Boehringer Ingelheim  
Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

2022-2509-02

Argenta Number

Contenu net : 1 L



**DATE SUBMITTED: June 25, 2020**  
**(Boehringer Ingelheim Animal Health**  
**Canada Inc.)**

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

# Eprinex<sup>®</sup>

(eprinomectin)

**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**



**Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard**

**ACTIVE INGREDIENT:** Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNINGS**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, no meat withdrawal time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, no milk withholding time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on dairy cattle.

**INDICATIONS**

**1. CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.

**2. DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**

1. For topical application only: do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store collapsible pack in carton to protect from light.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.  
5180 South Service Road, Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.



LOT:

EXP:

**Net Contents: 2.5 L**



Pharmaceutical area

2022-2513-02

Argentina Number

**DATE SUBMITTED: June 25, 2020 (Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.)**

DATE SUBMITTED: June 25, 2020 (Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.)



Pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers  
Solution à verser  
Pour-On for Beef and Dairy Cattle  
(eprinomectin)  
**Eprinex**

XXXXXXXXXX

DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Eprinex**  
(eprinomectin)

**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.



INGRÉDIENT ACTIF : chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Notes à l'utilisateur**

- (1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX® chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.
- (2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX® chez les bovins laitiers.

 **Boehringer  
Ingelheim**

**Contenu net : 2,5 L**

LOT: Variable Data  
(lot/exp date)  
EXP: Print Area

**INDICATIONS**

**1. CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.

**2. DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX® Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX® Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX® Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**

1. For topical application only; do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store collapsible pack in carton to protect from light.

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX® is a registered trademark of Boehringer  
Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.

2030-2511-02

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

**Eprinex**  
(eprinomectin)

**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**

Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard



**ACTIVE INGREDIENT:** Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNINGS**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, no meat withdrawal time is required following the use of EPRINEX® Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, no milk withholding time is required following the use of EPRINEX® Pour-On on dairy cattle.

**Net Contents: 2.5 L**

 **Boehringer  
Ingelheim**

**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poumon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeurs, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDES** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poumon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX® doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX® est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX® aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservée à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le fumier sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conserver l'ensemble compressible dans son emballage de carton pour le protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale  
Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim  
Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Eprinex**<sup>®</sup>  
(eprinomectin)



**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

**Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.**

**INGRÉDIENT ACTIF** : chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Notes à l'utilisateur**

(1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.

(2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins laitiers.

**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poumon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeur, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDÉS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poumon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservée à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le fumier sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conservé l'ensemble compressible dans son emballage de carton pour le protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

2022-2512-02

Contenu net : 2,5 L

 **Boehringer  
Ingelheim**

Argentina Number

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

# Eprinex<sup>®</sup>

(eprinomectin)



## Pour-On for Beef and Dairy Cattle

**Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard**

**ACTIVE INGREDIENT:** Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNING**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, no meat withdrawal time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, no milk withholding time is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on dairy cattle.

**INDICATIONS**

**1. CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.

**2. DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**

1. For topical application only: do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store collapsible pack in carton to protect from light.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.  
5180 South Service Road, Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.



LOT:

EXP:



Argentina Number

Net Contents: 5 L



Pharmacode area

2022-2516-02



Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers  
 (eprinomectin)  
**Eprinex**  
 Pour-On for Beef and Dairy Cattle

DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

# Eprinex<sup>®</sup>

(eprinomectin)

**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.



**INGRÉDIENT ACTIF** : chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Note à l'utilisateur**

- (1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.
- (2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins laitiers.



**Contenu net : 5 L**

LOT: Variable Data (lot/exp date)  
EXP: Print Area

**INDICATIONS**

**1. CATTLE** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms (including inhibited *Ostertagia ostertagi*), lungworms, cattle grubs, and infestations due to sucking and biting lice, chorioptic and sarcoptic mange mites and horn flies in beef and dairy cattle. See package insert for complete list of parasites.

**2. DEER** — For the treatment of parasitic infections due to gastrointestinal roundworms and lungworms in deer. See package insert for complete list of parasites.

**Note to user**

Consult your veterinarian for the diagnosis, treatment and control of parasitism in cattle and deer. For best results, EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On should be used in a planned program to control both internal and external parasites.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION**

EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On is formulated for external application to beef cattle, dairy cattle and deer. This product should be applied topically, along the backline, in a narrow strip extending from the withers to the tailhead. The recommended dose is 1 mL of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On for each 10 kg of body weight (this provides the recommended dose of 500 µg of eprinomectin per kg of body weight). See package insert for complete use directions.

**CAUTIONS**

1. For topical application only; do not administer orally or by injection.
2. Do not apply to areas of the backline covered with mud or manure.
3. To prevent potential secondary reactions when treating infections with cattle grubs, consult your veterinarian on the correct timing of treatment.
4. No data are available on the effect of this product on the breeding performance of male and female deer.

**STORAGE**

Store collapsible pack in carton to protect from light.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.

2030-2514-02

DIN 02237228

VETERINARY USE ONLY

# Eprinex<sup>®</sup>

(eprinomectin)

**Pour-On for Beef and Dairy Cattle**

Residue Information: Zero Slaughter Withdrawal, Zero Milk Discard



**ACTIVE INGREDIENT:** Each mL contains 5 mg of eprinomectin.

**WARNINGS**

1. Keep out of reach of children.
2. This product may be irritating to human skin and eyes. If accidental skin contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. If accidental eye exposure occurs, flush eyes immediately with water.

**Notes to user**

- (1) When used according to label directions, **no meat withdrawal time** is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on beef cattle, dairy cattle and deer.
- (2) When used according to label directions, **no milk withholding time** is required following the use of EPRINEX<sup>®</sup> Pour-On on dairy cattle.



**Net Contents: 5 L**

**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poumon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeurs, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDES** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poumon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservez à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le foin sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conserver l'ensemble compressible dans son emballage de carton pour le protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.



DIN 02237228

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

**Eprinex**<sup>®</sup>  
(eprinomectin)



**Solution à verser pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers**

**Renseignements concernant les résidus : aucune période d'attente avant l'abattage, aucune période de retrait du lait.**

**INGRÉDIENT ACTIF :** chaque mL contient 5 mg d'eprinomectin.

**MISES EN GARDE**

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit peut irriter la peau et les yeux chez l'humain. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

**Notes à l'utilisateur**

(1) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation de la viande n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés.

(2) Lorsque le produit est utilisé conformément aux directives du fabricant, aucune période d'attente pour l'utilisation du lait n'est requise à la suite de l'administration de la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> chez les bovins laitiers.

**INDICATIONS**

**1. BOVINS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux (y compris les larves inhibées d'*Ostertagia ostertagi*), le ver du poumon et les hypodermes des bovins et pour le traitement des infestations par les poux suceurs et les poux broyeur, les mites de la gale chorioptique et sarcoptique et les mouches des cornes chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**2. CERVIDÉS** — Pour le traitement des parasitoses causées par les nématodes gastro-intestinaux et le ver du poumon chez les cervidés. Voir la liste complète des parasites dans la notice de conditionnement.

**Note à l'utilisateur**

Consulter un vétérinaire pour le diagnostic, le traitement et la maîtrise des parasitoses chez les bovins et les cervidés. Pour obtenir des résultats optimaux, la solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> doit être utilisée dans le cadre d'un programme visant à maîtriser à la fois les parasites internes et les parasites externes.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

La solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> est conçue pour une application externe chez les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les cervidés. Ce produit doit être administré par voie topique en une bande étroite le long de la ligne dorsale, des garrots à la base de la queue. La dose recommandée est de 1 mL de solution à verser EPRINEX<sup>®</sup> aux 10 kg de poids vif (ce qui correspond à la dose recommandée de 500 µg d'eprinomectin au kg de poids vif). Voir les directives d'utilisation complètes dans la notice de conditionnement.

**PRÉCAUTIONS**

1. Réservée à une application topique : ne pas administrer par voie orale ou parentérale.
2. Enlever la boue ou le fumier sur la ligne dorsale avant d'appliquer le produit.
3. Pour éviter les réactions défavorables potentielles lorsque le produit est utilisé dans un traitement contre les infestations par les hypodermes des bovins, consulter un vétérinaire pour connaître le moment approprié pour l'administration du traitement.
4. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'effet de ce produit sur la capacité reproductrice des cervidés, mâles et femelles.

**ENTREPOSAGE**

Conservé l'ensemble compressible dans son emballage de carton pour le protéger de la lumière.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.  
5180 South Service Road  
Burlington ON L7L 5H4

EPRINEX<sup>®</sup> est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

2022-2515-02

Contenu net : 5 L

 **Boehringer  
Ingelheim**

