

Veterinary Use Only

Usage vétérinaire seulement

[®] **Marquis**

15% w/w
Ponazuril
Antiprotozoal
Oral Paste
for Horses

Pâte orale
antiprotozoaire
de ponazuril
à 15 % p/p
pour chevaux

Lot
Exp.
B 1R6



86830213
2020-8695-01

WARNINGS: Not for use in horses intended for food. Keep this product, as well as any drug, out of the reach of children.

STORAGE: Store at controlled room temperature of 15-30° C. See package insert for complete information.

Each gram of paste contains 150 mg of ponazuril (15% w/w)

127 g



DIN 02250128

MISES EN GARDE : Ne pas utiliser chez les chevaux destinés à la consommation. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE : Entreposer à une température ambiante contrôlée de 15 à 30 °C. Consulter la notice pour obtenir tous les renseignements.

Chaque gramme de pâte renferme 150 mg de ponazuril (15 % p/p)

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc./
Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.
5180 South Service Road, Burlington ON L7L 5H4



DATE SUBMITTED: August 19, 2020 (Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.)

Marquis®
 15% w/w Ponazuril Antiprotozoal
 Oral Paste for Horses
 Pâte orale antiprotozoaire de ponazuril
 à 15 % p/p pour chevaux
 4 127 g Syringe Applicators + 4 Plungers
 Seringues de 127 g et 4 pistons

Assembling

Paste syringe assembly:
 Before administration, the syringe barrel and plunger require assembly. Ensure plunger is clean and dry.

- 1 End cap must be on syringe barrel when inserting plunger.
- 2 Carefully insert reusable plunger into base of syringe barrel until it snaps into place, then remove end cap and gently apply pressure to the plunger until paste is seen at the tip of the syringe barrel.
- 3 Return end cap to tip of paste syringe.

Administering Marquis® (ponazuril) to the horse

Note: The paste syringe is a multi-dose package. Ensure that the correct dose is administered with each use.

- 1 Remove end cap and gently apply pressure to the plunger until paste is seen at the tip of the syringe barrel. Return end cap to tip of paste syringe.
- 2 Determine weight of horse and ensure the horse's mouth contains no feed.
- 3 To measure dose, dosage ring collar and barrel collar should be flush. Hold plunger and rotate dosage ring with the other hand to the weight of the horse.
- 4 Remove end cap from tip of syringe barrel.
- 5 The selected dose of paste should be deposited onto the back and top of the horse's tongue. Introduce tip of paste syringe into the side of the horse's mouth at the space between the front (incisor) and back (molar) teeth. Deposit paste on the horse's tongue by depressing the plunger of the syringe as far as the dosage ring permits. Remove tip of syringe from horse's mouth.
- 6 To aid swallowing of paste, immediately raise horse's head for a few seconds after dosing.
- 7 Clean the tip of the syringe with a clean disposable towel and return end cap to the tip of the syringe barrel.
- 8 For the next daily dose, repeat steps 1-7.

Assembling • Assemblage



Administering • Administration



Assemblage

Préparation de la seringue :
 Avant d'administrer la pâte, on doit assembler un piston et un corps de seringue. Le piston doit être propre et sec.

- 1 Lorsqu'on insère le piston dans la seringue, l'embout doit être en place.
- 2 Insérer soigneusement le piston réutilisable dans la seringue jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirer l'embout de la seringue et appuyer doucement sur le piston jusqu'à ce que la pâte soit visible dans l'orifice.
- 3 Remettre l'embout en place.

Administration de Marquis® (ponazuril) au cheval

Remarque : La seringue contient plus d'une dose. Prendre soin d'administrer chaque fois la dose exacte.

- 1 Retirer l'embout de la seringue et appuyer doucement sur le piston jusqu'à ce que la pâte soit visible dans l'orifice. Remettre l'embout en place.
- 2 Déterminer le poids du cheval et s'assurer que le cheval n'a pas de nourriture dans la bouche.
- 3 Pour mesurer la dose, il faut que l'anneau doseur et l'anneau du corps de la seringue se touchent. Tenir le piston d'une main et faire pivoter l'anneau doseur de l'autre, jusqu'au poids du cheval.
- 4 Retirer l'embout de la seringue.
- 5 La dose sélectionnée de pâte doit être déposée sur la partie arrière de la langue du cheval. Introduire la seringue dans la bouche du cheval, dans l'espace entre les dents d'en avant (les incisives) et les dents d'en arrière (les molaires). Déposer la pâte sur la base de la langue en appuyant à fond sur le piston. Retirer la seringue de la bouche du cheval.
- 6 Pour aider le cheval à avaler la pâte, lui relever immédiatement la tête pendant quelques secondes.
- 7 Nettoyer le bout de la seringue avec une serviette jetable propre et remettre l'embout en place.
- 8 Pour l'administration suivante, répéter les étapes 1 à 7.

Indication

Marquis® (ponazuril) est indiqué pour aider à réduire la gravité clinique de la myéloencéphalite équine à protozoaire (MEP) causée par *Sarcocystis neurona*. On prévoit qu'environ deux chevaux sur trois répondront favorablement au traitement.

Description

La pâte orale antiprotozoaire Marquis® (ponazuril 15 % p/p) est présentée dans des seringues prêtes à l'emploi contenant chacune 127 g de pâte. Chaque gramme de pâte renferme 150 mg de ponazuril (15 % p/p). Marquis® (ponazuril) doit être administré par voie orale.

Chaque seringue contient suffisamment de pâte pour traiter un cheval de 545 kg (1200 lb) pendant sept jours, la pâte étant administrée à raison de 5 mg/kg de poids vif. Le piston porte des graduations permettant d'administrer 5 mg/kg de poids vif à des chevaux pesant entre 273 kg (600 lb) et 545 kg (1200 lb), par paliers de 91 kg (200 lb). Une boîte contient 4 corps de seringue et 4 pistons. La boîte de quatre unités suffit à traiter un cheval de 545 kg (1200 lb) pendant 28 jours si la pâte est administrée à raison de 5 mg/kg.

Le ponazuril est un anticoccidien efficace contre plusieurs protozoaires appartenant au phylum Apicomplexa (sporozoaires).

Posologie

La pâte antiprotozoaire Marquis® (ponazuril) doit être administrée par voie orale, à raison de 5 mg/kg de poids vif par jour pendant 28 jours consécutifs.

Consulter la notice pour obtenir le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE

Enteposer à une température ambiante contrôlée de 15 à 30 °C.



Boehringer Ingelheim
 Santé Animale Canada Inc.
 5150 South Service Road
 Burlington ON L7L 5H4

Marquis® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

Lot

Exp.

86830221
 2030-8696-02

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

DIN 02250128

Marquis®

15% w/w Ponazuril
 Antiprotozoal
 Oral Paste for Horses
 Pâte orale antiprotozoaire
 de ponazuril à 15 % p/p
 pour chevaux



WARNINGS: Not for use in horses intended for food. Keep this product, as well as any drug, out of the reach of children.

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les chevaux destinés à la consommation. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

4 127 g Syringe Applicators + 4 Plungers
 Seringues de 127 g et 4 pistons



3 50604 73151 1



Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
 5150 South Service Road
 Burlington ON L7L 5H4
 Marquis® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, used under license.

Indication

Marquis® (ponazuril) is indicated as an aid in reducing the clinical severity of Equine Protozoal Myeloencephalitis (EPM) caused by *Sarcocystis neurona* in horses; it is expected that approximately two horses out of three will respond favourably to treatment.

Description

Marquis® (15% w/w ponazuril) Antiprotozoal Oral Paste is supplied in ready-to-use syringes containing 127 g of paste. Each gram of paste contains 150 mg of ponazuril (15% w/w). Marquis® (ponazuril) is designed to be delivered as an orally administered paste.

Each syringe barrel of Marquis® (ponazuril) contains enough paste to treat one 545 kg (1200 lb) horse for seven days, at a dose rate of 5 mg of ponazuril per kg. The plunger contains a dosage ring calibrated for a dose rate of 5 mg/kg body weight and marked for horse weight from 273 kg (600 lb) to 545 kg (1200 lb) at 91 kg (200 lb) increments. The syringe barrels are packaged in units of 4 with 4 plungers. This package provides sufficient paste to treat one 545 kg (1200 lb) horse for 28 days at a dose rate of 5 mg/kg body weight.

Ponazuril is an anticoccidial (antiprotozoal) compound with activity against several genera of the phylum Apicomplexa.

Dosage

Marquis® (ponazuril) Antiprotozoal Paste is to be used at a dose of 5 mg/kg body weight once daily for a period of 28 consecutive days.

Consult package insert for complete use directions.

Storage

Store at controlled room temperature of 15 - 30°C.

