



DIN 00783390

Code 439190

**Active Ingredients:** Each 2.8 g (1 tsp.) of Pancrelipase USP 100% w/w contains: Lipase (67,200 USP Units), Protease (280,000 USP Units), and Amylase (280,000 USP Units). Each 2.8 g (1 tsp.) of Pancrelipase USP 100% w/w digests (*in vitro*): 236 g Fat, 280 g Protein, and 280 g Starch.

**Indications:** For enzyme replacement therapy in conditions due to exocrine pancreatic insufficiency in cats and dogs.

**Dosage and administration:** Administer orally. Mix Pank-Aid with pet's food 20 minutes before feeding.



Dosage is dependent upon degree of pancreatic insufficiency. Consult your veterinarian for frequency of meals and adjustment of dosage.

**Cautions:** Discontinue use if clinical signs of sensitivity occur.

**Storage:** Store between 15°C and 25°C, in a tightly closed container and in a dry place.



**Nouvelle  
Source**  
**New  
Source**

**0,625" X 0,625"**

# Pank-Aid

## PANCRELIPASE USP ▶◀ PANCRÉLIPASE USP

Veterinary  
Use Only

Usage vétérinaire  
seulement



**WARNINGS:** Avoid inhaling the product. Exercise caution during handling & measuring of product if you have a known allergy to proteins of porcine origin. Keep out of reach of children.



**MISES EN GARDE:** Éviter d'inhaler ce produit. Faire preuve de prudence en manipulant et en mesurant ce produit si vous avez une allergie connue aux protéines d'origine porcine. Garder hors de la portée des enfants.



**Ingédients actifs:** Chaque portion de 2,8 g (1 c. à thé) de pancrélipase USP 100% p/p contient: lipase (67 200 unités USP), protéase (280 000 unités USP) et amylase (280 000 unités USP). Chaque portion de 2,8 g (1 c. à thé) de pancrélipase USP 100% p/p digère (*in vitro*): 236 g de gras, 280 g de protéines et 280 g d'amidon.

**Indications:** Thérapie de remplacement d'enzymes dans les états pathologiques attribuables à l'insuffisance pancréatique exocrine chez les chats et les chiens.

**Posologie et mode d'administration:** Administration orale. Mélanger Pank-Aid à la nourriture de l'animal 20 minutes avant de le nourrir.



La posologie dépend du degré d'insuffisance pancréatique. Consulter votre vétérinaire concernant la fréquence des repas et tout ajustement de posologie.

**Précautions:** Cesser d'utiliser si des signes cliniques de sensibilité apparaissent.

**Entreposage:** Entreposer entre 15°C et 25°C, dans un contenant hermétique et un endroit sec.

Vetoquinol N.-A. Inc.  
2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5

100431B

**COMMUNIDÉE**

DATE  
5 NOVEMBRE 2016

# PROJET  
20130

ÉPREUVE  
1

FORMAT  
8,875" X 1,875"

COULEURS : CMYK  
DIELINE

**CLIENT :**  
**VETOQUINOL N.-A. INC.**  
2000, CHEMIN GEORGES,  
LAVALTRIE (QUÉBEC) J5T 3S5  
TÉLÉPHONE : 450 586-2252

La zone réservée pour Lot et Exp. est de 0.625"