

1 **Experior 50™**
2 **10 kg Bag Label**

3 **Front Panel**

4 Elanco™

AFXXXX

5 **Experior 50™**
6 **Lubabegron Premix (as Lubabegron Fumarate)**

Net Weight: 10 kg
DIN XXXXXXXX

7
8
9 FOR VETERINARY USE ONLY
10 FOR USE IN FEEDS FOR CATTLE FED IN CONFINEMENT FOR SLAUGHTER ONLY

11
12 **ACTIVE INGREDIENT:**

13 Lubabegron (as Lubabegron Fumarate).....50.0 g per kg
14

15 **INDICATIONS:**

16 For reduction of ammonia gas emissions per kilogram of live weight and hot carcass
17 weight in beef steers and heifers fed in confinement for slaughter during the last 14 to
18 91 days on feed.

19
20 Effectiveness has not been demonstrated when fed for less than 14 days.

21
22 Ammonia gas emissions were measured for individual animals or small groups of
23 animals held in environmentally controlled facilities. Based on existing information,
24 reliable predictions of the reduction of ammonia gas emissions cannot be made on a
25 herd, farm, or larger scale.

26
27 Increased rate of weight gain, improved feed efficiency, and increased carcass
28 leanness have not been demonstrated with this product.

29
30 **Note:**

31 Lubabegron may contribute to decreased marbling scores when fed for the maximum
32 duration of 91 days.

33
34 **DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

35 Administer at a dietary concentration of 1.5 to 5.5 grams of lubabegron per tonne of
36 feed (1.5 to 5.5 ppm), on a 100% dry matter basis.

37
38 **IMPORTANT:**

- 39 1. For use in manufactured feeds only.
40 2. Must be thoroughly mixed in feeds before use.
41 3. Do not feed undiluted.
42 4. Do not feed as top dressing.

43
44 **MIXING DIRECTIONS:**

45 Thoroughly mix 30 g to 110 g of Experior 50 premix per tonne (1,000 kg) of complete
46 feed (100% dry matter basis) to obtain a concentration of 1.5 to 5.5 g/tonne (1.5 to 5.5

47 ppm) of lubabegron in the feed. To ensure adequate mixing, an intermediate blending
48 step should be performed prior to manufacturing a complete feed.
49

50 **FEEDING DIRECTIONS:**

51 Feed continuously to beef steers and heifers fed in confinement for slaughter as the
52 sole ration during the last 14 to 91 days prior to slaughter.
53

54 **WARNINGS:**

- 55 1. No withdrawal period is required in beef cattle when treated according to the label.
- 56 2. Do not use in calves to be processed for veal.
- 57 3. Do not use in lactating dairy cattle.
- 58 4. The active ingredient in Experior 50, lubabegron, is a selective beta-adrenergic
59 modulator (agonist and antagonist). Individuals with cardiovascular disease should
60 exercise special caution to avoid exposure.
- 61 5. Experior 50 poses a low dust potential under usual conditions of handling and
62 mixing. When mixing and handling Experior 50, avoid inhalation, oral exposure and
63 direct contact with eyes or skin. Use protective clothing, impervious gloves and an
64 approved dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after
65 handling.
- 66 6. If accidental eye or skin contact occurs, immediately rinse thoroughly with water; if
67 wearing contact lenses, rinse eyes first, then remove contact lenses and continue to
68 rinse for 5-20 minutes. If irritation persists, seek medical attention.
- 69 7. Not for use in humans.
- 70 8. Keep out of reach of children.

71
72 **CAUTIONS:**

- 73 1. Do not use in animals intended for breeding because safety and effectiveness have
74 not been evaluated in these animals.
- 75 2. Do not use concurrently with beta-adrenergic agonists such as ractopamine and
76 zilpaterol.
- 77 3. Do not allow horses or other equines access to feed containing Experior 50.
- 78 4. A decrease in dry matter intake may be noticed in some animals.

79
80 **ADVERSE REACTIONS:**

81 To report suspected adverse drug events or for technical assistance, contact Elanco at
82 1-800-265-5475.
83

84 **STORAGE:**

85 Store at or below 25°C. Excursions permitted to 30°C.
86

87 Experior, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

88 ©2020 Elanco or its affiliates
89

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2

<TAKE TIME OBSERVE LABEL
DIRECTIONS SYMBOL>

90 LOT:

91 EXP:

92 **Back Panel**

93 Elanco™

AFXXXX

94 **Experior™ 50**

95 **Prémélange de lubabégron (sous forme de fumarate de lubabégron)**

96 Poids net : 10 kg

97 DIN XXXXXXXXX

98 POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

99 POUR USAGE SEULEMENT DANS LES ALIMENTS DES BOVINS DE BOUCHERIE

100 ÉLEVÉS EN PARC D'ENGRAISSEMENT ET DESTINÉS À L'ABATTAGE

101

102 **INGRÉDIENT ACTIF**

103 Lubabégron (sous forme de fumarate de lubabégron).....50.0 g par kg

104

105 **INDICATIONS :**

106 Pour réduire les émissions de gaz d'ammoniac par kilogramme de poids vif et de poids

107 de carcasse chaude chez les génisses et les bouvillons de boucherie élevés en parc

108 d'engraissement durant les 14 à 91 derniers jours avant l'abattage.

109

110 L'efficacité du produit administré pendant moins de 14 jours n'a pas été démontrée.

111

112 Les émissions de gaz d'ammoniac ont été mesurées chez certains animaux ou petits

113 groupes d'animaux dans des établissements à environnement contrôlé. D'après les

114 données actuelles, il n'est pas possible de prédire de manière fiable la réduction des

115 émissions de gaz d'ammoniac à l'échelle du troupeau ou de la ferme ou à plus grande

116 échelle.

117

118 Il n'a pas été démontré que ce produit augmente le gain de poids, la conversion

119 alimentaire et la teneur en viande maigre de la carcasse.

120

121 **Remarque :**

122 Le lubabégron peut contribuer à une diminution du taux de persillage lorsqu'il est

123 administré pendant la durée maximale de 91 jours.

124

125 **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

126 Administrer de manière à obtenir une concentration dans la ration de 1,5 à 5,5 g de

127 lubabégron par tonne d'aliments (de 1,5 à 5,5 ppm), sur une base de 100 % de matière

128 sèche.

129

130 **IMPORTANT :**

131 1. Pour ajout aux rations commerciales seulement.

132 2. Doit être mélangé soigneusement à la ration.

133 3. Ne pas administrer tel quel, non mélangé aux aliments.

134 4. Ne pas saupoudrer sur les aliments.

135

136 **PRÉPARATION :**

137 Mélanger soigneusement de 30 à 110 g de prémélange Experior 50 par tonne (1000 kg)

138 d'aliments complets (base de 100 % de matière sèche) pour obtenir une concentration

139 de 1,5 à 5,5 g de lubabégron par tonne d'aliments (de 1,5 à 5,5 ppm). Pour assurer un
140 mélange adéquat, une étape intermédiaire de mélange doit être effectuée avant la
141 préparation des aliments complets.

142

143 **ADMINISTRATION :**

144 Donner sans interruption la ration contenant le produit comme seul aliment aux
145 génisses et aux bouvillons de boucherie élevés en parc d'engraissement durant les 14
146 à 91 derniers jours précédant l'abattage.

147

148 **MISES EN GARDE :**

- 149 1. Aucune période de retrait n'est nécessaire chez les bovins de boucherie traités
150 conformément aux directives de l'étiquette.
- 151 2. Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau.
- 152 3. Ne pas utiliser chez les vaches laitières en lactation.
- 153 4. L'ingrédient actif d'Experior 50, le lubabégron, est un modulateur sélectif
154 bêta-adrénergique (agoniste/antagoniste). Les personnes ayant une maladie
155 cardiovasculaire doivent prendre des précautions particulières pour éviter d'être
156 exposées au produit.
- 157 5. Experior 50 risque peu de produire de la poussière dans les conditions usuelles de
158 manipulation et de mélange. Lors de la manipulation et du mélange d'Experior 50,
159 éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec les yeux ou la peau.
160 Porter des vêtements protecteurs, des gants imperméables et un masque
161 antipoussière approuvé. Il convient de bien se laver les mains avec de l'eau et du
162 savon après avoir manipulé le produit.
- 163 6. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à
164 grande eau. En cas de port de lentilles cornéennes, rincer d'abord les yeux, enlever
165 ensuite les lentilles cornéennes, et continuer de rincer les yeux pendant de 5 à
166 20 minutes additionnelles. Si une irritation persiste, consulter un médecin.
- 167 7. Ne pas utiliser chez l'humain.
- 168 8. Garder hors de la portée des enfants.

169

170 **PRÉCAUTIONS :**

- 171 1. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction, car l'innocuité et
172 l'efficacité du produit n'ont pas été évaluées chez ces animaux.
- 173 2. Ne pas utiliser en concomitance avec des agonistes bêta-adrénergiques tels que la
174 ractopamine et le zilpatérol.
- 175 3. Ne pas laisser les chevaux ou les autres équidés avoir accès à des aliments
176 contenant Experior 50.
- 177 4. Une diminution de la consommation volontaire de matière sèche peut être observée
178 chez certains animaux.

179

180 **RÉACTIONS INDÉSIRABLES :**

181 Pour signaler tout effet indésirable soupçonné du produit ou pour obtenir un soutien
182 technique, appeler Elanco au 1-800-265-5475.

183

184 **ENTREPOSAGE :**

185 Entreposer à une température de 25 °C ou moins. Des écarts jusqu'à 30 °C sont
186 permis.

187
188 Experior, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou de
189 ses sociétés affiliées.

190 ©2020 Elanco ou de ses sociétés affiliées.

191

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2

< PRENEZ LE TEMPS
LISEZ L'ÉTIQUETTE >

192