

## **MONOGRAPHIE DE PRODUIT**

**PrGLYCON<sup>MD</sup>**  
Comprimés de chlorhydrate de metformine, BP  
500 mg et 850 mg

**Antihyperglycémiant oral**

**Bausch Health, Canada Inc.**  
2150 St-Elzear Blvd. Ouest  
Laval, Québec  
H7L 4A8

**Date de révision:**  
12 février 2021

Numéro de contrôle #: 248248

## Table des matières

<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ</b>	<b>3</b>
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT .....	3
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE .....	3
CONTRE-INDICATIONS .....	4
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS .....	5
EFFETS INDÉSIRABLES .....	13
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....	15
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION .....	18
SURDOSAGE.....	20
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE .....	20
STABILITÉ ET CONSERVATION .....	21
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	22
<b>PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES.....</b>	<b>23</b>
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES .....	23
ESSAIS CLINIQUES .....	24
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE .....	25
TOXICOLOGIE .....	27
RÉFÉRENCES .....	30
<b>PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LA MÉDICATION DU PATIENT.....</b>	<b>34</b>

## MONOGRAPHIE DE PRODUIT

Pr **GLYCON<sup>MD</sup>**

Comprimés de chlorhydrate de metformine, BP  
500 mg et 850 mg

### PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

#### RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie d'administration	Forme posologique et teneur	Tous les ingrédients non médicinaux
Orale	Comprimés / 500 mg et 850 mg	Croscarmellose sodique, NF, stéarate de magnésium, cellulose, microcristalline, NF, povidone, USP

#### INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE

L'emploi de GLYCON (chlorhydrate de metformine) est indiqué pour la control glycémique chez les patients adultes souffrant de diabète sucré de type 2 sensible au chlorhydrate de metformine, stable, léger et non susceptible d'entraîner une cétose, en complément avec un régime alimentaire approprié, l'exercice et une perte pondérale, ou lorsqu'on ne peut avoir recours à l'insulinothérapie.

GLYCON peut être utilisé en monothérapie ou en combinaison avec d'autres agents antidiabétiques.

##### **Enfants (< 18 ans)**

L'innocuité et l'efficacité de chlorhydrate de metformine n'ont pas été étudiées chez les patients âgés de moins de 18 ans. GLYCON ne doit pas être utilisé chez les enfants (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

##### **Personnes âgées (> 65 ans)**

Les études cliniques contrôlées portant sur l'emploi de chlorhydrate de metformine n'ont pas inclus un nombre suffisant de patients âgés pour que l'on puisse vérifier si la réponse thérapeutique chez ce type de patient diffère de celle qui est observée chez les patients plus jeunes. Chlorhydrate de metformine est essentiellement excrété par le rein, et parce que le risque de réactions indésirables graves au médicament est plus élevé chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, GLYCON doit uniquement être utilisé chez les patients présentant une fonction rénale normale (*voir* CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction rénale). Parce que le vieillissement est associé à une altération de la fonction rénale, GLYCON doit être utilisé avec précaution chez les patients âgés. Un traitement

par GLYCON ne doit pas être administré chez les patients de plus de 80 ans, à moins que la mesure de clairance de créatinine n'indique pas d'altération de la fonction rénale (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Acidose lactique, Populations particulières, Personnes âgées et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

## CONTRE-INDICATIONS

- Diabète sucré instable ou insulino-dépendant (type 1);
- Acidose métabolique aiguë ou chronique, notamment acidocétose diabétique compliquée ou non de coma (les cas d'acidocétose diabétique doivent être traités par administration d'insuline);
- Antécédents d'acidose lactique, peu importe les facteurs déclenchants;
- Altération de la fonction rénale ou méconnaissance de l'état de la fonction rénale, et créatininémie dépassant la limite supérieure de l'écart normal; néphropathie ou dysfonction rénale (évoquée par une créatininémie égale ou supérieure à 136 µmol/L chez l'homme ou à 124 µmol/L chez la femme, ou encore par une anomalie de la clairance de la créatinine [ $<60$  mL/min]), pouvant être due à diverses affections, notamment le collapsus cardiovasculaire (choc), l'infarctus aigu du myocarde ou la septicémie (*voir* la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS);
- Consommation abusive d'alcool aiguë ou chronique;
- Dysfonction hépatique grave (cet état ayant été lié à certains cas d'acidose lactique, on devrait généralement éviter d'administrer GLYCON en présence de signes cliniques d'hépatopathie ou de résultats d'analyses de laboratoire témoignant d'une telle affection);
- Administration intravasculaire de produits de contraste iodés (il faut interrompre temporairement l'emploi de GLYCON chez le patient qui fait l'objet d'exams radiologiques comportant l'administration intravasculaire de produits de contraste iodés, car l'emploi de telles substances peut entraîner une altération aiguë de la fonction rénale) (*voir* la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS);
- Collapsus cardiovasculaire et états pathologiques compliqués d'hypoxémie tels que l'insuffisance cardiorespiratoire, qui sont souvent liés à une hyperlactacidémie;
- Présence de facteurs de stress tels qu'une infection grave, une blessure ou une intervention chirurgicale ainsi que pendant la phase de récupération postopératoire;
- Déshydratation grave ou choc;
- Hypersensibilité ou allergie connue au chlorhydrate de metformine ou aux ingrédients qui entrent dans la composition du chlorhydrate de metformine (*voir* la section FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT pour connaître la liste complète des ingrédients);
- Grossesse et allaitement.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### **Mises en garde et précautions importantes**

- L'acidose lactique est une complication métabolique rare, mais grave, qui survient à la suite de l'accumulation de metformine pendant l'emploi du chlorhydrate de metformine (*voir* la section Système endocrinien/métabolisme, Acidose lactique ci-après).
- Il faut conseiller au patient qui reçoit GLYCON d'éviter toute consommation excessive d'alcool aiguë ou chronique, car la prise d'alcool entraîne la potentialisation des effets de la metformine sur le métabolisme du lactate (*voir* la section Système endocrinien/métabolisme, Acidose lactique ci-après).

### **Conduire un véhicule ou de faire fonctionner de la machinerie**

Dans les conditions où un risque d'hypoglycémie est présent, on doit aviser les patients d'éviter de conduire un véhicule ou de faire fonctionner de la machinerie (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hypoglycémie).

### **Généralités**

#### **Sélection et suivi des patients**

Il importe de bien choisir les patients à qui on administre GLYCON (chlorhydrate de metformine). Il est également primordial d'accorder une attention stricte au régime alimentaire et d'établir la posologie du médicament avec soin. La réalisation d'examens de suivi réguliers s'impose pendant toute la durée du traitement.

En présence de vomissements, il faut suspendre le traitement, éliminer la possibilité d'acidose lactique et reprendre le traitement avec prudence (*voir* la section EFFETS INDÉSIRABLES).

Il importe d'accorder une attention particulière aux complications précoces et tardives du diabète (*voir* « Surveillance et épreuves de laboratoire »).

GLYCON doit être employé en concomitance avec un régime alimentaire approprié, et non à la place d'un tel régime.

Il faut cesser d'administrer GLYCON en présence d'une affection intercurrente aiguë, par exemple, une dysfonction hépatique cliniquement significative, un collapsus cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque congestive, un infarctus aigu du myocarde ou toute autre affection compliquée d'hypoxémie.

#### **Modification de l'état clinique du patient dont le diabète était auparavant équilibré**

En présence d'anomalies des paramètres biologiques ou d'affection clinique (surtout si la maladie est vague et mal définie) touchant un patient atteint de diabète auparavant bien équilibré grâce à la prise de GLYCON, il faut chercher sans délai les signes d'une acidocétose ou d'une acidose lactique. L'évaluation du cas devrait comprendre le dosage des électrolytes, des cétones, de la

glycémie et, s'il y a lieu, la détermination du pH sanguin ainsi que le dosage sanguin du lactate, du pyruvate et de la metformine. En présence de tout type d'acidose, il faut interrompre l'administration de GLYCON immédiatement et les mesures de soutien appropriées doivent être appliquées.

### **États hypoxiques**

Le collapsus cardiovasculaire (choc) de toutes causes, l'insuffisance cardiaque congestive aiguë, l'infarctus aigu du myocarde et d'autres affections caractérisées par l'hypoxémie ont été liés à l'acidose lactique et peuvent entraîner une urémie extra-rénale. En présence de tels états, il faut abandonner immédiatement l'administration de GLYCON.

## **Système endocrinien/métabolisme**

### **Hypoglycémie**

Le risque d'hypoglycémie est nul chez le patient qui prend seulement du chlorhydrate de metformine dans des circonstances normales, mais l'hypoglycémie peut survenir si l'apport énergétique est insuffisant, si le patient se livre à des exercices épuisants sans s'assurer d'un apport calorique supplémentaire ou s'il prend simultanément un autre agent antidiabétique ou de l'alcool. Le patient âgé, affaibli ou malnutri, ainsi que celui qui est atteint d'insuffisance surrénalienne, ou hypophysaire, ou d'insuffisance hépatique ou qui présente une intoxication alcoolique, est particulièrement vulnérable aux effets des hypoglycémifiants. Il peut être difficile de dépister les cas d'hypoglycémie chez la personne âgée et chez celle qui prend des bêtabloquants.

### **Hypothyroïdie**

La metformine entraîne une diminution du taux de thyroïdostimuline (la TSH qui maîtrise l'activité de la thyroïde) chez les patients souffrant d'hypothyroïdie traitée ou non traitée (*voir* EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit). La surveillance régulière des taux de TSH est nécessaire chez les patients atteints d'hypothyroïdie (*voir* Surveillance et épreuves de laboratoire).

Les résultats des études ont révélé que la metformine diminue les taux plasmatiques de TSH, souvent à des taux sous la normale lorsqu'elle est administrée à des patients atteints d'hypothyroïdie non traitée ou des patients atteints d'hypothyroïdie traitée efficacement avec la lévothyroxine. La diminution des taux plasmatiques de TSH n'est pas observée lorsque la metformine est administrée aux patients présentant un fonctionnement normal de la thyroïde. Il semble que la metformine favorise la modulation inhibitrice des hormones thyroïdiennes sur la sécrétion de TSH.

La lévothyroxine peut diminuer l'effet hypoglycémique de la metformine. Il est nécessaire de surveiller régulièrement le taux de glycémie chez les patients atteints d'hypothyroïdie et traités par la lévothyroxine, en particulier lorsque l'hormonothérapie thyroïdienne est entreprise, modifiée ou arrêtée (*voir* Surveillance et épreuves de laboratoire, INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Lévothyroxine).

### **Acidose lactique**

L'acidose lactique est une complication métabolique rare, mais grave, qui survient à la suite de l'accumulation de metformine pendant l'emploi du chlorhydrate de metformine. Cette

complication entraîne la mort dans environ 50 % des cas. Elle peut également survenir en présence d'un certain nombre d'affections, dont le diabète sucré, ou de tout état caractérisé par une hypoperfusion et une hypoxémie tissulaires notables. L'acidose lactique se définit par l'élévation de la concentration sanguine de lactate (>5 mMol/L), la diminution du pH sanguin, le déséquilibre électrolytique comportant une augmentation de la valeur du trou anionique et l'élévation du rapport lactate/pyruvate. Quand l'emploi de metformine est mis en cause, la concentration plasmatique de ce médicament se révèle généralement supérieure à 5 mcg/mL.

Chez les patients qui reçoivent du chlorhydrate de metformine, la fréquence déclarée d'acidose lactique est très faible (environ 0,03 cas par 1000 années-patients, et environ 0,015 décès par 1000 années-patients) et touche principalement des patients diabétiques atteints d'insuffisance rénale notable, notamment de néphropathie et d'hypoperfusion rénale organiques, souvent associée à des troubles médicaux ou chirurgicaux multiples et à l'emploi concomitant de plusieurs médicaments. Le risque d'acidose lactique est plus élevé chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive nécessitant un traitement pharmacologique, surtout lorsque l'insuffisance est aiguë ou instable et entraîne un risque d'hypoperfusion ou d'hypoxémie. Chez les patients âgés de ce groupe, il faut surveiller de près la fonction rénale. Il ne faut pas entreprendre un traitement par GLYCON chez les patients de 80 ans et plus, à moins que les valeurs de la clairance de la créatinine ne démontrent que la fonction rénale est normale. Le risque d'acidose lactique augmente avec la gravité de la dysfonction rénale et l'âge du patient. Chez le patient qui reçoit GLYCON, ce risque peut toutefois être considérablement atténué par une surveillance régulière de la fonction rénale et par l'emploi de la dose minimale efficace du médicament. De plus, il faut interrompre sans délai l'administration de GLYCON en présence de toute affection liée à l'hypoxémie, à la déshydratation ou à la sepsie. Comme l'atteinte fonctionnelle hépatique peut se traduire par une diminution notable de la capacité d'éliminer le lactate, il faut en général éviter d'administrer GLYCON en présence de signes cliniques d'hépatopathie ou de résultats d'analyses biologiques évocateurs d'une telle affection. Il faut conseiller au patient qui reçoit GLYCON d'éviter toute consommation excessive d'alcool aiguë ou chronique, car la prise d'alcool entraîne la potentialisation des effets du chlorhydrate de metformine sur le métabolisme du lactate. En outre, il faut renoncer temporairement à employer GLYCON avant tout examen radiologique comportant l'injection intravasculaire de produits de contraste radiomarqués ou toute intervention chirurgicale.

Souvent, l'installation de l'acidose lactique est discrète et s'accompagne seulement de symptômes vagues comme des malaises, de la myalgie, une gêne respiratoire, une augmentation de la somnolence et des troubles abdominaux imprécis. Une acidose plus marquée peut être liée à une hypothermie, à une hypotension artérielle et à des bradyarythmies résistant aux médicaments. Le patient et son médecin devraient être conscients de la gravité éventuelle de tels symptômes, et le patient devrait être averti qu'il doit immédiatement aviser son médecin de la survenue de ces symptômes. Il faut arrêter l'administration de GLYCON jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie. Le dosage des électrolytes, des cétones, de la glycémie et, s'il y a lieu, la détermination du pH sanguin et le dosage du lactate, voire de la metformine sanguine, peuvent être utiles dans ces circonstances. Quelle que soit la dose administrée de GLYCON, il est peu probable que les symptômes gastro-intestinaux, fréquents au début du traitement, soient liés au traitement une fois la glycémie du patient équilibrée. L'apparition tardive de tels symptômes peut être due à une acidose lactique ou à une autre affection grave. Chez les patients qui reçoivent GLYCON, des concentrations plasmatiques de lactate à jeun dépassant la limite supérieure de l'écart normal,

mais inférieures à 5 mMol/L, ne témoignent pas nécessairement d'une acidose lactique imminente et peuvent être imputables à d'autres causes, notamment au mauvais équilibre du diabète, à l'obésité, à une activité physique vigoureuse ou à des problèmes techniques relatifs au dosage du lactate. En l'absence de signes d'acidocétose (cétonurie ou cétonémie), la présence d'une acidose métabolique chez tout patient diabétique doit faire soupçonner celle d'une acidose lactique.

L'acidose lactique constitue une urgence médicale qui exige un traitement en milieu hospitalier. Il faut interrompre l'emploi de GLYCON immédiatement et les mesures de soutien générales doivent être appliquées sans tarder en présence d'une telle acidose. Comme le chlorhydrate de metformine se prête à la dialyse (la vitesse d'élimination atteignant 170 mL/min dans des circonstances hémodynamiques favorables), il est recommandé de recourir sans délai à l'hémodialyse afin de corriger l'acidose et d'éliminer la metformine accumulée.

Le médecin doit apprendre au patient à reconnaître les symptômes pouvant témoigner de l'installation d'une acidose lactique. En présence de tout type d'acidose, il faut interrompre l'administration de GLYCON immédiatement et le patient doit être immédiatement hospitalisé.

### **Perte de l'équilibre glycémique**

Une perte temporaire de l'équilibre glycémique peut survenir à la suite d'une exposition à un facteur de stress tel que la fièvre, une blessure, une infection ou une intervention chirurgicale chez le patient dont le diabète était équilibré grâce à un traitement antidiabétique quelconque. Dans un tel cas, il peut se révéler nécessaire de suspendre la prise de GLYCON pour administrer temporairement de l'insuline. On pourra poursuivre l'emploi de GLYCON une fois l'épisode aigu terminé.

La capacité des antidiabétiques oraux de ramener la glycémie au taux cible diminue chez bien des patients après une certaine période. Ce phénomène, qui peut être attribuable à l'évolution de la maladie sous-jacente ou à une diminution de la sensibilité au médicament, est appelé échec secondaire et diffère de l'échec primaire qui est dû à l'inefficacité du traitement initial.

En cas d'échec secondaire pendant l'emploi de GLYCON, il convient d'envisager une autre option thérapeutique.

### **Taux de vitamine B12**

Des troubles de l'absorption de la vitamine B12 ont été signalés chez certains patients. Par conséquent, le dosage sérique de cette substance est conseillé, au moins tous les 1 ou 2 ans, chez le patient qui reçoit GLYCON pendant une longue période.

Dans le cadre d'essais cliniques comparatifs d'une durée de 28 semaines, on a observé une diminution sous la normale du taux de vitamine B12 sérique auparavant normal chez environ 7 % des participants qui recevaient du chlorhydrate de metformine, sans relever d'autres manifestations cliniques. Une telle diminution, probablement imputable à une altération de l'absorption de cette vitamine par l'intermédiaire du facteur intrinsèque, est cependant très rarement liée à l'anémie et semble céder rapidement à l'arrêt du traitement par le chlorhydrate de metformine ou à la prise de suppléments de vitamine B12. Il est conseillé d'évaluer les paramètres hématologiques tous les ans, ainsi que d'explorer et de traiter toute anomalie apparente chez le patient qui prend du chlorhydrate de metformine (*voir* la section « Surveillance et épreuves de



laboratoire »). Il semble que certaines personnes (dont l'apport en vitamine B12 ou en calcium est insuffisant ou qui absorbent mal une de ces substances) soient prédisposées à la baisse du taux de vitamine B12 sous la normale.

L'administration prolongée du chlorhydrate de metformine a été associée à une diminution de la concentration sérique de vitamine B12, laquelle peut causer une neuropathie périphérique. On a rapporté des cas graves de neuropathie périphérique (*voir* EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit). Il est recommandé de surveiller la concentration sérique de vitamine B12 (*voir* Surveillance et épreuves de laboratoire).

### **Appareil circulatoire**

Des cas graves d'anémie hémolytique induite par la metformine, ayant entraîné la mort dans certains cas, ont été rapportés (*voir* EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit). Deux mécanismes ont été décrits pour l'induction de l'anémie hémolytique auto-immune par la metformine : la formation d'anticorps dirigés contre le complexe érythrocyte-metformine ou la formation d'autoanticorps. Il est conseillé de surveiller les paramètres hématologiques (*voir* Surveillance et épreuves de laboratoire).

### **Fonction hépatique/biliaire/pancréatique**

Comme l'altération de la fonction hépatique a été liée à certains cas d'acidose lactique, on devrait généralement éviter d'administrer GLYCON en présence de signes cliniques d'hépatopathie ou de résultats d'analyses de laboratoire témoignant d'une telle affection.

GLYCON est contre-indiqué chez les patients souffrant de dysfonction hépatique sévère (*voir* CONTRE-INDICATIONS).

Des cas graves de pancréatite ont été signalés chez des patients recevant de la metformine (*voir* RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Effets indésirables du médicament sur le marché). Les cas de pancréatite signalés sont survenus soit dans le contexte d'un surdosage aigu de metformine (*voir* SURDOSAGE), soit chez des patients recevant des doses thérapeutiques de metformine avec insuffisance rénale et / ou acidose lactique concomitantes, indiquant une accumulation de metformine.

### **Neurologique**

Des cas graves d'encéphalopathie induite par la metformine ont été signalés (*voir* RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament sur le marché). Certains de ces cas ont été signalés sans association avec une acidose lactique, une hypoglycémie ou une insuffisance rénale.

### **Considérations périopératoires**

L'emploi de GLYCON doit être temporairement suspendu avant toute intervention chirurgicale (à l'exception des interventions mineures n'exigeant pas de restriction de l'apport liquidien ou alimentaire). Il faut suspendre l'emploi de GLYCON 2 jours avant l'intervention chirurgicale

pour le reprendre seulement après que le patient a recommencé à se nourrir et que le bon fonctionnement de ses reins a été vérifié.

### **Fonction rénale**

Une partie substantielle de la dose de chlorhydrate de metformine administrée étant excrétée par le rein, le risque d'accumulation de la metformine et d'acidose lactique augmente avec la gravité de l'atteinte fonctionnelle rénale. En conséquence, le patient dont la créatininémie dépasse la limite supérieure de l'écart normal pondéré en fonction de l'âge ne devrait pas recevoir GLYCON. Chez le patient âgé, il faut adapter soigneusement la dose administrée afin de déterminer la dose minimale permettant d'obtenir l'équilibre glycémique souhaité, car le vieillissement est associé au ralentissement de la fonction rénale. Il faut surveiller régulièrement la fonction rénale du patient âgé qui reçoit GLYCON et, en général, ne pas pousser l'adaptation posologique jusqu'à administrer la dose maximale (*voir* la section POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

Avant d'entreprendre le traitement par GLYCON, puis tous les 6 mois par la suite, il faut vérifier que la fonction rénale du patient est normale.

Une évaluation plus fréquente de la fonction rénale s'impose si l'on s'attend à l'installation d'une atteinte rénale, et le traitement doit être interrompu en présence de signes d'une telle atteinte.

On doit être particulièrement attentif à l'apparition potentielle d'une insuffisance rénale, par exemple, chez les personnes âgées, en cas de déshydratation, après l'instauration d'un traitement par un antihypertenseur, un diurétique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

### **Emploi concomitant de médicaments pouvant entraîner une altération de la fonction rénale ou de l'élimination de la metformine**

L'emploi concomitant de médicaments tels que les agents cationiques excrétés par l'intermédiaire des tubes urinifères peut entraîner une diminution de la fonction rénale, une altération notable des paramètres hémodynamiques, ou encore nuire à l'élimination de GLYCON (*voir* la section INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES). Il faut donc employer ces agents avec prudence.

### **Examens radiologiques comportant l'emploi de produits de contraste iodés (p. ex., urographie intraveineuse, cholangiographie intraveineuse, angiographie et scintigraphie ou tomодensitométrie)**

L'injection intravasculaire de produits de contraste iodés peut entraîner une insuffisance rénale aiguë et a été liée à l'installation d'une acidose lactique chez des patients qui recevaient de la metformine (*voir* la section CONTRE-INDICATIONS). Par conséquent, il faut suspendre l'administration de GLYCON au moment où avant de réaliser une telle injection et pendant les 48 heures qui suivent, pour ne reprendre le traitement antidiabétique qu'après une nouvelle évaluation de la fonction rénale et la confirmation du bon fonctionnement de l'appareil rénal.

### **Populations particulières**

#### **Femmes enceintes**

L'innocuité du chlorhydrate de metformine n'a pas été établie chez la femme enceinte. Il n'existe

aucune étude adéquate et bien contrôlée de GLYCON chez les femmes enceintes. GLYCON est contre-indiqué chez les femmes enceintes (*voir* CONTRE-INDICATIONS).

Administrée à des doses allant jusqu'à 600 mg/kg/jour (environ 2 fois la dose quotidienne maximale recommandée chez l'humain et calculée à partir de la surface corporelle), la metformine n'a aucun effet tératogène sur les petits de la rate et de la lapine. La détermination des concentrations fœtales de metformine a permis de constater que la barrière placentaire s'oppose partiellement au passage de ce produit. Étant donné que les résultats des études chez les animaux ne permettent pas toujours de prévoir les effets d'un produit chez l'humain, l'emploi de GLYCON est contre-indiqué chez la femme enceinte (*voir* CONTRE-INDICATIONS).

### **Femmes qui allaitent**

Les résultats d'études ayant porté sur l'emploi de la metformine chez la rate en lactation indiquent que ce produit est excrété dans le lait en concentration comparable à la concentration plasmatique de metformine. Le chlorhydrate de metformine est également excrété dans le lait maternel humain en très faibles quantités. GLYCON est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent (*voir* CONTRE-INDICATIONS).

### **Enfants (< 18 ans)**

L'innocuité et l'efficacité de la metformine n'ont pas été établies chez l'enfant. Par conséquent, GLYCON ne doit pas être utilisé dans cette population.

### **Personnes âgées (< 65 ans)**

Les essais cliniques comparatifs ayant porté sur l'emploi du chlorhydrate de metformine ne comprenaient pas assez de participants âgés pour que l'on puisse vérifier si la réponse thérapeutique chez ce type de patient diffère de celle qui est observée chez le patient plus jeune. On sait que le chlorhydrate de metformine est excrété en grande partie par le rein, aussi il ne faut utiliser GLYCON que chez le patient dont la fonction rénale est normale, étant donné que le risque d'effet indésirable grave est plus grand en présence d'atteinte rénale (*voir* les sections CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction rénale). Comme le vieillissement est lié au ralentissement de la fonction rénale, il faut employer GLYCON avec plus de prudence à mesure que le patient vieillit. Il ne faut pas entreprendre un traitement par GLYCON chez les patients de 80 ans et plus, à moins que les valeurs de la clairance de la créatinine ne démontrent aucune altération de la fonction rénale, étant donné que les patients âgés sont plus susceptibles de développer une acidose lactique (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien et métabolisme, acidose lactique). Il importe de déterminer soigneusement la dose administrée en se fondant sur la surveillance régulière et minutieuse de la fonction rénale. GLYCON doit être soigneusement ajusté afin d'adapter soigneusement la dose minimale pour un effet glycémique adéquat. En général, il ne faut pas pousser l'adaptation posologique jusqu'à administrer la dose maximale de GLYCON au patient âgé (*voir* POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Personnes âgées).

### **Surveillance et épreuves de laboratoire**

La réponse à tout traitement antidiabétique devrait faire l'objet d'une surveillance assurée par le dosage périodique de la glycémie à jeun et par la détermination de la concentration en hémoglobine glycosylée, le but visé consistant à ramener les valeurs de ces paramètres à

l'intérieur de l'écart normal. Pendant l'adaptation posologique initiale, on peut se fonder sur la glycémie à jeun pour évaluer la réponse thérapeutique. Par la suite, il faudrait surveiller tant la glycémie que la concentration en hémoglobine glycosylée. Cette dernière mesure peut être particulièrement utile à l'évaluation de l'équilibre du diabète sur une longue période. Le dosage périodique de la glycémie dans le sang et/ou dans l'urine est nécessaire afin de déceler tout échec primaire ou secondaire (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Perte de l'équilibre glycémique).

Une évaluation plus fréquente de la glycémie devrait être envisagée lorsque l'administration de GLUCOPHAGE est concomitante à celle de médicaments cationiques qui sont éliminés par l'intermédiaire des tubes urinifères ou à celle de médicaments qui causent une hyperglycémie ou une hypoglycémie, particulièrement au début du traitement avec le(s) médicament(s) qui peuvent causer une interaction (*voir* INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Agents cationiques et Autres médicaments).

Il est recommandé de procéder régulièrement à des examens cardiovasculaires, ophtalmologiques, hématologiques, hépatiques et rénaux (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

La surveillance initiale et périodique des paramètres sanguins (p. ex., concentration en hémoglobine, en hématocrite et numération des érythrocytes) et de la fonction rénale (créatininémie) devrait être réalisée au moins 1 fois par année. L'anémie mégalo-blastique est rarement liée à l'emploi de GLYCON, mais il faut éliminer la possibilité d'une carence en vitamine B12 si l'on soupçonne la présence d'une telle anémie.

Il est recommandé de procéder régulièrement à des examens cardiovasculaires, ophtalmologiques, hématologiques, hépatiques et rénaux (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

Des troubles de l'absorption de la vitamine B12 ont été rapportés dans quelques cas, et le traitement prolongé par GLUCOPHAGE a été associé à une réduction de la concentration sérique de vitamine B12. Il convient donc de mesurer périodiquement la concentration sérique de vitamine B12 chez les patients qui reçoivent un traitement prolongé par GLUCOPHAGE, particulièrement ceux qui souffrent d'anémie ou d'une neuropathie (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Taux de vitamine B12).

La surveillance régulière des taux de TSH est nécessaire chez les patients atteints d'hypothyroïdie (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hypothyroïdie, EFFETS INDÉSIRABLES et Effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit).

Chez les patients qui reçoivent un traitement par la lévothyroxine pour l'hypothyroïdie, une surveillance attentive de la glycémie est recommandée, particulièrement lorsque l'hormonothérapie est amorcée, modifiée ou interrompue (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hypothyroïdie, INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Lévothyroxine).

Les personnes qui prennent la phenprocoumone ou un autre anticoagulant antivitamine K en concomitance avec GLUCOPHAGE doivent faire l'objet d'une surveillance étroite pour le Rapport international normalisé (RIN) (*voir* INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Autres médicaments).

## **EFFETS INDÉSIRABLES**

### **Aperçu des effets indésirables du médicament**

L'acidose lactique est un effet indésirable rare, mais grave, associée au traitement le chlorhydrate de metformine. L'acidose lactique entraîne la mort dans environ 50 % des cas (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS*).

Les réactions indésirables les plus fréquemment associées au traitement par le chlorhydrate de metformine sont : diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, distension abdominale, dyspepsie et flatulence.

Les réactions indésirables les plus courantes menant à l'interruption du traitement par le chlorhydrate de metformine sont des troubles gastro-intestinaux, décrits comme suit : diarrhée, nausées, vomissements, douleur abdominale et dyspepsie.

### **Effets indésirables rapportés dans les études cliniques**

*Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux d'effets indésirables observés dans les essais cliniques peuvent ne pas correspondre aux taux observés dans la pratique et ne doivent pas être comparés aux taux constatés dans le cadre d'essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables d'un médicament qui sont tirés d'essais cliniques s'avèrent utiles pour déterminer les effets indésirables liés au médicament et leurs taux approximatifs.*

Les effets indésirables suivants (une combinaison d'essais cliniques et de données après la commercialisation) ont été rapportés pour le chlorhydrate de metformine :

**Acidose lactique** : Très rare (< 1/10 000 et cas isolés) (*voir les sections MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et SURDOSAGE*).

**Appareil digestif** : Très courants (> 1/10). Les symptômes gastro-intestinaux (diarrhée, nausées, vomissements, ballonnements, flatulence et anorexie) sont les effets indésirables les plus souvent liés à l'emploi du chlorhydrate de metformine et sont près de 30 % plus fréquents chez les patients qui reçoivent cet agent seul que chez ceux qui prennent un placebo, surtout au début du traitement. Ils sont généralement transitoires et disparaissent spontanément avec le temps. Il peut parfois se révéler utile de réduire temporairement la dose administrée pour les atténuer.

Comme les symptômes gastro-intestinaux survenant au début du traitement semblent liés à la dose administrée, on peut les atténuer en augmentant progressivement la dose et en conseillant au patient de prendre GLYCON à l'heure des repas (*voir la section POSOLOGIE ET ADMINISTRATION*).

Étant donné que la diarrhée et les vomissements peuvent être une cause de déshydratation et d'urémie extra-rénale s'ils sont importants, il faut suspendre temporairement l'emploi de GLYCON en présence de tels symptômes.

Pour ce qui est des patients dont le diabète est équilibré grâce à la prise de GLYCON, la survenue

de symptômes gastro-intestinaux vagues ne devrait pas être imputée au traitement antidiabétique, à moins que la possibilité d'une affection intercurrente ou d'une acidose lactique n'ait été exclue.

**Organes des sens :** Courants ( $\geq 1/100$ ). Au cours de la mise en route du traitement, il est fréquent que les patients se plaignent d'une altération du goût, comme la perception d'un goût métallique.

**Peau et annexes cutanées :** Très rares ( $< 1/10\ 000$  et cas isolés). Dans le cadre d'essais cliniques comparatifs, la fréquence d'éruption cutanée ou de dermatite était comparable à celle obtenue avec un placebo lors de la prise du chlorhydrate de metformine seul, et à celle obtenue avec une sulfonylurée lors de la prise d'une association du chlorhydrate de metformine -sulfonylurée. La survenue de réactions cutanées telles qu'un érythème, du prurit ou de l'urticaire a été très rarement signalée.

**Appareil circulatoire :** Dans le cadre d'essais cliniques comparatifs d'une durée de 29 semaines, la concentration sérique de vitamine B12 a baissé sous la normale sans entraîner de symptôme chez environ 9 % des patients qui avaient reçu GLYCON seul et chez 6 % de ceux qui recevaient l'association GLYCON sulfonylurée, sans que la concentration sérique d'acide folique ne diminue considérablement. Cependant, seulement 5 cas d'anémie mégalo-blastique ont été rapportés chez les patients prenant de la metformine (aucun cas de la sorte dans le cadre des essais réalisés aux États-Unis), alors que la fréquence de neuropathie observée dans les essais cliniques n'a pas augmenté. Les données recueillies après la commercialisation font toutefois état de cas graves de neuropathie périphérique chez des patients sous GLYCON présentant une carence en vitamine B12 (*voir* la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

Il arrive rarement que l'administration prolongée de metformine entraîne une diminution de l'absorption de la vitamine B12 et une baisse de la concentration sérique de cette vitamine ( $\geq 1/10\ 000$  et  $< 1/1000$ ). On recommande toutefois de prendre cette éventualité en considération chez les patients souffrant d'une anémie mégalo-blastique.

**Fonction hépatique :** Très rares ( $< 1/10\ 000$  et cas isolés). La présence d'une anomalie fonctionnelle hépatique ou d'une hépatite ayant cédé à l'arrêt du traitement par la metformine a été documentée dans quelques cas isolés.

### **Effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit**

**Troubles de l'appareil circulatoire et du système lymphatique :** anémie hémolytique, ayant causé la mort dans certains cas (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Appareil circulatoire).

**Réactions gastro-intestinales :** Gêne abdominale, distension abdominale, douleur abdominale, douleur abdominale supérieure, constipation, diarrhée, sécheresse de la bouche, dyspepsie, flatulence, trouble gastrique, ulcère gastrique, troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements

**Troubles hépatobiliaires :** Anomalies lors des tests de la fonction hépatique ou hépatite qui se résorbe après interruption de la metformine, hépatite auto-immune, lésion hépatique induite par le médicament, hépatite, pancréatite (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction hépatique/biliaire/pancréatique).

**Investigations** : Augmentation du taux d'acide lactique dans le sang

Diminution des taux de thyroïdostimuline chez les patients avec une hypothyroïdie traitée ou non traitée (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hypothyroïdie et Surveillance et épreuves de laboratoire).

**Troubles de la fonction neurologique** : Encéphalopathie (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système neurologique).

**Troubles du métabolisme et de la nutrition** : Acidose lactique, diminution d'absorption de la vitamine B12 avec diminution des taux sériques lors d'une utilisation à long terme de la metformine, perte de poids, diminution de l'appétit

Neuropathie périphérique chez les patients qui présentent une carence en vitamine B12 (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Taux de vitamine B12).

**Réactions de la peau et des tissus sous-cutanés** : Photo sensibilité, Érythème, prurit, éruption cutanée, lésion cutanée et urticaire

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

### Aperçu

L'emploi de certains agents antidiabétiques, particulièrement les sulfonylurées, peut potentialiser les effets de GLYCON. L'administration simultanée de GLYCON et d'une sulfonylurée peut occasionner une réaction hypoglycémique, surtout chez le patient qui prend d'autres médicaments ayant eux-mêmes le pouvoir de potentialiser les effets des sulfonylurées, par exemple les sulfamides à action prolongée, les tuberculostatiques, la phénylbutazone, le clofibrate, les inhibiteurs de la monoamine-oxydase, les salicylates, le probénécide et le propranolol.

Dans le cadre d'études sur les interactions médicamenteuses comportant l'administration de doses uniques, les caractéristiques pharmacocinétiques du propranolol et de l'ibuprofène n'ont pas été altérées par la prise simultanée de metformine par le volontaire sain.

La metformine se lie aux protéines plasmatiques dans une proportion négligeable, aussi la probabilité qu'elle interagisse avec les médicaments qui se lient fortement à ces protéines, comme les salicylates, les sulfamides, le chloramphénicol et le probénécide, est moins grande que dans le cas des sulfonylurées, qui se lient fortement à ces protéines.

### Interactions médicament-médicament

#### **Glyburide**

Dans le cadre d'une étude sur les interactions médicamenteuses comportant l'administration de doses uniques à des patients atteints de DNID, l'emploi concomitant de metformine et de glyburide n'a entraîné aucune modification de la pharmacocinétique ou de la pharmacodynamique

de la metformine. On a cependant observé des diminutions hautement variables de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques du glyburide en fonction du temps (ASC) et de la concentration maximale ( $C_{max}$ ) de cette substance. Étant donné que l'étude comportait l'administration de doses uniques et compte tenu de l'absence de corrélation entre la concentration sanguine de glyburide et les effets pharmacodynamiques de ce produit, la portée clinique de l'interaction observée est nébuleuse.

### **Furosémide**

Dans le cadre d'une étude sur les interactions médicamenteuses comportant l'administration de doses uniques à des volontaires sains, l'emploi concomitant de metformine et de furosémide s'est traduit par des altérations des paramètres pharmacocinétiques de ces 2 produits. D'une part, l'emploi du furosémide a entraîné une augmentation de 22 % des  $C_{max}$  plasmatique et sanguine de metformine et de 15 % de l'ASC relative à la concentration sanguine de ce produit, sans que l'élimination rénale de la metformine ne soit altérée significativement. D'autre part, la prise de metformine a occasionné des diminutions respectives de 31 % et de 12 % de la  $C_{max}$  et de l'ASC habituellement observées après l'administration de furosémide seul, tandis que la demi-vie de ce produit a diminué de 32 % sans que l'élimination rénale du furosémide ne soit altérée significativement. Il n'existe aucune donnée relative à l'interaction consécutive à l'administration concomitante de metformine et de furosémide sur une longue période.

### **Nifédipine**

Dans le cadre d'une étude sur les interactions médicamenteuses comportant l'administration de doses uniques à des volontaires sains, l'emploi concomitant de metformine et de nifédipine a entraîné des augmentations respectives de 20 % et de 9 % de la  $C_{max}$  plasmatique de metformine et de l'ASC ainsi qu'un accroissement de la quantité de metformine excrétée dans les urines, sans que le délai d'obtention de la  $C_{max}$  ( $T_{max}$ ) et la demi-vie de ce produit ne soient altérés. Il semble que l'emploi de la nifédipine favorise l'absorption de la metformine. Quant à la metformine, son emploi n'a que des effets minimes sur la pharmacocinétique de la nifédipine.

### **Agents cationiques**

En théorie, les médicaments cationiques (p. ex., amiloride, digoxine, morphine, procaïnamide, quinidine, quinine, ranitidine, triamterène, triméthoprime et vancomycine) qui sont éliminés par l'intermédiaire des tubes urinaires peuvent interagir avec la metformine en concurrençant celle-ci pour l'accès au réseau de transport tubulaire du rein. Une interaction semblable entre la metformine et la cimétidine à prise orale s'est produite chez des volontaires sains. Dans les études sur les interactions médicamenteuses comportant l'administration concomitante de doses uniques et de doses multiples de ces 2 agents, on a observé une élévation de 60 % des concentrations maximales plasmatique et sanguine globale de la metformine ainsi qu'une augmentation de 40 % des ASC relatives aux concentrations plasmatique et sanguine globale de metformine. Aucune modification de la demi-vie d'élimination n'a été relevée dans le cadre de l'étude qui comportait l'emploi de doses uniques. La metformine est sans effet sur la pharmacocinétique de la cimétidine. Il est donc recommandé de surveiller attentivement l'état du patient et d'adapter avec soin la dose de GLYCON ou de l'autre agent pris simultanément si celui-ci est un médicament cationique excrété par l'intermédiaire des tubes urinaires.



## **Lévothyroxine**

La lévothyroxine peut diminuer l'effet hypoglycémique de la metformine. Les taux de glycémie doivent être surveillés, particulièrement lorsque l'hormonothérapie thyroïdienne est amorcée, modifiée ou interrompue (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et épreuves de laboratoire) et la dose de GLUCOPHAGE doit être ajustée au besoin (*voir* POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Considérations posologiques).

## **Autres médicaments**

L'emploi d'autres médicaments tend à accroître la glycémie et peut entraîner une perte de l'équilibre glycémique. Parmi ces agents, mentionnons les diurétiques thiazidiques et d'autres types, les corticostéroïdes, les dérivés de la phénothiazine, les produits employés dans le traitement des troubles de la thyroïde, les œstrogènes, les associations œstro-progestatives, les contraceptifs oraux, la phénytoïne, la niacine, les agents sympathomimétiques, les inhibiteurs calciques, l'isoniazide et les agonistes des récepteurs bêta-2. Les inhibiteurs de l'ECA peuvent quant à eux diminuer la glycémie. Il convient de surveiller étroitement l'état du patient qui reçoit l'un de ces agents et GLYCON afin de préserver l'équilibre glycémique. Une surveillance plus fréquente de la glycémie peut être nécessaire, surtout au début du traitement. Si nécessaire, ajuster la posologie de la metformine pendant le traitement avec le médicament correspondant et à son interruption.

Les diurétiques, en particulier les diurétiques de l'anse, peuvent augmenter le risque d'acidose lactique en raison de leur potentiel à altérer la fonction rénale.

On a fait état d'une augmentation de 20 % de la vitesse d'élimination de la phenprocoumone, un anticoagulant, quand cet agent est administré en concomitance avec GLYCON. Par conséquent, une surveillance étroite du rapport international normalisé (INR) est recommandée chez les patients recevant l'administration concomitante de GLYCON et de phénprocoumon ou d'autres anticoagulants antivitaminiques K. Chez ces personnes, l'arrêt du traitement par GLYCON peut en outre provoquer un allongement important du temps de Quick, donc un accroissement du risque d'hémorragie.

## **Interactions médicament-aliment**

Aucune interaction avec les aliments n'a été établie.

## **Interactions médicament-herbe médicinale**

Aucune interaction avec des produits à base d'herbes médicinales n'a été établie.

## **Effets du médicament sur les résultats des épreuves de laboratoire**

La réalisation d'exams radiologiques comportant l'administration intravasculaire de produits de contraste iodés peut entraîner une altération aiguë de la fonction rénale et a été associée à l'apparition d'une acidose lactique chez des patients qui recevaient de la metformine (*voir* les sections CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

### **Effets du médicament sur le mode de vie**

Il faut conseiller au patient qui reçoit GLYCON d'éviter toute consommation excessive d'alcool aiguë ou chronique, car la prise d'alcool entraîne la potentialisation des effets de la metformine sur le métabolisme du lactate (*voir* la section CONTRE-INDICATIONS). Le risque d'acidose lactique est augmenté en cas d'intoxication alcoolique aiguë, en particulier en cas de jeûne, de malnutrition ou d'insuffisance hépatique. Il est recommandé d'éviter la consommation d'alcool et de produits médicinaux contenant de l'alcool.

## **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

### **Considérations posologiques**

Il faut individualiser la posologie pour chaque patient diabétique et déterminer la dose minimale qui réduira la glycémie adéquatement dans chacun des cas, en visant des cibles glycémiques se rapprochant le plus possible de la normale. Il est recommandé d'instaurer le traitement à faibles doses que l'on augmentera graduellement par la suite pour réduire au minimum les symptômes gastro-intestinaux.

Au fil du temps, il est possible que les patients répondent de moins en moins bien au traitement par les hypoglycémisants oraux en raison de l'aggravation de leur diabète. Il est donc essentiel de procéder régulièrement à des évaluations cliniques et à des épreuves de laboratoire comportant un dosage de la glycémie et de l'hémoglobine glycosylée (HbA1C), afin de déterminer la posologie minimale efficace et de déceler tout échec primaire ou secondaire (*voir* la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

Lorsque la dose maximale ne suffit pas à abaisser adéquatement la glycémie, une autre option thérapeutique doit être envisagée.

GLYCON est essentiellement excrété par le rein, et le risque d'accumulation de metformine et d'acidose lactique augmente avec le degré d'altération de la fonction rénale. GLYCON ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des taux de créatinine sérique au-dessus de la limite supérieure de la normale pour leur âge (*voir* CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE, Fonction rénale).

Chez les patients âgés, le chlorhydrate de metformine doit être soigneusement adapté afin d'établir la dose minimale pour un effet glycémique adéquat, parce que le vieillissement est associé à une altération de la fonction rénale et à un risque de développer une acidose lactique (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Acidose lactique). Il ne faut pas entreprendre un traitement par GLYCON chez les patients de 80 ans et plus, à moins que les valeurs de la clairance de la créatinine ne démontrent aucune altération de la fonction rénale, étant donné que les patients âgés sont plus susceptibles de développer une acidose lactique (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières, Personnes âgées).

Il faut être prudent lors d'une administration concomitante de médicaments qui peuvent altérer la fonction rénale (comme les diurétiques, en particulier les diurétiques de l'anse) ou qui peuvent interférer avec l'élimination de GLYCON, notamment les médicaments cationiques qui sont

éliminés par sécrétion tubulaire rénale, en raison du risque accru de développer une acidose lactique lors d'une administration concomitante (*voir* INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).

Un ajustement de la dose de GLUCOPHAGE doit être envisagé au besoin lorsque le traitement par GLUCOPHAGE est concomitant à la prise de médicaments cationiques qui sont éliminés par l'intermédiaire des tubes urinifères ou à celle de médicaments qui causent une hyperglycémie ou une hypoglycémie, particulièrement au début du traitement par le(s) médicament(s) qui peuvent causer une interaction et lorsque le traitement est interrompu (*voir* INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Agents cationiques et Autres médicaments).

### **Dose recommandée et ajustement de la posologie**

GLYCON (chlorhydrate de metformine) est habituellement administré à raison de 500 mg, 3 ou 4 fois par jour, ou de 850 mg, 2 ou 3 fois par jour. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 2,55 g. Dans la mesure du possible, on prendra GLYCON avec des aliments pour réduire au minimum les troubles gastriques tels que les nausées et les vomissements.

### **Passage d'autres antidiabétiques à la metformine**

Aucune période de transition n'est généralement nécessaire lors du passage d'hypoglycémifiants oraux standard à GLYCON, sauf dans le cas du chlorpropamide, qui impose une surveillance au cours des 2 premières semaines. En effet, la longue période de rétention du chlorpropamide dans l'organisme entraîne un chevauchement des effets médicamenteux et comporte un risque d'hypoglycémie.

### **Enfants (< 18 ans)**

L'innocuité et l'efficacité du chlorhydrate de metformine n'ont pas été établies chez les enfants et les adolescents. Par conséquent, on ne doit pas utiliser GLYCON dans cette population de patients.

### **Personnes âgées (> 65 ans)**

GLYCON doit être soigneusement ajusté chez les patients âgés afin d'établir la dose minimale pour un effet glycémique adéquat, en raison d'une fonction rénale altérée associée au vieillissement et du risque de développement d'acidose lactique (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système endocrinien/métabolisme, Acidose lactique). Chez les patients âgés, la dose initiale et d'entretien de GLYCON doit être modérée, et tout ajustement de la posologie doit reposer sur une évaluation rigoureuse de la fonction rénale. La fonction rénale doit être surveillée régulièrement et en règle générale, GLYCON ne doit pas être dosé à la posologie maximale (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières, Personnes âgées).

### **Insuffisance rénale**

GLYCON est contre-indiqué chez les patients souffrant d'insuffisance rénale, de fonction rénale inconnue, ou chez les patients présentant des taux de créatinine sérique au-dessus de la limite supérieure de la normale pour leur âge, en raison du risque d'acidose lactique (*voir* CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

### **Insuffisance hépatique**

L'emploi de GLYCON est contre-indiqué chez les patients atteints de trouble hépatique grave

(voir CONTRE-INDICATIONS) puisque dans certains cas le trouble hépatique grave est associé à une acidose lactique. GLYCON ne devrait donc pas être administré à des patients dont les résultats cliniques ou les épreuves de laboratoire révèlent une maladie hépatique (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction hépatique/biliaire/pancréatique).

### **Dose oubliée**

Le patient qui oublie de prendre ses comprimés GLYCON doit attendre l'heure habituelle de la dose subséquente. Il ne doit pas doubler la dose pour compenser la dose oubliée.

## **SURDOSAGE**

Il existe très peu de données sur le traitement du surdosage massif par GLYCON (chlorhydrate de metformine). On pourrait dans un tel cas s'attendre à des réactions indésirables de plus forte intensité qu'à la normale, notamment les suivantes : troubles épigastriques, nausées et vomissements suivis de diarrhée, somnolence, faiblesse, étourdissements, malaises et céphalées. Si ces symptômes persistent, il faut prendre les mesures afin d'éliminer l'hypothèse d'une acidose lactique. Le surdosage commande l'arrêt du traitement et des mesures de soutien appropriées doivent être instaurées.

Des cas de surdosage de chlorhydrate de metformine ont été dénombrés, certains impliquant l'ingestion de plus de 50 g. Une hypoglycémie a été signalée dans quelque 10 % des cas sans qu'un lien de causalité avec le chlorhydrate de metformine soit établi. Environ 32 % des cas de surdosage de metformine s'accompagnaient d'une acidose lactique (voir la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS). La metformine se prête à la dialyse, sa vitesse d'élimination pouvant atteindre 170 mL/min dans des circonstances hémodynamiques favorables. L'hémodialyse peut par conséquent être utile pour éliminer la metformine accumulée en cas de surdosage présumé.

Une pancréatite peut survenir dans le cas d'un surdosage de metformine (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction hépatique/biliaire/pancréatique).

En cas de surdosage présumé, contactez votre Centre antipoison.
---

## **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

### **Mode d'action**

GLYCON (chlorhydrate de metformine) est un dérivé de la famille des biguanides ayant un effet antihyperglycémiant, mais seulement chez l'humain et chez l'animal diabétique, et uniquement en présence de sécrétion d'insuline. La metformine administrée seule aux doses thérapeutiques n'entraîne pas d'hypoglycémie chez l'humain ni chez l'animal non diabétique; un tel effet n'apparaît que lorsque la dose administrée est très près de la dose létale. La metformine n'exerce aucun effet sur les cellules bêta du pancréas. Son mode d'action n'est pas entièrement élucidé,

mais on a émis l'hypothèse qu'elle pourrait accroître le pouvoir d'action de l'insuline, ou encore favoriser la fixation de cette hormone sur les sites récepteurs périphériques. Cette augmentation de la sensibilité à l'insuline semble découler d'un accroissement du nombre de récepteurs insuliniques à la surface des cellules.

### **Pharmacodynamique**

Il existe peu de données sur la relation entre pharmacodynamique et pharmacocinétique, et l'effet de la metformine sur le contrôle de la glycémie ne peut donc pas être prédit à partir des seules données pharmacocinétiques. Les concentrations tissulaires de metformine dans les doubles sites cibles du foie et des muscles semblent fournir plus d'informations, et le compartiment profond de metformine approvisionnant ces tissus est essentiel et lié aux concentrations plasmatiques. Ce point de vue corrobore l'observation clinique voulant que l'action hypoglycémiante de la metformine prenne du temps pour pleinement s'exprimer et aussi que l'activité n'est pas immédiatement perdue lors du retrait du médicament.

### **Pharmacocinétique**

#### **Absorption**

L'absorption de la metformine est relativement lente et peut s'étendre sur environ 6 heures.

#### **Distribution**

La liaison aux protéines plasmatiques est négligeable. La metformine se divise dans les érythrocytes. Le pic glycémique est plus faible que le pic plasmatique et apparaît à peu près au même moment. Les globules rouges sont plus susceptibles de représenter un compartiment secondaire de distribution. Le volume moyen de distribution (Vd) se situait entre 63 et 276 L.

#### **Métabolisme**

La metformine n'est pas métabolisée. Ses principaux sites de concentration sont la muqueuse intestinale et les glandes salivaires. La concentration plasmatique à l'équilibre s'étend environ de 1 à 2 mcg/mL. Certains médicaments peuvent potentialiser les effets de la metformine (*voir MISES EN GARDES ET PRÉCAUTIONS et INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES*).

#### **Excrétion**

Le médicament est excrété dans l'urine à une clairance rénale élevée d'environ 450 mL/min. La première phase d'élimination de la metformine est courte, la demi-vie du médicament variant entre 1,7 heure et 3 heures. La phase terminale d'élimination, durant laquelle est éliminée de 4 % à 5 % de la dose absorbée, est longue, la demi-vie variant alors entre 9 heures et 17 heures.

### **STABILITÉ ET CONSERVATION**

Les comprimés GLYCON doivent être conservés dans un contenant hermétique à la température ambiante (entre 15 °C et 30 °C). Protéger de la lumière.

## FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Chaque comprimé de GLYCON de 500 mg et de 850 mg contient du chlorhydrate de metformine, BP.

Ingrédients non médicinaux : croscarmellose sodique, NF, stéarate de magnésium, cellulose, microcristalline, NF, povidone, USP.

Pelliculage : cire de carnauba, NF, polyéthylène glycol, alcool polyvinylique, talc, dioxyde de titane.

**Comprimé de 500 mg de GLYCON :** chaque comprimé blanc, rond, biconvexe, recouvert d'une pellicule portant l'empreinte « M21 » sur un côté et « ICN » sur l'autre, contient 500 mg de chlorhydrate de metformine, BP. Ce médicament est offert dans des flacons de 100 et 500 comprimés.


**Comprimé de 850 mg de GLYCON :** chaque comprimé blanc, ovale, biconvexe, recouvert d'une pellicule portant l'empreinte « M22 » sur un côté et « ICN » sur l'autre, contient 850 mg de chlorhydrate de metformine, BP. Le médicament est offert dans des flacons de 100 comprimés.

## PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

### RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

#### Substance pharmaceutique

Dénomination commune :	Chlorhydrate de metformine
Nom chimique :	(1) Imidodiacarbonimidic diamide, N, N-diéthyl, monohydrochloride (2) 1,1-Dimethylbiguanide monohydrochloride
Masse moléculaire :	165,63 g/mol
Formule développée :	



#### Propriétés physicochimiques

Description :	Le chlorhydrate de metformine est une poudre cristalline blanche.
Solubilité :	Le chlorhydrate de metformine est soluble dans l'eau et légèrement soluble dans l'alcool éthylique à 95 %. Il est presque insoluble dans le chloroforme et l'éther.
Point de fusion :	Entre 218 et 220 °C.
Constante de dissociation :	pKa 2.8, 11.5 (32°C)

## ESSAIS CLINIQUES

Dans le tableau ci-dessous sont présentées des données pharmacocinétiques provenant d'une étude de bioéquivalence, croisée et randomisée, avec inversion de traitement, visant à comparer une dose orale unique de 500 mg de GLYCON et de GLUCOPHAGE<sup>MD</sup> (produit fabriqué par Marion Merrell Dow, Canada) auprès de 30 sujets de sexe masculin à jeun.

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ**

Chlorhydrate de metformine (1 comprimé de 500 mg) À partir des données mesurées				
Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (CV en %)				
Paramètre	Test*	Référence†	% ratio des moyennes géométriques	90 % d'intervalles de confiance
ASC <sub>T</sub> (ng.hr/mL)	5 630 5 764 (23 %)	5 302 5 506 (26 %)	106	95,9 % – 113,5 %
ASC <sub>I</sub> (ng.hr/mL)	6 158 6 291 (22 %)	5 836 6 020 (24 %)	106	96,8 % – 113,9 %
C <sub>MAX</sub> (ng/mL)	1 031 1 057 (22 %)	989 1 015 (23 %)	104	96,4 % – 111,9 %
T <sub>MAX</sub> <sup>§</sup> (h)	2,57 (32 %)	2,36 (39 %)		
T <sub>1/2</sub> <sup>§</sup> (h)	2,47 (14,38 %)	2,41 (13,22 %)		

\* Comprimés de 500 mg de GLYCON

† Comprimés de 500 mg de GLUCOPHAGE (produit fabriqué par Marion Merrell Dow, Canada) achetés au Canada

§ Valeur exprimée sous forme de moyenne arithmétique (CV %).

Les données ayant étayé l'homologation de la soumission originale de la metformine dans sa présentation initiale ne sont pas disponibles. La présente section expose plutôt les résultats d'une étude publiée sur l'innocuité et l'efficacité de la metformine.

Cette étude prospective avec randomisation (UKPDS) a établi les bienfaits à long terme d'une maîtrise intensive de la glycémie chez des patients adultes atteints du diabète de type 2. L'analyse des résultats des patients accusant une surcharge pondérale qui ont été traités par la metformine après l'échec d'un régime alimentaire seul a révélé :

- Une réduction significative du risque absolu de toute complication liée au diabète dans le groupe metformine (29,8 manifestations/1000 années-patients) par comparaison avec le groupe soumis uniquement à un régime alimentaire (43,3 manifestations/1000 années patients),  $p = 0,0023$ , et les groupes sulfonyleurée et insulinothérapie combinés (40,1 manifestations/1000 années-patients),  $p = 0,0034$ .
- Une réduction significative du risque absolu de mortalité liée au diabète dans le groupe metformine (7,5 cas/1000 années-patients) par comparaison avec le groupe soumis uniquement à un régime alimentaire (12,7 cas/1000 années-patients) ( $p = 0,017$ ) (aucune



différence significative n'a été observée entre le groupe metformine et les groupes ayant eu droit à un traitement intensif par une sulfonylurée ou l'insuline).

- Une réduction significative du risque absolu de mortalité globale dans le groupe metformine (13,5 cas/1000 années-patients) par comparaison avec le groupe soumis uniquement à un régime alimentaire (20,6 cas/1000 années-patients) ( $p = 0,011$ ), et les groupes sulfonylurée et insulinothérapie combinés (18,9 cas/1000 années-patients) ( $p = 0,021$ ).
- Une réduction significative du risque absolu d'infarctus du myocarde dans le groupe metformine (11 cas/1000 années-patients) par comparaison avec le groupe soumis uniquement à un régime alimentaire (18 cas/1000 années-patients) ( $p = 0,01$ ) (aucune différence significative n'a été observée entre le groupe metformine et les groupes ayant eu droit à un traitement intensif par une sulfonylurée ou l'insuline).
- Aucune différence significative n'a été notée entre le groupe metformine et le groupe soumis uniquement à un régime alimentaire pour ce qui est des autres paramètres d'évaluations combinés (AVC, angiopathie périphérique et complications microangiopathies).

## PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

La metformine est absorbée relativement lentement, durant une période pouvant atteindre plus de 6 heures.

Les résultats d'études menées chez des animaux à l'aide de la technique de marquage au C14 ont permis de constater que la metformine ne se concentrait pas dans les cellules hépatiques et qu'elle n'était pas excrétée dans la bile; elle se concentre plutôt dans la muqueuse intestinale et les glandes salivaires.

On a pu démontrer que la concentration sanguine de metformine consécutive à l'administration de 2 g de ce médicament demeurerait inférieure à 10  $\mu$ g/mL, même à la concentration plasmatique maximale, obtenue 2 heures après l'absorption. Les analyses effectuées ont permis de constater que la metformine n'exerçait aucune action notable sur l'organisme autre que son activité métabolique particulière.

Chez l'animal sain, l'administration de metformine n'entraîne de réduction de la glycémie que lorsque la dose administrée est très près de la dose létale. La sensibilité à la metformine varie d'une espèce animale à l'autre. Les animaux atteints de diabète provoqué expérimentalement sont nettement plus sensibles à la metformine, à condition qu'il y ait toujours sécrétion d'insuline.

L'action antihyperglycémique de la metformine s'exerce probablement par l'intermédiaire de l'insuline : l'emploi de la metformine se traduit par l'amélioration du coefficient K d'assimilation du glucose, de même que du coefficient d'efficacité insulinique.

Certains résultats semblent indiquer que la prise de metformine normalise la sécrétion de l'insuline chez le diabétique obèse atteint d'hyperinsulinémie, en même temps qu'elle normalise la glycémie.

Chez l'animal sain, l'administration de metformine n'a que peu d'effet sur les réserves hépatiques

de glycogène. L'emploi de doses faibles ou modérées n'entraîne aucune modification de ces réserves, alors que celui de doses élevées se rapprochant de la dose létale occasionne une diminution de ces réserves, qui précède la chute de la glycémie. Cette réaction illustre le mécanisme de défense sous-tendant la mobilisation des réserves de l'organisme à des fins antihypoglycémiantes.

Chez l'animal diabétique dont les réserves hépatiques de glycogène sont appauvries, le contraire se produit : l'administration de metformine se traduit par l'accroissement de ces réserves. Employée *in vitro*, la metformine augmente également l'utilisation du glucose par le tissu musculaire, comme en témoignent les mesures réalisées à l'aide de l'appareil de Warburg après isolation de tissu musculaire; cette action se fait en aérobie. Même en concentration élevée, la metformine ne semble pas inhiber les processus respiratoires ni entraîner le métabolisme des glucides en anaérobie, contrairement au phénylbiguanide.

La metformine est éliminée dans les fèces et l'urine. Elle est rapidement excrétée par le rein sous forme inchangée.

La clairance rénale de la metformine de 450 mL/min semble expliquer l'absence d'accumulation du médicament dans l'organisme.

Les méthodes de dépistage fondées sur le radiomarquage ou le dépistage chimique n'ont pas permis de trouver de métabolites de la metformine.

L'examen radio chromatographique des urines révèle de façon constante un seul pic de soluté pour lequel le Rf correspond toujours à celui de la metformine pure. L'administration de metformine pendant 10 jours consécutifs n'a donné lieu à aucun signe d'accumulation.

On a noté, chez certains animaux, une inhibition de la néoglycogénèse après stimulation de celle-ci par le jeûne ou encore par administration de cortisol, d'alcool ou d'autres substrats tels que l'alanine, le lactate et le pyruvate. Cependant, cet effet variait selon le type et la dose du biguanide administré, l'état nutritionnel de l'espèce animale étudiée et le modèle expérimental utilisé.

On n'observe une inhibition de la néoglycogénèse qu'en présence d'insuline, et cette inhibition ne semble pas jouer un rôle important chez l'humain.

Chez l'humain et chez l'animal placés dans certaines conditions expérimentales, une inhibition de l'absorption intestinale des glucides consécutive à l'administration de biguanides a été observée; cette inhibition n'était pas liée à un phénomène de malabsorption. Une étude, entre autres, a permis de constater un allongement de 20 % du temps d'absorption du galactose chez des humains ayant reçu de la metformine. Une autre étude, toujours réalisée chez l'homme, n'a toutefois pas permis d'étayer ces résultats.

Des données récentes semblent indiquer que la plupart des effets des biguanides sur le métabolisme s'exercent par l'intermédiaire d'un seul mécanisme, soit l'inhibition de l'oxydation des acides gras et de la production de l'acétylcoenzyme A.

L'inhibition de la lipogenèse stimulée par l'insuline, un effet également observé, semble cependant attribuable à l'inhibition de l'acétylcoenzyme A carboxylase par les biguanides. Cet effet pourrait expliquer, du moins en partie, la perte de poids survenant chez le diabétique obèse qui reçoit un biguanide.

## TOXICOLOGIE

### Toxicité chez l'animal

Toxicité aiguë (DL<sub>50</sub>)

<u>Animal</u>	<u>Voie sous-cutanée</u>	<u>Voie orale</u>
Souris	225 mg/kg	3500 mg/kg
Poulet	150 mg/kg	
Rat	300 mg/kg	1000 mg/kg
Lapin	150 mg/kg	350 mg/kg
Cochon d'Inde	150 mg/kg	500 mg/kg

### Toxicité chronique

A. L'administration de metformine n'a occasionné aucun effet toxique organique aux doses suivantes :

Rat	125 mg/kg	par voie orale pendant 1 an
Lapin	100 mg/kg	par voie orale pendant 1 an
Chien	50 mg/kg	par voie sous-cutanée pendant 2 ans

On n'a constaté aucun effet toxique organique à court ou à long terme chez les espèces animales étudiées.

B. Des chercheurs ont étudié durant 9 mois les effets de la metformine chez 80 rats mâles et femelles, répartis-en 4 groupes traités aux doses suivantes :

1er groupe	groupe témoin
2e groupe	150 mg/kg par voie orale
3e groupe	300 mg/kg par voie orale
4e groupe	300 mg/kg par voie orale, accroissement de la dose quotidienne de 100 mg/kg tous les 15 jours

Les chercheurs ont pu constater que la metformine était très bien tolérée par les rats, même à de très fortes doses. Ils n'ont observé aucune lésion attribuable au médicament.

C. Une étude sur la toxicité chronique d'une durée de 9 mois a été menée chez 16 chiens beagle, malgré l'intolérance complète avérée de cette espèce de chien aux hypoglycémifiants administrés par voie orale. Des troubles trophiques et neurologiques accompagnés de cachexie ont rapidement entraîné la mort des chiens. Au cours des périodes d'administration de la metformine, les résultats des analyses de laboratoire étaient normaux. Les concentrations enzymatiques étaient quelque peu élevées, mais il est difficile de leur attribuer une portée pathologique, étant donné que les valeurs obtenues pour le groupe témoin étaient du même ordre.

Les examens anatomo-pathologiques ont révélé une dénutrition extrême chez tous les animaux traités par la metformine. On a constaté une atrophie tissulaire très prononcée dans tous les organes, surtout en ce qui a trait au tissu adipeux. La cachexie semble avoir causé la mort dans tous les cas.

### **Toxicité chez l'humain**

Aucun effet indésirable sur la fonction hépatique ou rénale, sur le système hématopoïétique ou sur les vaisseaux sanguins n'a été rapporté chez l'humain à la suite de l'administration de metformine.

La fréquence déclarée d'acidose lactique est très faible (environ 0,03 cas par 1000 années-patients, et environ 0,015 décès par 1000 années-patients) chez les personnes qui reçoivent de la metformine.

L'administration successive de phenformine et de metformine a permis de mettre au jour une différence fondamentale entre ces 2 biguanides quant à leur effet sur la lactacidémie. Dans certains cas, une hyperlactacidémie est survenue après l'administration de phenformine chez des patients dont la lactacidémie était demeurée normale au cours d'un traitement par la metformine. Dans d'autres cas, l'hyperlactacidémie observée pendant un traitement par la phenformine a régressé lorsqu'on a remplacé ce médicament par la metformine. La prise de metformine peut elle aussi provoquer une hausse de la lactacidémie, mais cette hausse sera moins significative sur le plan clinique que celle entraînée par l'emploi de phenformine.

### **Effets tératogènes**

Des études de tératologie ont été menées chez des rates albinos, qu'on avait réparties en 3 groupes.

On n'a relevé aucune malformation congénitale, même chez les petits des rates traitées à des doses élevées. Le nombre d'animaux était le même dans chacun des groupes étudiés.

Les taux de décès étaient à peu près les mêmes pour les 2 groupes ayant reçu de la metformine et pour le groupe témoin. Le nombre de naissances vivantes était cependant légèrement plus faible dans les 2 groupes traités que dans le groupe témoin. De plus, la fréquence des portées de plus de 10 ratons vivants était un peu plus élevée dans ces groupes que dans le groupe témoin. Au moment du sevrage, le poids des ratons nés de mères traitées par la metformine était en outre inférieur au poids des ratons issus du groupe témoin.

Les différences observées n'étaient pas significatives sur le plan statistique. Il n'y avait aucune

différence entre les groupes quant à la mortalité. Le nombre de décès survenus après la naissance était légèrement plus élevé dans les groupes traités par la metformine que dans le groupe témoin, mais la mortalité moyenne ne différait pas de façon significative entre ces groupes ( $p < 0,05$ ).

## RÉFÉRENCES

1. Alberti KGM, et al. Lactic Acidosis. The Lancet. 1977 July 2:25-29.
2. Beckman R. Absorption, distribution in the organism and elimination of metformin. Diabetologia, 1969;5:318-324.
3. Benoit R, et al. Acidose lactique et phenformine. L'Union Médicale du Canada. 1976;105:1810-1814.
4. Berger W, et al. Problèmes d'actualité concernant le mécanisme d'action des biguanides. Jour. Diab. Hôtel-Dieu Paris. 1975;239-258.
5. Bergman U, Boman G, and Wiholm BE. Epidemiology of adverse drug reactions to phenformin and metformin. British Medical Journal, 1978;2:464-466.
6. Bermond P. The coefficient of insulin efficacy. Effect of Metformin on this parameter. X<sup>ième</sup> Congrès Fédération Int. Diabétologie, Stockholm; 1967. ED. Excerpta Medica F. Amsterdam; 1968.
7. Biron P. Metformin monitoring. C.M.A.J. 1980;123:11-12.
8. Bouaziz PI. Apport à l'étude de l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie veineuse sous thérapie diabétique. Thèse de doctorat en médecine, Paris. 1966.
9. Canadian Diabetes Association. Nephropathy. Canadian Journal of Diabetes. 2013 Clinical Practice Guidelines;2013:S142-S144.
10. Canadian Diabetes Association. Pharmacologic management of type 2 diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2013 Clinical Practice Guidelines;2013:S61-S68.
11. Canadian Diabetes Association. Physical activity and diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2013 Clinical Practice Guidelines;2013:S40-S44.
12. Canadian Diabetes Association. Targets for glycemic control. Canadian Journal of Diabetes. 2013 Clinical Practice Guidelines;2013:S31-S34.
13. Canadian Diabetes Association. Pre-existing diabetes and pregnancy. Canadian Journal of Diabetes. Clinical Practice Guidelines Expert Committee;2013:S168-S183.
14. Chan JCN, et al. Drug-induced disorders of glucose metabolism. Mechanisms and management. Drug Safety, 1996 AUG;15(2):135-157.
15. Cohen RD. The relative risks of different biguanides in the causation of lactic acidosis. Research and Clinical Forums. 1979;1(4):125-134.
16. Cohen Y, et al. Étude autoradiographique chez la souris d'un antidiabétique oral, le N.N-

- Dimethylbiguanide, marqué au  $^{14}\text{C}$ . *Thérapie*.1961;109-120.
17. Cohen Y, et al. Étude autoradiographique chez la souris d'un antidiabétique oral marqué au  $^{14}\text{C}$ , le N.N-Dimethylbiguanide, après administration répétées. *Thérapie*.1968;XXIII:1185-1191.
  18. Cox D, et al. The effects of glucose fluctuation on cognitive function and QOL: the functional costs of hypoglycaemia among adults with Type 1 or Type 2 diabetes. *IJCP* 2002 July;(Suppl.129):20-26.
  19. Daubresse JC, et al. Acidose lactique et thérapeutique par biguanides. *Méd. Et Hyg.* 1975;1168.
  20. Debry G, et al. Étude du mode d'excrétion du N.N.Dimethylbiguanide chez le diabétique adulte. *Thérapie*. 1963;XX:351-358.
  21. Derot M, et al. Retrospective study of the cardiovascular fate of 190 patients treated for 5 years or more with biguanides alone. Abstracts, 11<sup>th</sup> Annual Meeting, Munich. September; 1975.
  22. Duval D. Contribution à l'étude de l'action hypoglycémisante des biguanides. Thèse de doctorat en médecine, Paris. 1960.
  23. Duwoos H, et al. Hyperlactacidémie réversible induite par la phenformine avec asthénie musculaire et signes cardio-respiratoires. *Presse Méd.* 1970;78:23-26.
  24. Foster DW. Diabetes Mellitus. In: Harrison's Principles of Internal Medicine. 11<sup>th</sup> Edition, 1987:1779-1796.
  25. Fray KN, Adnitt PI, and Turner P. The hypoglycemic action of metformin. *Postgraduate Medical Journal.* 1971;47:777-780.
  26. Glueck CJ, Wang P, Kobayashi S, Phillips H, Sieve-Smith L. Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome. *Fertility and Sterility.* 2002;77(3):520-525.
  27. Goodman, Gilman A, et al: Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 8th Edition, Pergamon Press 1990:1487.
  28. Hermann LS. Metformin: A review of its pharmacological properties and therapeutic use. *Diabète & Métabolisme.* 1979;3:233-245.
  29. Hermann LS. Metabolic effects of Metformin in relation to clinical effects and side effects in Biguanide Therapy Today. International Congress and Symposium, series published by the Royal Society of Medicine. 1981;48:17-43.
  30. Holle A, et al. Biguanide treatment increases the number of insulin receptor sites on human

- erythrocytes. *The New Engl. J. Med.* 1981;305(10):563-566.
31. Hunt JA, et al. The use of phenformin and metformin. Letter to the Editor, *C.M.A.J.* 1977;117(5):429-430.
  32. Irsigler K. Glukoseutilisation und Plasmalipoide bei adipösen Patienten unter dem Einfluss von Dimethylbiguanid (GLUCOPHAGE<sup>MD</sup>). *Weiner med. Wsch.* 1969;119:191-194.
  33. Isnard F, et al. Acidose lactique et biguanides. Etat actuel de la question en France. Journées annuelles de diabétologie de l'Hôtel-Dieu. 1977;362-375.
  34. Jackson RA, Hawa MI, Jaspan JB, Sim BM, Silvio D, Featherbe L, and Kurtz D. Mechanism of metformin action in non-insulin-dependent diabetes. *Diabetes* 1987;36:632-640.
  35. Joncas F. Quatre années d'étude clinique de la Metformine chez 47 patients diabétiques. Hôpital Maisonneuve, Montréal. *L'Union Médicale du Canada*, Jan. Issue, 1972.
  36. Laurendeau E, et al. Traitement du diabète sucré chez des patients âgés, hospitalisés avec le N.N.Diméthylbiguanide (GLUCOPHAGE<sup>MD</sup>). Hôpital Notre-Dame de la Merci. Montréal. 1970 Ref. Lab. Franca (non-publié)
  37. Lefebvre P, et al. Le mécanisme d'action des biguanides. Biguanides et sécrétion insulinique. Congrès international de diabétologie de Rémini. 1968.
  38. Le Jeune C, et al. Les effets hyperglycémians des médicaments. *Sem. Hop. Paris.* January 1994:100-107.
  39. Lim P and Khoo OT. Metformin compared with tolbutamide in the treatment of maturity-onset diabetes mellitus. *The Medical Journal of Australia.* 1970;7:271-273.
  40. Mainguet P, et al. Le diabète. 1972;20(1):39.
  41. Martindale. *The Extra Pharmacopoeia*, 29th Edition, The Pharmaceutical Press, London, 1989;397-398.
  42. McKlish A. Toxicité du N.N.Diméthylbiguanide chez le chien Beagle. Centre de recherches Laval, Québec (1970). Réf. Laboratoires Franca Inc. (non publié).
  43. Meyer F, et al. Données nouvelles sur le mécanisme d'action des biguanides hyperglycémians. Journée annuelles de diabétologie de l'Hôtel-Dieu. 1967:341-347.
  44. Pelletier G, et al. Etude de toxicité chronique de N.N.Diméthylbiguanide chez le rat. Centre de recherche Laval, Québec (1970). Ref. Laboratoires Franca Inc. (non publié).
  45. Pelletier G, et al. Etude tératologique avec N.N.Diméthylbiguanide chez le rat. Centre de recherches Laval, Québec (1970). Ref. Laboratoires Franca Inc. (non publié).



46. Nattrass M, Todd PG, Hinks L, Lloyd B, and Alberti KGMM. Comparative effects of phenformin, metformin and glibenclamide on metabolic rhythms in maturity-onset diabetics. *Diabetologia* 1977;13:145-152.
47. Pignard P. Dosage spectrométrique du N,N-Diméthylbiguanide dans le sang et l'urine. *Annales de Biologie Clinique*. 1962;20:225-233.
48. Monographie de produit "GLUCOPHAGE<sup>MD</sup>" Sanofi-Aventis Canada Inc., 2 mars 2018 (numéro de contrôle : 211582).
49. Sirtori CR, et al. Disposition of metformin (N,N-dimethylbiguanide) in man. *Clin. Pharmac. Ther.* 1978; 24: 683-693.
50. Sterne J. Oral Hypoglycemic agents. *Medicinal Chemistry*. 1969;9(5):193-294.
51. Sterne J. Pharmacology and mechanism of action of the antidiabetic biguanides. Paper read in Moscow, April 1977, unpublished.
52. Sterne JM, et al. Oral hypoglycemic agents: Clinical pharmacology and therapeutic use. *Drugs*. 1977;14:41-56.
53. Stowers JM. Long-term therapy with biguanides in: *Biguanide Therapy Today*. International Congress and Symposium, series published by the Royal Society of Medicine. 1981;48:49-57.
54. Stowers JM, et al. Oral hypoglycemic agents: Clinical pharmacology and therapeutic use. *Drugs*. 1977;14:41-56
55. *The Pharmaceutical Codex 11th Edition*, The Pharmaceutical Press, London 1979:544-545.
56. Vague P. Effet d'une dose unique de metformine sur la tolérance au glucose des sujets normaux ou obèses. *Le Diabète*. 1970;18:35-39.
57. Vermulen A, et al. Influence of dimethylbiguanide (metformin) on carbohydrate metabolism in obese, non-diabetic women. *Diabetologia*. 1972;8:8-11.
58. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). *The Lancet*. 1998;352:854-865.
59. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *The Lancet*. 1998;352:837-853.

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**

Pr GLYCON<sup>MD</sup>

Comprimés de chlorhydrate de metformine, BP

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la monographie de produit publiée à la suite de l'approbation de GLYCON pour la vente au Canada, et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Lisez attentivement ce dépliant avant de commencer à prendre GLYCON et chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Communiquez avec votre professionnel de soins de santé au sujet de votre état de santé et de votre traitement, et demandez s'il existe de nouvelles informations concernant GLYCON.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Raisons d'utiliser GLYCON :**

On emploie GLYCON (chlorhydrate de metformine), en complément du régime et de l'exercice, pour améliorer la glycémie chez les adultes souffrant de diabète de type 2.

**Effets de GLYCON :**

Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'arrive pas à produire suffisamment d'insuline ou lorsqu'il n'utilise pas l'insuline qu'il produit de façon efficace.

Il survient alors une augmentation de la glycémie, c.-à-d. du taux de sucre dans le sang, pouvant causer de graves problèmes médicaux, comme des lésions au foie, la nécessité de subir une amputation et la cécité (perte de la vue). Il existe un lien étroit entre le diabète et les maladies du cœur. Le principal objectif du traitement du diabète est d'abaisser la glycémie jusqu'à ce qu'elle atteigne un taux normal.

Le régime alimentaire, l'activité physique, la prise de médicaments par voie orale et l'injection d'insuline constituent des moyens efficaces d'abaisser la glycémie. Même si vous prenez un médicament pour traiter votre maladie, continuez quand même à faire de l'exercice et à suivre le régime alimentaire recommandé par votre médecin.

Les résultats d'études ont démontré que, peu importe le plan de traitement prescrit, le fait de maintenir une glycémie bien équilibrée peut prévenir ou retarder l'apparition de complications du diabète, comme la cécité (perte de la vue).

GLYCON permet de maîtriser votre glycémie. Bien qu'on ne comprenne pas parfaitement le mode d'action de GLYCON, on croit qu'il aide votre organisme à utiliser plus efficacement l'insuline qu'il produit naturellement :

- en diminuant la quantité de sucre que votre foie fabrique; et
- en diminuant la quantité de sucre que vos intestins

absorbent.

**Quels sont les ingrédients contenus dans GLYCON?**

**Ingrédient médicinaux :**

L'ingrédient médicinal pour GLYCON est le chlorhydrate de metformine.

**Ingrédients non médicinaux :**

Les comprimés de GLYCON contiennent les ingrédients non médicinaux suivants : croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline et povidone.

Pelliculage : cire de carnauba, polyéthylène glycol, alcool polyvinylique, talc et dioxyde de titane.

**Formes posologiques :**

GLYCON (chlorhydrate de metformine) est formulé en comprimés dosés à 500 mg et 850 mg pour administration orale.

**Vous ne devez pas prendre GLYCON si :**

- vous êtes atteint d'un diabète sucré instable ou insulinodépendant (type I);
- vous souffrez d'une acidose métabolique (y compris une acidocétose diabétique avec ou sans coma ou des antécédents d'acidocétose avec ou sans coma)
- vous avez des antécédents d'acidose lactique –trop grande quantité d'acide dans le sang);
- vous buvez beaucoup d'alcool (buvez régulièrement de l'alcool ou buvez parfois beaucoup d'alcool, boiveries);
- vous avez de graves troubles hépatiques ou une maladie du foie;
- vous souffrez d'une maladie ou d'insuffisance rénale;
- vous devez subir un examen radiologique comportant l'injection d'un agent de contraste iodé;
- vous souffrez de stress, d'une infection ou d'un traumatisme grave;
- vous devez subir une chirurgie ou êtes en période de convalescence après la chirurgie;
- vous souffrez d'une déshydratation grave (votre organisme a perdu beaucoup d'eau);
- vous présentez une hypersensibilité (avoir une pression artérielle élevée) ou une allergie au chlorhydrate de metformine ou à l'un des ingrédients qui entrent dans la composition du produit ou de son contenant;
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- vous allaitez;
- vous présentez un collapsus cardiovasculaire (interruption brutale de la circulation sanguine) ou une maladie qui peut provoquer une hypoxémie (faible taux d'oxygène dans le sang) comme l'insuffisance cardiorespiratoire.

## MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Mises en garde et précautions importantes

L'emploi de GLYCON peut, dans de rares cas, donner lieu à une complication grave appelée *acidose lactique*, qui est susceptible de mettre votre vie en danger (voir la section Acidose lactique ci-dessous).

Évitez de boire de l'alcool en grande quantité pendant votre traitement par GLYCON (voir la section Acidose lactique ci-dessous).

**Pour éviter tout effet secondaire et garantir un usage approprié, consultez votre professionnel de la santé avant de prendre GLYCON. Discutez avec lui de tous problèmes de santé ou autre que vous pourriez éprouver.**

### Acidose lactique

L'emploi de GLYCON peut, dans de rares cas, donner lieu à une complication grave appelée *acidose lactique*, qui est susceptible de mettre votre vie en danger.

Vous ne devez pas prendre GLYCON en raison d'un risque accru d'acidose lactique si :

- vous avez des problèmes de reins ou des antécédents de maladie rénale;
- vous êtes âgé de 80 ans ou plus et vous N'avez PAS subi de test visant à évaluer votre fonction rénale;
- vous souffrez d'une déshydratation grave (votre organisme a perdu beaucoup d'eau);
- vous souffrez d'une maladie du foie;
- vous souffrez d'une acidocétose métabolique (acidocétose diabétique);
- vous consommez beaucoup d'alcool, c.-à-d. que vous en prenez de façon excessive pendant de courtes périodes ou que vous buvez de façon continue;
- vous devez subir un examen radiologique comportant l'injection de colorants (produits de contraste);
- vous devez subir une chirurgie ou êtes en période de convalescence;
- vous avez subi un trouble grave, comme une crise cardiaque, une infection grave ou un accident vasculaire cérébral.

En raison du risque accru d'acidose lactique, vous devez consulter votre médecin si vous prenez GLYCON et que vous :

- commencez à souffrir ou constatez une aggravation d'une maladie cardiaque, en particulier l'insuffisance cardiaque.

Les signes et les symptômes de l'acidose lactique comprennent l'inconfort, les douleurs musculaires, la respiration difficile ou rapide, l'extrême fatigue, la faiblesse, les dérangements ou les douleurs d'estomac, la sensation de froid, la baisse de la tension artérielle ou le ralentissement du rythme cardiaque.

Si vous présentez n'importe lequel de ces effets secondaires, communiquez immédiatement avec votre médecin.

### Autres mises en garde que vous devez connaître :

Vous devez informer votre médecin si vous souffrez d'une autre affection, notamment: carence ou anémie en vitamine B12, consommation excessive d'alcool, allergies ou hypothyroïdie (faibles taux d'hormones thyroïdiennes).

Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines si vous développez une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang). Obtenez d'abord l'accord de votre professionnel de la santé avant de commencer à prendre un médicament ou d'en cesser la prise.

## INTERACTIONS AVEC LE MÉDICAMENT

**Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris tous médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou médecines douces.**

**Les médicaments ci-dessous peuvent interagir avec GLYCON; il faut donc surveiller étroitement votre dose ou état de santé :**

- d'autres médicaments contre le diabète tels que le glyburide;
- du furosémide (diurétiques (pilules pour éliminer l'eau), utilisé pour l'œdème (rétention d'eau) et l'hypertension);
- de la nifédipine (bloqueurs calciques utilisés contre l'hypertension artérielle; l'angine; le phénomène de Raynaud);
- des agents cationiques (p. ex., amiloride, digoxine, morphine, procaïnamide, quinidine, quinine, ranitidine, triamtérène, triméthoprime et vancomycine);
- certains anticoagulants (phenprocoumone ou d'autres anticoagulants antivitamin K);
- certains diurétiques, en particulier des diurétiques de l'anse, pouvant accroître le risque d'acidose lactique en raison de leur susceptibilité à diminuer la fonction rénale;
- d'autres médicaments qui ont tendance à augmenter la glycémie (c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang) et peuvent entraîner une perte de l'équilibre glycémique; en voici quelques exemples :
  - les diurétiques thiazidiques et autres (qui favorisent l'élimination de l'eau);
  - les corticostéroïdes (telle la prednisone);
  - les phénothiazines (médicaments antipsychotiques);
  - les médicaments de substitution de l'hormone thyroïdienne comme la lévothyroxine;
  - la phénytoïne (médicament utilisé dans le traitement de l'épilepsie);
  - l'acide nicotinique (médicament utilisé dans la prévention et le traitement de la carence en niacine);
  - les sympathomimétiques;
  - les bloqueurs des canaux calciques (comme nifédipine, amlodipine, fêlodipine, vérapamil, diltiazem);
  - l'isoniazide (médicament utilisé dans le traitement des infections par la tuberculose active);
  - les médicaments contre l'asthme comme le

- salbutamol ou le formotérol (agonistes des récepteurs bêta-2)
- Les inhibiteurs de l'ECA (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension (haute tension artérielle) peuvent abaisser la glycémie, si bien que leur emploi en association avec GLYCON doit faire l'objet d'une surveillance étroite.

Avant de prendre un médicament ou un produit à base d'herbes médicinales, consultez d'abord votre professionnel de la santé.

## UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

### **Comment prendre GLYCON :**

Les comprimés de GLYCON doivent être pris par voie orale (par la bouche).

### **Posologie habituelle :**

Votre médecin vous indiquera la dose de médicament à prendre et le moment pour ce faire. Suivez ses consignes. Prenez GLYCON avec des aliments afin de réduire les symptômes tels que les nausées et les vomissements.

### **Surdose :**

En général, un surdosage peut accentuer les effets secondaires décrits à la rubrique EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE, y compris les dérangements d'estomac, les nausées, les vomissements, la diarrhée, la somnolence, la faiblesse, les étourdissements, les malaises et les maux de tête.

L'acidose lactique, une complication grave susceptible de mettre votre vie en danger, est également possible (voir la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Acidose lactique).

Si vous croyez avoir pris une dose trop élevée de GLYCON, consultez votre professionnel de la santé, le service des urgences de l'hôpital ou le centre antipoison régional sans tarder, et ce, même si vous ne présentez aucun symptôme.

### **Dose oubliée :**

Si vous oubliez de prendre vos comprimés GLYCON, attendez l'heure habituelle de la prochaine dose. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

## EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

### **Quels sont les effets secondaires possibles du GLYCON?**

*La liste qui suit n'est pas une liste exhaustive des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez GLYCON. Si vous éprouvez tout effet secondaire non mentionné ci-dessous, communiquez avec votre professionnel de la santé. Veuillez également consulter la section Mises en garde et précautions.*

Les effets secondaires fréquents de GLYCON comprennent :

- la diarrhée;
- les nausées;
- les dérangements d'estomac;
- les ballonnements abdominaux;
- les gaz; et
- la perte d'appétit.

Ces effets secondaires disparaissent habituellement après un certain temps. Le fait de prendre votre médicament au moment d'un repas peut aider à réduire leur intensité. Parlez-en à votre médecin si ces effets vous incommode beaucoup, durent plus de quelques semaines, reviennent après être disparus ou apparaissent plus tard au cours du traitement. Il devra peut-être réduire la dose que vous prenez ou interrompre votre traitement de façon temporaire ou permanente.

Une fois que vous prenez la même dose pendant plusieurs jours ou semaines, si l'un de ces symptômes réapparaît, avisez immédiatement votre médecin. Une récurrence tardive de symptômes à l'estomac peut être causée par un problème médical grave (acidose lactique).

Il est rare que le chlorhydrate de metformine en lui-même cause de l'hypoglycémie. Cet effet indésirable peut toutefois se produire si vous ne mangez pas assez, si vous consommez de l'alcool ou si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser votre glycémie.

### **Acidose lactique**

**Dans de rares cas, GLYCON peut provoquer un effet secondaire grave appelé acidose lactique. Cette maladie est causée par une accumulation d'acide lactique dans le sang et peut entraîner de graves lésions.** Les cas d'acidose lactique associés à l'emploi du chlorhydrate de metformine sont rares et sont surtout survenus chez des personnes dont les reins ne fonctionnaient pas normalement. Même si elle se produit rarement, l'acidose lactique peut entraîner la mort chez environ la moitié des gens qui en souffrent.

Il est également important que votre foie fonctionne bien lorsque vous prenez GLYCON, car il permet d'éliminer l'acide lactique accumulé dans votre sang. Si vous avez des problèmes de reins ou de foie, assurez-vous de le mentionner à votre médecin avant de prendre GLYCON.

Votre peau peut être plus sensible au soleil lorsque vous prenez GLYCON. Protégez votre peau du soleil.

**Vous devrez également cesser de prendre GLYCON et communiquer immédiatement avec votre médecin si vous présentez des signes d'acidose lactique. Cette maladie constitue une urgence médicale qui exige un traitement en milieu hospitalier.**

Si votre état de santé change brusquement, cessez de prendre GLYCON et communiquez immédiatement avec votre médecin. Il pourrait s'agir d'un signe d'acidose lactique ou d'un autre effet secondaire grave.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE	
Symptôme / effet	Cesser de prendre le médicament et téléphoner à votre médecin
<b>PEU FRÉQUENT</b>	
Faiblesse, fatigue ou inconfort marqué	✓
Douleur musculaire inhabituelle	✓
Difficulté à respirer	✓
Dérangements d'estomac inhabituels ou inattendus	✓
Sensation de froid	✓
Étourdissements ou sensation de tête légère	✓
Irrégularité ou ralentissement soudain du rythme cardiaque	✓
<b>RARE</b>	
Acidose lactique (une accumulation d'acide lactique dans le sang) pouvant provoquer la mort ou une mortalité cardiovasculaire et s'accompagnant de symptômes tels que :	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• faiblesse, fatigue ou inconfort marqué</li> <li>• douleur musculaire inhabituelle</li> <li>• difficulté à respirer</li> <li>• dérangements d'estomac inhabituels ou inattendus.</li> <li>• douleurs à l'estomac accompagnées de nausées et de vomissements ou de diarrhée</li> <li>• sensation de froid</li> <li>• étourdissements ou sensation de tête légère</li> <li>• irrégularité ou ralentissement du rythme cardiaque</li> </ul>	
Pancréatite (inflammation du pancréas) : douleur abdominale intense prolongée, parfois accompagnée de vomissements; la douleur peut irradier dans le dos.	✓
Anémie hémolytique (destruction trop rapide des globules rouges, que la moelle osseuse n'arrive pas à remplacer) : les symptômes peuvent comprendre la fatigue, un teint pâle, un rythme cardiaque rapide, un essoufflement, une urine foncée, des frissons et des maux de dos.	✓
Encéphalopathie (affection du cerveau qui altère gravement la pensée) : les symptômes neurologiques possibles comprennent une faiblesse musculaire localisée, une altération du jugement ou	✓

des difficultés de concentration, des spasmes involontaires, des tremblements, de la difficulté à parler ou à avaler et des convulsions	
Neuropathie périphérique (résultant de lésions aux nerfs périphériques) : les signes et symptômes peuvent comprendre un engourdissement progressif, des picotements ou des fourmillements aux pieds ou aux mains et qui peuvent s'étendre aux jambes et aux bras, des douleurs vives, lancinantes ou pulsatiles ou une sensation de froid douloureux ou de brûlure, une sensibilité extrême au toucher, un manque de coordination et des chutes, une faiblesse musculaire ou une paralysie lorsque des nerfs moteurs sont atteints.	✓

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise de GLYCON, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Si vous ressentez un symptôme ou un effet secondaire problématique non mentionné ici ou qui s'aggrave suffisamment pour perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.*

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé par :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### **COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Les comprimés GLYCON doivent être conservés dans un contenant hermétique à la température ambiante (entre 15°C et 30°C) à l'abri de la lumière. Vous devez jeter tout médicament dont la date de péremption est expirée ou dont vous n'avez plus besoin. Informez-vous auprès de votre pharmacien pour savoir comment en disposer de façon sécuritaire.

**Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.**

## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous désirez de plus amples renseignements sur GLYCON:

- Discutez avec votre professionnel de la santé
- Procurez-vous la monographie complète du produit préparée à l'intention des professionnels de la santé et qui comprend ces RENSEIGNEMENTS POUR LA MÉDICAMENT DU PATIENT en vous rendant sur le site Web de Santé Canada (<http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php>); ou en communiquant avec le promoteur.

### **Bausch Health, Canada Inc.**

2150 boul. St-Elzéar ouest

Laval, Québec

H7L 4A8

1-800-361-4261

Ce dépliant a été rédigé par Bausch Health, Canada Inc.

Dernière révision: 12 février 2021