

Version: 05-10-2021

recommend no print on short lap (except full coverage color)

Zoetis

BMD® 110 G Granular • Granulaire

DIN 02206099

BMD®

110 G

Granular • Granulaire

Medicated Bacitracin Methylene Disalicylate Premix

Veterinary Use Only

Prémélange médicamenteux de bacitracine (méthylène disalicylate)

Usage vétérinaire seulement

For Feed Manufacturing Use Only

ACTIVE INGREDIENT:
Bacitracin Methylene Disalicylate equivalent to Bacitracin 110 g/kg

Réservé à la fabrication de moulées

INGRÉDIENT ACTIF :
Bacitracine disalicylate de méthylène équivalent à bacitracine 110 g/kg

NET 25 kg

Zoetis is a trademark and BMD is a registered trademark of Zoetis or its licensors, used under license by Zoetis Canada Inc.
Zoetis est une marque de commerce et BMD est une marque déposée de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.

zoetis

BMD® 110 G Granular • Granulaire

zoetis

BMD®

110 G

Granular • Granulaire

Medicated Bacitracin Methylene Disalicylate Premix

Veterinary Use Only

For Feed Manufacturing Use Only
Active Ingredient: Bacitracin Methylene Disalicylate equivalent to Bacitracin 110 g/kg

For manufacturing complete feeds for broiler chickens, laying hens, pregnant and lactating sows or gilts.

Composition

A dried precipitated fermentation product obtained by culturing *Bacillus licheniformis* tracy on media adapted for microbiological production of bacitracin; calcium carbonate. Granular antibiotic product.

Indications and directions for use

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently and for the shortest duration required to achieve the desired clinical outcome.

Broiler chickens for reduction of early mortality due to diminished feed consumption and drinking:
Feed to 1 week of age.

1.0 kg of BMD® 110 G per 999.0 kg complete feed to provide bacitracin concentration of 110 mg/kg.

Broiler chickens for prevention of necrotic enteritis caused by *Clostridium perfringens* susceptible to bacitracin
Feed continuously to market weight.

0.5 kg of BMD® 110 G per 999.5 kg complete feed to provide bacitracin concentration of 55 mg/kg.

Broiler chickens as an aid in treatment of necrotic enteritis associated with *Clostridium perfringens* susceptible to bacitracin. Start medication at first clinical signs of disease.
Feed continuously for 7 days.

1.0 kg of BMD® 110 G per 999.0 kg complete feed to provide bacitracin concentration of 110 mg/kg.

Laying hens as an aid in treatment of necrotic enteritis associated with *Clostridium perfringens* susceptible to bacitracin.
Start medication at first clinical signs of disease.
Feed continuously for 7 days.

1.0 kg of BMD® 110 G per 999.0 kg complete feed to provide bacitracin concentration of 110 mg/kg.

Pregnant and lactating sows or gilts:
Feed for 2½ **weeks** before farrowing through 3 weeks after farrowing for prevention of clostridial enteritis in suckling piglets caused by *Clostridium spp.* susceptible to bacitracin. Clostridial enteritis in piglets has a low incidence in Canada.

2.5 kg of BMD® 110 G per 997.5 kg complete feed to provide a bacitracin concentration of 275 mg/kg.

Warnings

No withdrawal period is required for chickens and swine when treated according to the label.
No withdrawal period is required for eggs obtained from treated laying hens when this drug is used according to the label.
When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.
Keep out of reach of children.

Cautions

Do not use in feeds containing pellet binding agents with the exception of Amen Bond 2x (calcium lignosulfonate) and Pel-Stik. Due to known presence of bacitracin-resistant *Clostridium perfringens* in broiler chickens, use of BMD® 110 G should be based on susceptibility testing. If this is not possible, therapy should be based on clinical judgement and local (regional, farm level) information about susceptibility of the target bacteria.

Storage

Store in a dry place at room temperature.

Zoetis Canada Inc.
Kirkland QC H9H 4M7

LOT See sticker on bottom of bag / Voir l'étiquette au bas du sac
EXP See sticker on bottom of bag / Voir l'étiquette au bas du sac

CONTAINS ANTIMICROBIAL USER IS RESPONSIBLE

CONTIENT UN ANTIMICROBIEN UTILISATEUR RESPONSABLE

Net 25 kg
019157-78-4
40029662

BMD®

110 G

Granular • Granulaire

Prémélange médicamenteux de bacitracine (méthylène disalicylate)

Usage vétérinaire seulement

Réservé à la fabrication de moulées
Ingrédient actif : bacitracine disalicylate de méthylène équivalent à bacitracine 110 g/kg

Pour la fabrication d'aliments complets pour poulets de gril, poules pondeuses, truies primipares ou adultes gestantes et nourricières.

Composition

Produit sec et précipité de fermentation provenant de la culture du *Bacillus licheniformis tracy* sur milieu adapté à la production microbiologique de bacitracine; carbonate de calcium. Antibiotique sous forme de granulés.

Indications et mode d'emploi

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence et pendant la plus courte durée de temps requise pour obtenir le résultat clinique attendu.

Poulets de gril, pour diminuer la mortalité précoce par suite de diminution de la consommation alimentaire et de refroidissement. Servir jusqu'à l'âge d'une semaine.

1.0 kg de BMD® 110 G par 999.0 kg d'aliment complet, pour donner une concentration de bacitracine de 110 mg/kg.

Poulets de gril, pour prévenir l'entérite nécrotique causée par des souches de *Clostridium perfringens* sensibles à la bacitracine. Servir de façon continue jusqu'au poids du marché

0.5 kg de BMD® 110 G par 999.5 kg d'aliment complet, pour donner une concentration de bacitracine de 55 mg/kg.

Poulets de gril, pour aider à traiter l'entérite nécrotique associées à des souches de *Clostridium perfringens* sensibles à la bacitracine. Commencer la médication dès les premiers signes cliniques de maladie.
Servir de façon continue pendant 7 jours.

1.0 kg de BMD® 110 G par 999.0 kg d'aliment complet, pour donner une concentration de bacitracine de 110 mg/kg.

Poules pondeuses, pour aider à traiter l'entérite nécrotique associées à des souches de *Clostridium perfringens* sensibles à la bacitracine. Commencer la médication dès les premiers signes cliniques de maladie.
Servir de façon continue pendant 7 jours.

1.0 kg de BMD® 110 G par 999.0 kg d'aliment complet, pour donner une concentration de bacitracine de 110 mg/kg.

Truies primipares ou adultes gestantes et nourricières : Servir de deux semaines et demie avant la mise bas jusqu'à trois semaines après celle-ci, pour prévenir chez les porcelets à la mamelle l'entérite à *Clostridium* causée par des espèces de *Clostridium* sensibles à la bacitracine. L'entérite à *Clostridium* chez les porcelets est peu fréquente au Canada.

2.5 kg de BMD® 110 G par 997.5 kg d'aliment complet, pour donner une concentration de bacitracine de 275 mg/kg.

Mises en garde

Un délai d'attente n'est pas requis pour les poulets et les porcs quand les directives de l'étiquette sont suivies.
Un délai d'attente n'est pas requis pour les œufs obtenus de poules traitées quand les directives de l'étiquette sont suivies.
Éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux lors de la manipulation du produit.
Garder hors de la portée des enfants.

Précautions

Ne pas utiliser dans les aliments renfermant des agents agglomérants, à l'exception d'Amen Bond 2x (lignosulfonate de calcium) et de Pel-Stik.
En raison de l'existence connue de *Clostridium perfringens* résistant à la bacitracine chez les poulets de gril, l'utilisation du produit devrait être basée sur des tests de sensibilité. Si cela n'est pas possible, le traitement doit être basé sur le jugement clinique et les informations locales (au niveau régional ou de l'élevage) concernant la sensibilité des bactéries cibles.

Entreposage

Entreposer dans un endroit sec à la température ambiante.