

Main Panel – Bilingual

DIN 00549312

ZEV[®]
**ANTITUSSIVE & DECONGESTANT LIQUID/LIQUIDE ANTITUSSIF &
DÉCONGESTIONNANT**

Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement

WARNINGS: Keep out of reach of children.
MISES EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants.

Net 2 L / 4 L

INDICATIONS:

For Horses:

For the temporary relief of coughs associated with minor upper respiratory tract problems or mild bronchial irritations.

For the temporary relief of nasal congestion.

For Dogs:

For the temporary relief of coughs associated with minor upper respiratory tract problems or mild bronchial irritations.

DIRECTIONS FOR USE:

Dosage for horses:

Shake well before use.

For the temporary relief of coughs associated with minor upper respiratory tract problems or mild bronchial irritations:

Mix 45 to 60 ml (3 to 4 tablespoons) of liquid ZEV[®] with equal parts of honey, molasses or corn syrup. Place well back on tongue. Administer two to three times daily for 48 hours or as directed by a veterinarian.

For the temporary relief of nasal congestion:

Add 60 ml (4 tablespoons) of liquid ZEV[®] to approximately 10 Litres of boiling water and place where the animal can breathe vapour freely.

Dosage for dogs:

Shake well before use.

For the temporary relief of coughs associated with upper respiratory tract problems or mild bronchial irritations:

Mix liquid ZEV[®] with equal parts of honey, molasses or corn syrup. Administer this mixture, as indicated below, 3 to 4 times daily for 48 hours or as directed by a veterinarian.

Weight of Dog	Dosage of Sweetened Mixture (ZEV® with equal parts sweetener)
0.5 - 0.9 kg	0.2 - 0.5 ml (5 to 15 drops)
0.9 - 1.4 kg	0.3 - 1.0 ml (10 to 30 drops)
1.4 - 2.3 kg	2.5 - 5.0 ml (½ to 1 teaspoon)
2.3 - 4.5 kg	5.0 - 7.5 ml (1 to 1½ teaspoons)
4.5 - 9.1 kg	7.5 - 10.0 ml (1½ to 2 teaspoons)
9.1 - 13.6 kg	10.0 - 20.0 ml (2 to 4 teaspoons)
13.6 - 22.7 kg	20.0 - 30.0 ml (4 to 6 teaspoons)
22.7 kg & up	30.0 - 40.0 ml (6 to 8 teaspoons)

ACTIVE INGREDIENTS:

Ammonium Carbonate 30.2 mg/ml
Potassium Bicarbonate 52.7 mg/ml
Camphor 0.44 mg/ml
Menthol 4.40 mg/ml
Liquid Extract of Squill 0.50 mg/ml
Solid Extract of Buckthorn 0.70 mg/ml

NON-MEDICINAL INGREDIENTS:

Carrageenan, Benzoic Acid, Sodium Cyclamate, Sorbitol Solution, Canada Balsam, Pine Needle Oil, Capsicum Oleoresin (contains Capsaicin), Ethanol alcohol, Liquid Extract of Licorice, Solid Extract of Gentian, Ginger Root Extract, Molasses, Purified Water.

STORAGE:

Store between 15-30°C. Protect from light, heat, and humidity.

CAUTIONS:

If the animal's condition has not improved within 48 hours, consult a veterinarian.

- Do not use in immature, pregnant or lactating animals.
- Do not use in animals receiving other drugs, unless directed by a veterinarian.
- Not for long term use, unless directed by a veterinarian.
- Do not use in animals with kidney or liver disease.
- Do not use in animals with bleeding disorders, unless directed by a veterinarian.

Dominion Veterinary Laboratories Ltd.
1199 Sanford Street
Winnipeg, Manitoba R3E 3A1

LOT
EXP

INDICATIONS :

Pour les chevaux :

Pour le soulagement symptomatique de la toux associée aux problèmes mineurs du système respiratoire supérieur ou aux irritations bronchiques mineures.

Pour le soulagement symptomatique de la congestion nasale.

Pour les chiens :

Pour le soulagement symptomatique de la toux associée aux problèmes mineurs du système respiratoire supérieur ou des irritations bronchiques mineures.

MODE D'EMPLOI:

Posologie pour chevaux:

Bien agiter avant usage.

Pour le soulagement temporaire de la toux associée aux problèmes mineurs du système respiratoire supérieur ou des irritations bronchiques mineures :

Mélanger 45 à 60 ml (3 à 4 cuillerées à soupe) de liquide ZEV[®] en partie égale avec du miel, de la mélasse ou du sirop de maïs. Placer le mélange sucré sur l'arrière de la langue. Administrer deux ou trois fois par jour pendant 48 heures ou selon les directives du vétérinaire.

Pour le soulagement temporaire de la congestion nasale :

Ajouter 60 ml (4 cuillerées à soupe) de liquide ZEV[®] avec approximativement 10 L d'eau bouillante et placer ensuite le mélange dans un endroit où l'animal peut respirer les émanations de vapeur librement.

Posologie pour chiens:

Bien agiter avant usage.

Pour le soulagement temporaire de la toux associée aux problèmes mineurs du système respiratoire supérieur ou des irritations bronchiques mineures :

Mélanger le liquide ZEV[®] en partie égale avec du miel, de la mélasse ou du sirop de maïs. Administrer ce mélange, tel qu'indiqué cidessous, 3 à 4 fois par jour pendant 48 heures ou selon les directives du vétérinaire.

Poids du chien	Posologie du mélange sucré (ZEV® en partie égale avec édulcorant)
0,5 - 0,9 Kg	0,2 - 0,5 ml (5 à 15 gouttes)
0,9 - 1,4 Kg	0,3 - 1,0 ml (10 à 30 gouttes)
1,4 - 2,3 Kg	2,5 - 5,0 ml (1/2 à 1 cuillerée à thé)
2,3 - 4,5 Kg	5,0 - 7,5 ml (1 à 1 1/2 cuillerée à thé)
4,5 - 9,1 Kg	7,5 - 10,0 ml (1 1/2 à 2 cuillerées à thé)
9,1 - 13,6 Kg	10,0 - 20,0 ml (2 à 4 cuillerées à thé)
13,6 - 22,7 Kg	20,0 - 30,0 ml (4 à 6 cuillerées à thé)
22,7 Kg et plus	30,0 - 40,0 ml (6 à 8 cuillerées à thé)

INGRÉDIENTS ACTIFS:

Carbonate d'ammonium 30,2 mg/ml
 Bicarbonate de potassium ... 52,7 mg/ml
 Camphre 0,44 mg/ml
 Menthol 4,40 mg/ml
 Extrait liquide de scille 0,50 mg/ml
 Extrait solide de nerprun 0,70 mg/ml

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX:

Carraghénane, acide benzoïque, cyclamate de sodium, solution de sorbitol, baume du Canada, huile d'aiguille de pin, oléorésin de capsicum (contient de la capsaïcine), alcool ethanol, extrait liquide de réglisse, extrait solide de gentiane, extrait de racine de gingembre, mélasse, eau purifiée.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE:

Conserver entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS:

Si la condition d'animal ne s'améliore pas dans 48 heures, consulter un vétérinaire.

- Ne pas utiliser chez les animaux immatures, gravides ou allaitants.
- Ne pas utiliser chez les animaux recevant d'autres médicaments, sauf indication contraire d'un vétérinaire.
- Pas pour une utilisation à long terme, sauf indication contraire d'un vétérinaire.
- Ne pas utiliser chez les animaux atteints d'une maladie rénale ou hépatique.
- Ne pas utiliser chez les animaux présentant des troubles de la coagulation, sauf indication contraire d'un vétérinaire.