

**Mock-up Label**

**Net Contents/Contenu Net: XX L = 4L, 4x4L, 18.9L, 56.8 L, 208 L, 1040 L**

**DIN 02263653**

**Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement**

**ULTRA DIP LV**

**CHLORHEXIDINE ACETATE TEAT SOLUTION**

**SOLUTION POUR TRAYONS À BASE D'ACÉTATE DE CHLORHEXIDINE**

**Post-Milking Antiseptic Teat Solution / Solution antiseptique pour trayons à utiliser après la traite**

**WARNINGS / MISES EN GARDE:** No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children./Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**ACTIVE INGREDIENTS:** Chlorhexidine Acetate 0.5% w/w

**EMOLLIENTS:** Glycerin 3% w/w

**INDICATIONS:**

Ultra Dip LV is a post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

**DIRECTIONS FOR USE:** Use at full strength. Do not dilute.

Apply Ultra Dip LV to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0 °C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of Ultra Dip LV to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of Ultra Dip LV to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

**CAUTIONS:** For external use only. If cow's teats are sore, irritated, or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**STORAGE CONDITIONS:** Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

---

Manufactured by/Fabriqué par Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc)  
451 Smith Street P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0      1-877-731-7194

**Mock-up Label**

**Distributed by/Distribué par: BouMatic LLC, 1919 S. Stoughton Rd. P.O. Box 8050, Madison, WI, 53708 USA**

**INGRÉDIENTS ACTIFS : Acétate de chlorhexidine 0,5% p/p**

**ÉMOLLIENTS : Glycerine 3% p/p**

**INDICATIONS :**

**Ultra Dip LV est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.**

**MODE D'EMPLOI : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.**

**Appliquer Ultra Dip LV sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.**

**Quand une vache est tarie, continuer l'application de Ultra Dip LV sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de Ultra Dip LV sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.**

**Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.**

**PRÉCAUTIONS : Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.**

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Eviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.**

**LOT : XXXXXX**

**EXP : XX/XX**

## Directions for Use:

Use at full strength. Do not dilute.

Apply Ultra Dip LV to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0 °C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of Ultra Dip LV to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of Ultra Dip LV to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

## Active Ingredients:

Chlorhexidine Acetate 0.5% w/w

## Emollients:

Glycerin 3% w/w

## Storage Conditions:

Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

## LOT:

# Ultra Dip LV

DIN 02263653

## Chlorhexidine Acetate Teat Solution

## Solution Pour Trayons À Base D'Acétate de Chlorhexidine

## Veterinary Use Only / Usage Vétérinaire Seulement

### Post-Milking Antiseptic Teat Solution

### Solution antiseptique pour trayons à utiliser après la traite.

**Indications:** Ultra Dip LV is a post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

**Indications:** Ultra Dip LV est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

**Warnings:** No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

**Mises en Garde:** Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**Cautions:** For external use only. If cow's teats are sore, irritated, or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**Précautions:** Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

Net Contents/Contenu Net

4L <input type="checkbox"/>	4x4L <input type="checkbox"/>	18.9L <input type="checkbox"/>	56.8L <input type="checkbox"/>	208L <input type="checkbox"/>	1040L <input type="checkbox"/>
8523779	8523636	8523637	8523638	8524314	

Product no/No de produit

Manufactured by/Fabriqué par: Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc).  
451 Smith Street P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0

1-877-731-7194

Distributed by/Distribué par: BouMatic LLC,  
1919 S. Stoughton Rd. P.O. Box 8050, Madison, WI, 53708 USA



## Mode d'Emploi:

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Appliquer Ultra Dip LV sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de Ultra Dip LV sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de Ultra Dip LV sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

## Ingrédients Actifs:

Acétate de chlorhexidine 0,5% p/p

## Emollients:

Glycérine 3% p/p

## Conditions d'Entreposage:

Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Eviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

## EXP: